

“เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” อันตราย! ที่ทุกคนควรงด

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สสส. ควส. ราชวิทยาลัยแพทยสาขาต่าง ๆ
สมาคมองค์การวิชาชีพ และแพทยสมาคม จัดทำคำแนะนำ
เพื่อเตือนกลุ่มคนที่ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาด

คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุข ทำไมไม่ควรดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เด็กและเยาวชน

อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์



แอลกอฮอล์มีผลต่อพัฒนาการ
และการเจริญเติบโตของสมอง




เสี่ยงต่อโรคติดแอลกอฮอล์



เสี่ยงต่อการบาดเจ็บและ
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

หญิงตั้งครรภ์

และหญิงที่อยู่ระหว่างให้นมบุตร



เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด



การมีโอกาสผิดปกติทาง
ร่างกาย พัฒนาการ และ
ปัญหาพฤติกรรมสูง



เสี่ยงทำให้ทารกเสียชีวิต
กะทันหัน

ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภท

ผู้ขับขี่...และผู้ที่ทำงาน
เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ



เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บสาหัส



ระบบประสาทการนึกคิด
การตัดสินใจเสียหายและส่งผล
ต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ



ทำให้ตนเองและผู้อื่น
เสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ผู้ป่วย

ผู้มีโรคประจำตัว
และใช้ยารักษาโรค



ร่างกายไม่ตอบสนอง
ต่อการรักษา



อาการเจ็บป่วยแย่ลง
เกิดภาวะแทรกซ้อน



แอลกอฮอล์ทำปฏิกิริยากับ
ยาบางชนิด เป็นอันตราย
ต่อร่างกาย

องค์การอนามัยโลก (WHO) ไม่รับรองว่า
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับใดที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ



ผู้ใหญ่ หรือผู้ที่คิดว่ามีสุขภาพดี

ไม่ว่าดื่มสะสม หรือดื่มครั้งละมาก ๆ
ก็เสี่ยงต่อการเกิดโรค การบาดเจ็บ
และการตายก่อนวัยอันควร