


# สถานการณ์สุราในประเทศไทย

## จำนวนและความชุกของนักดื่มใน 1 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลล่าสุดปี พ.ศ.2560 พบว่า คนไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 15.9 ล้านคน  
ดื่มสุราในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (คิดเป็น 28.4% ของประชากรทั้งหมด) \*



## อายุที่เริ่มดื่ม

อายุเฉลี่ยที่คนไทยเริ่มดื่มสุราครั้งแรก \*



15.7 ปี


อายุน้อยที่สุด  
ที่เริ่มดื่มสุราครั้งแรก

9 ปี



## จำนวนและความชุกของนักดื่มประจำ (อย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์)

ในนักดื่มปัจจุบันทั้งหมด พบว่า เป็นนักดื่มประจำสูงถึง 6.98 ล้านคน  
(คิดเป็น 43.9% ของนักดื่มปัจจุบัน) \*



## อุบัติเหตุจราจร

มากกว่า 60%



ของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน  
มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด  
(มากกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)



การเสียชีวิตจากการดื่มแล้วขับ  
เป็นผู้โดยสารคนเดินเท้า 1 ใน 7

\* อ้างอิง : การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และดื่มสุราของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

อ้างอิง: แผนงานระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อความปลอดภัยทางถนน  
และระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury Surveillance: IS)

## จำนวนของนักดื่มแบบอันตรายและผู้ติดสุรา

จำนวนคนไทยที่เกิดปัญหาการดื่มสุราใน 1 ปี ประมาณ

9 แสน  
คน

เป็นผู้ติดสุรา  
(alcohol dependence)

1.8 ล้าน  
คน

เป็นนักดื่มแบบอันตราย  
(harmful drinker)

อ้างอิง: การสำรวจระดับชาติสุขภาพจิต  
ของคนไทยระดับชาติ ปีพ.ศ. 2556

## ผลกระทบการดื่มสุราต่อคนรอบข้าง

76.8 % ของคนไทยได้รับผลกระทบด้านจิตใจ  
และความรู้สึกไม่ปลอดภัย

40.2 % ของคนไทยได้รับผลกระทบทางสังคม  
และผลต่อการดำเนินชีวิต

22.6 % ของคนไทยได้รับผลกระทบทางการเงิน  
และการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์

6.2 % ของคนไทยได้รับผลกระทบทางร่างกายหรือทางเพศ

อ้างอิง: โครงการการศึกษาผลกระทบของ  
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่มในประเทศไทย, 2558

## การตายจากสุรา

สุราฆ่าคนไทยปีละประมาณ

2 หมื่น คน 2 พัน คน

อ้างอิง: การประเมินและเปรียบเทียบภาระโรคและปัจจัยเสี่ยง  
(Comparative Risk Assessment: CRA)  
โดยคณะทำงานศึกษาภาวะโรค  
จากปัจจัยเสี่ยงของประเทศไทย (BOD Thailand)