

สถานการณ์ปัญหาผลกระทบจากการดื่มของผู้อ่อนน้อม (ภัยเหล้ามอส่อง) ของประเทศไทย

ภญ.อรทัย วลีวงศ์ สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืนภาคตะวันออก (IHPP) สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เพียงก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพหรือผลกระทบต่างๆ โดยตรงต่อตัวผู้ดื่มเท่านั้น การดื่มแอลกอฮอล์ของตัวผู้ดื่มยังส่งผลกระทบเชิงบวกด้านอื่นๆ ต่อไปถึงบุคคลและสังคมที่อยู่รอบข้างตัวผู้ดื่มทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอีกด้วย ในทางวิชาการมีการเรียกผลกระทบในมิติเหล่านี้ว่า “ผลกระทบจากการดื่มแอลกอหอล์ต่อผู้อื่น (ภัยเหล้ามอส่อง)” (Alcohol's harm to others) เช่นเดียวกับการเรียกค่านุ辱หรือเสื่อม ที่ผู้ไม่สูบก็ได้รับผลเสียไปด้วยหากได้รับหรือสัมผัสถวบบุหรี่เข้าไปผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอหอล์อาจเริ่มตั้งแต่บุคคลในครอบครัวของผู้ดื่ม เช่น ลูกหลาน สามี/ภรรยา พี่น้อง พ่อแม่ ญาติ หรืออาจเป็นบุคคลที่รู้จักกันแค่เป็นอย่างดี กับผู้ดื่ม เช่น เพื่อน เพื่อนร่วมงาน หรือคนในชุมชนเดียวกัน ตลอดไปจนถึงเป็นคณาแพลกหน้าที่ไม่รู้จักกับคนดื่ม

ผลกระทบจากการดื่มต่อผู้อื่นนั้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและสร้างปัญหาหรือภาระแก่ผู้อื่นได้หลากหลายเหตุการณ์ ทั้งผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว หลายระดับ ความรุนแรงตั้งแต่ ผลกระทบต่อดิจิตใจ การสร้างความเดือดด้อนร้าวภายใน ผลกระทบทางด้านสัมพันธ์ทาง ผลกระทบทางการด้านเงินความสูญเสียของทรัพย์สิน จนถึงผลกระทบทางร่างกายและทางเพศ การทำร้ายร่างกายและการเดือดเดือด โดยเหตุการณ์ผลกระทบเหล่านี้ทั้งหมดคือการเริ่มโยงไปถึงความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม

สถานการณ์ผลกระทบจากการดื่มแอลกอหอล์ต่อผู้อื่นในภาพรวมของประเทศไทย

ข้อมูลจากการสำรวจประชากรชาวไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,695 เกี่ยวกับประสบการณ์การได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอหอล์ของผู้อื่นในประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 79 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ระบุว่าเคยได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอหอล์ของผู้อื่นในมิติดิจิทัลในรอบปีที่ผ่านมา และหากแบ่งกลุ่มตามประเภทผลกระทบ เป็นสัดส่วนใหญ่พบว่าส่วนใหญ่ได้รับ “ผลกระทบทางด้านจิตใจและความรู้สึกไม่ปลดปล่อย” (ร้อยละ 76.8) ตามด้วย “ผลกระทบทางสังคมและผลต่อการดำเนินชีวิต” (ร้อยละ 42.0), “ผลกระทบทางการเงินและการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์” (ร้อยละ 22.6) และ “ผลกระทบทางร่างกายและทางเพศ” (ร้อยละ 6.2)

รูปที่ 1 แสดงรายละเอียดความชุกของการเหตุการณ์ผลกระทบจากการดื่มแอลกอหอล์ของผู้อื่นในประเทศไทย จากแยกตามสีประจำ

76.8% ของคนไทยได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจและความรู้สึกไม่ปลดปล่อย*

- ✓ ร้อยละ 38.3 เคยรู้สึกไม่ปลดปล่อยเมื่อยืนในสถานที่สาธารณะเพริ่งการดื่มของคนแพลกหน้า*
- ✓ ร้อยละ 37.8 เคยรู้สึกไม่อยากใส่ใจ (ไม่อยากแม้แต่จะมอง) เนื่องจากการดื่มของคนในครอบครัว/เพื่อน
- ✓ ร้อยละ 33.2 เคยรู้สึกหัวอกล้า เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคนแพลกหน้าที่ดื่มตามถนน/ในสถานที่สาธารณะต่างๆ*
- ✓ ร้อยละ 31.2 เคยดื่งในชั้นกลางคึกคัก/นอนไม่หลับ เพราะเสียงดังรบกวนจากวุ่นวาย/ผู้มีมนต์เสน่ห์บ้านหรือในชุมชน*
- ✓ ร้อยละ 29.3 เคยถูกคนที่ดื่มทั้งรู้จักและไม่รู้จัก พูดจาหยาบคายใส่
- ✓ ร้อยละ 24.7 เคยรู้สึกเสียใจ/รู้สึกว่าถูกปฏิเสธ เนื่องจากการดื่มของคนในครอบครัว/เพื่อน
- ✓ ร้อยละ 22.8 เคยโดยสารหรือนั่งรถไปกับคนขับรถที่ดื่มแอลกอหอล์ในปริมาณมาก
- ✓ ร้อยละ 15.8 เคยถูกกล่าว/ถูกกล่าวโทษโดยคนที่ดื่ม/มา ในระหว่างงานเลี้ยงหรือในสถานที่ส่วนบุคคล
- ✓ ร้อยละ 14.6 เคยถูกกล่าว/ถูกกล่าวตามท้องถนน/ในสถานที่สาธารณะต่างๆ จากคนแพลกหน้าที่ดื่ม*
- ✓ ร้อยละ 8.9 เคยรู้สึกว่าถูกข่มขู่ หรือรู้สึกกลัวคนที่ดื่มแอลกอหอล์ในบ้านตนเองหรือในสถานที่ส่วนบุคคล*
- ✓ ร้อยละ 4.1 คุณเคยข้องออกจากบ้านโดยไม่ทันอะไรเลย เพราะการดื่ม/มากของคนในบ้าน

6.2% ของคนไทยได้รับผลกระทบทางร่างกายหรือทางเพศ

- ✓ ร้อยละ 4.9 เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอหอล์ผลัก
- ✓ ร้อยละ 2.4 เคยถูก/โടนคนที่ดื่มแอลกอหอล์ ทำร้ายร่างกาย
- ✓ ร้อยละ 0.8 เคยถูกบังคับ หรือ กดขี่ทางเพศ เนื่องจากการดื่มของคนในครอบครัว/เพื่อน

42.0% ของคนไทยได้รับผลกระทบทางสังคมและผลต่อการดำเนินชีวิต

- ✓ ร้อยละ 28.9 คนในครอบครัว/เพื่อนไม่ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เพริ่งการดื่ม/เมากวนเวลา
- ✓ ร้อยละ 22.4 การดื่มของคนในครอบครัว/เพื่อน ทำให้งานสังคมต่างๆ ที่คุณเข้าร่วมหมุดสนุกหรือเกิดปัญหา
- ✓ ร้อยละ 10.0 เคยมีปัญหาบ้านเพื่อน หรือเพื่อนบ้าน เนื่องจากการดื่มแอลกอหอล์ของพ่อแม่
- ✓ ร้อยละ 8.8 เคยมีปัญหาครอบครัว หรือ ปัญหาชีวิตสมรส เนื่องจากการดื่มแอลกอหอล์ของคนอื่น
- ✓ ร้อยละ 5.4 คนในบ้านมีป่วยทำงานบ้านที่ต้องรับผิดชอบ เพราะการดื่ม/มา
- ✓ ร้อยละ 4.7 คุณเคยต้องหลีกเลี่ยงไปพับบาร์เพื่อน/ญาติที่นั่ง เพราะรู้สึกอยากรถพุติกรรมการดื่มของคนในบ้าน
- ✓ ร้อยละ 2.3 เคยดื่งหนึ่งขวดจากบ้านไปอื้อที่อื่น เพริ่งการดื่ม/มาของคนในบ้าน

22.6% ของคนไทยได้รับผลกระทบทางการเงินและการสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์

- ✓ ร้อยละ 11.2 เคยมีปัญหาทางด้านการเงิน (เช่น ไม่มีเงินพอสำหรับใช้จ่ายในสิ่งจำเป็น) เนื่องจากการดื่มของคนอื่น
- ✓ ร้อยละ 5.2 เคยเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดจากการดื่มของคนอื่น (เช่น เป็นผู้โดยสาร เป็นคู่กรณี ได้รับคุกคาม บาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย)
- ✓ ร้อยละ 5.1 บ้าน รถ หรือทรัพย์สินต่างๆ เคยได้รับความเสียหาย เพราะการดื่มคนอื่น
- ✓ ร้อยละ 4.7 เคยต้องหยุด/ขาด/ลางาน (หรือหยุดเรียน) เพราะได้รับอันตรายหรือผลกระทบจากการดื่มของคนอื่น
- ✓ ร้อยละ 3.8 เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอหอล์ คุกคาม/ทำลายข้าวของ
- ✓ ร้อยละ 3.4 เคยมีเงินไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน เนื่องจากการดื่มของคนในบ้าน
- ✓ ร้อยละ 2.4 คนในบ้าน/เพื่อน เคยวันไม่เงิน หรือ ของมีค่าของคุณเพริ่งการดื่ม/มา

สถานการณ์การรายงานการได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อ่อนในประเทศไทย



สถานการณ์ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ต่อเด็กและเยาวชนไทย

จากข้อมูลโครงการสำรวจการได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อ่อนในประเทศไทย โดยกลุ่มตัวอย่างคือผู้ไทยที่มีเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีอยู่ในความดูแล จำนวน 937 คน พบร้า ร้อยละ 24.6 รายงานว่าเด็กที่ดื่นดูแลอยู่ได้รับผลกระทบจากการดื่มของคนอื่น อายุต่ำกว่า 18 ปี โดยแบ่งเป็น “การได้รับผลกระทบความรุนแรงโดยตรงจากคนดื่ม” ร้อยละ 9.5 (เด็กที่ถูกดูดต่ออายุรุนแรง (7.4%), การถูกหอดทึบ/ถูกปล่อยให้ออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย (3.5%) หรือการถูกตี/ทำร้ายร่างกาย (1.7%)) ตามด้วย “การที่เด็กต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงและไม่เหมาะสม” ร้อยละ 10.7 (เด็กที่ถูกดูดต่ออายุรุนแรง (5.2%) และ เด็กที่ดูดแลโดยไปรษณีย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 0.1%

สถานการณ์ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อนร่วมงาน

จากข้อมูลโครงการสำรวจการได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อ่อนในประเทศไทย² โดยกลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรที่เป็นคนทำงานที่มีเพื่อนร่วมงานจำนวน 792 คน พบร้า มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มของเพื่อนร่วมงานซึ่งหมายรวมถึงเจ้านาย หรือ ลูกน้องด้วยอายุต่ำกว่า 30 ปี เนื่องจากน้ำใจเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ร้อยละ 31.7 (โดยมีร้อยละ 18.8 ที่รายงานว่าต้องทำงานแทนเพื่อนร่วมงานที่ดื่มและขาดงาน, ร้อยละ 18.1 รายงานว่าประสิทธิภาพในการทำงานหรือผลผลิตจากการทำงานลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากเพื่อนร่วมงานที่ดื่ม, ร้อยละ 10.1 รายงานว่าพวคเข้าต้องทำงานนอกเวลาเพิ่มเติมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการดื่มของเพื่อนร่วมงาน และ ร้อยละ 5.7 รายงานว่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุในที่ทำงานที่เกิดการดื่มของเพื่อนร่วมงาน)

สถานการณ์ผลกระทบด้านภาระหน้าที่และการต้องดูแลผู้ดื่ม

การต้องดูแลผู้ดื่ม ถือว่าเป็นผลกระทบรูปแบบหนึ่งของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อคนรอบข้างคนดื่ม จากข้อมูลโครงการสำรวจการได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อ่อนในประเทศไทย² พบร้า ร้อยละ 29.6 เดຍต้องทำความสะอาด (บ้าน) หลังจากการดื่มของคนในครอบครัวหรือเพื่อน, ร้อยละ 19.8 เดຍต้องดูแลคนในครอบครัวหรือเพื่อนเพราการดื่มของคนในครอบครัว/เพื่อน, ร้อยละ 18.9 เดຍต้องทำความสะอาด (บ้าน) หลังจากการดื่มของคนในครอบครัวหรือเพื่อน และร้อยละ 4.7% เดຍต้องดูแลเด็กหรือคนอื่นๆ เพิ่มนากขึ้น เพราะการดื่มของคนในครอบครัว/เพื่อน

การขอความช่วยเหลือหรือใช้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของผู้ดื่มได้รับผลกระทบ

คนที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของบุคคลอื่นด้วยความช่วยเหลือหรือใช้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากข้อมูลโครงการสำรวจการได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อ่อนในประเทศไทย² พบร้า ร้อยละ 6.9 เดຍต้องไปขอความช่วยเหลือ หรือขอคำแนะนำจากผู้นำชุมชน, เพื่อน, เพื่อนบ้านผู้นำศาสนา, หรือหน่วยบริการอื่นๆ (ที่ไม่เป็นทางการ), ร้อยละ 5.3 เดຍต้องโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากตำรวจ เนื่องจากการดื่มของคนอื่น, ร้อยละ 2.5 เดຍต้องไปพบแพทย์พยาบาล ที่สถานบริการสุขภาพต่างๆ เช่น โรงพยาบาล คลินิก สถานี อนามัย (รวมถึงไป ช้อปยาเพื่อรักษาตัวเองที่ร้านขายยา) เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการดื่มของคนอื่น และร้อยละ 1.4 เดຍต้องไปรับบริการแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาล/ นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล(แผนกผู้ป่วยใน) เพราะได้รับบาดเจ็บ หรือ ได้รับผลกระทบจากการดื่มของคนอื่น

แนวทางการจัดการปัญหาสถานการณ์ปัญหาผลกระทบจากการดื่มของผู้อ่อน (ภายหลังมีสอง)

 ข้อมูลสถานการณ์เหล่านี้ของประเทศไทย จากการสำรวจครั้งนี้ ถือเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่าผลกระทบของแอลกอฮอล์ไม่ได้เกิดขึ้นต่อตัวผู้ดื่มเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อบุคคลรอบข้างและสังคมโดยรวม นอกจากผลกระทบที่เกิดจากการดื่มของคนแพ้ภาระหน้าที่รือคนในชุมชน เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศและความไม่สงบในชุมชนแล้ว ยังมีปัญหาอื่นๆ อีกหลายอย่างที่ซ่อนอยู่ในสังคม โดยเฉพาะปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในรั้วน้ำบ้านจากการดื่มของสมาชิกในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการดื่มของสามีภรรยา ฟ็อกแม่ ญาติพี่น้อง หรือ ลูกหลาน ดังนั้นผลกระทบต่อจิตใจ ผลกระทบทางการด้านเงิน ผลกระทบทางด้านสังคมและการต้องดูแลผู้ดื่ม ผลกระทบทางสังคมและการดำเนินธุรกิจ ไปจนถึงผลกระทบทางร่างกายและทางเพศซึ่งถือว่ามีความรุนแรงมาก โดยเฉพาะหากใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก

 ข้อมูลเหล่านี้ยืนยันได้ว่า “การดื่มนั้น ไม่ใช่สิทธิส่วนบุคคลเสมอไป” และเมื่อการดื่มส่งผลกระทบต่อผู้อ่อนที่มากมายขนาดนี้ รัฐและสังคมมีสิทธิ์ขอรับผลกระทบที่จะเข้าไปควบคุมและจัดการเรื่องการเกิดปัญหาเหล่านี้เช่น เป็นสิ่งที่ป้องกันและควบคุมได้ โดยเฉพาะเพื่อการป้องกันสิทธิของคนในสังคมและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่เปราะบางหรือเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้ เช่น เด็ก ศูนย์ และประชากรกลุ่มที่มีเศรษฐกิจฐานะทางสังคมต่ำ ผ่านกฎหมายและมาตรการต่างๆ ในทุกระดับทั้งระดับประเทศ ระดับชุมชน และมาตรการในระดับครอบครัว ผ่านกลไกการจัดการปัญหาที่หลากหลาย

 สังคมไทยต้องการ “นโยบายและมาตรการเพื่อควบคุมการบริโภคและการลดปัญหาจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่เข้มแข็งและมีประสิทธิผล” ทั้งเพื่อการป้องกันและลดความรุนแรงของปัญหาผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิดต่อตัวผู้ดื่มและผู้อ่อน ซึ่งไม่ควรจำกัดเฉพาะแค่การจัดการรายเหตุการณ์ปัญหา เช่น การกำหนดบทลงโทษต่อผู้ดื่มที่กระทำการดื่ม แต่ควรให้ความสำคัญกับนโยบายและมาตรการการที่เข้าไปจัดการที่ปัจจัยแอลกอฮอล์และปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ซึ่งเป็นปัจจัยด้านเหตุ ที่มุ่งเป้าให้ครอบคลุมไปถึงภาคควบคุม ภาคการค้า ภาคบริโภคของคนในสังคม การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการส่งเสริมการขายแอลกอฮอล์ ซึ่งล้วนแต่มีประสิทธิผลในการลดการบริโภคแอลกอฮอล์ตลอดจนการเรียกร้องไปยังผู้ผลิตและจำหน่ายให้การเข้ามาปรับผิดชอบปัญหาเหล่านี้ด้วย

 หากมองในมิติการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อ่อน สังคมและรัฐควรให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบด้วย ทั้งหน่วยงานที่ให้บริการทางสุขภาพ หน่วยงานด้านสวัสดิการสังคม หน่วยงานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงบริการได้ถูกต้องและได้รับการบริการที่มีคุณภาพและเหมาะสมด้วย