

# พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในชุมชนหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์

การศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลอื่นในจังหวัดกาฬสินธุ์  
เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional study)

**มีวัตถุประสงค์** เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง  
จำนวน 212 คน จากการสุ่มอย่างมีระบบ (Systematic random sampling) จากทะเบียนผู้รับบริการในโรงพยาบาล  
ส่งเสริมสุขภาพเขตตำบลพื้นที่ตัวอย่าง เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 เครื่องมือที่ใช้ใน  
การศึกษา เป็นแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (AUDIT) ที่มี  
ระดับ4 ระดับได้แก่

- 1 พฤติกรรมการดื่มแบบมีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายน้อย
- 2 แบบมีความเสี่ยง
- 3 แบบอันตราย
- 4 แบบติดสุรา วิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จากผู้ที่ดื่ม  
212 คน



จากผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จำนวน 212 คน เป็นเพศชาย ร้อยละ 91.98 อายุเฉลี่ย 51.44 ปี สถานภาพคู่มากที่สุดร้อยละ 69.81 ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษามากที่สุดร้อยละ 53.30 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 50.47 รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 10,000 บาทมากที่สุด คะแนนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ย 12.89 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.72 คะแนนต่ำที่สุด 2 คะแนนมากที่สุด 39 คะแนน ระดับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้ดื่มแบบเสี่ยง (Hazardous drinker) ร้อยละ 49.53 มากที่สุด รองลงมาคือเป็นผู้ดื่มแบบเสี่ยงต่ำ (Low risk drinker) ร้อยละ 25.47 เป็นผู้ดื่มแบบติด (Alcohol dependence) ร้อยละ 12.74 และเป็นผู้ดื่มแบบอันตรายน้อยที่สุด (Harmful use) ร้อยละ 12.26 โดยสมาชิกในครอบครัวของผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้มีพฤติกรรมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 66.50

ข้อมูลที่ค้นพบนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาต่อในประเด็นผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
ของผู้ดื่มที่มีต่อผู้อื่นที่ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป

โรงพยาบาลธัญญารังษณ์ขอนแก่น กรมการแพทย์  
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
งบประมาณสนับสนุน จากแผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

