



การศึกษาผลกระทบการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้อื่น ในจังหวัดกาฬสินธุ์



“การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากรในพื้นที่ชนบท ค่อนข้างสูงกว่าในระดับประเทศ ทั้งการดื่มแบบเสี่ยงต่ำ แบบเสี่ยง แบบอันตราย และการดื่มแบบติด”

ปัจจัยด้านเพศ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว มีความสัมพันธ์กับ พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$)

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้อื่น



- 1 ร้อยละ 100 ของคนในชุมชนได้รับผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- 2 ร้อยละ 100 ได้รับผลกระทบจากการดื่มของคนในครอบครัว/คนในชุมชน
- 3 ร้อยละ 46 ได้รับผลกระทบจากการดื่มของเพื่อน/เพื่อนร่วมงาน
- 4 ร้อยละ 43 ได้รับผลกระทบจากการดื่มของคนแปลกหน้า

ร้อยละ 54 ของผู้ได้รับผลกระทบเป็นผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผลกระทบต่อผู้อื่น

ด้านสุขภาพ... สุขภาพกาย บาดเจ็บ บาดแผล เป็นสาเหตุการเจ็บป่วย เช่น ความดันโลหิตสูง **สุขภาพจิต/อารมณ์** เครียด กังวล ท้อแท้ หมดหวัง เซ็ง กลัว เบื่อหน่าย หวาดระแวง ซึมเศร้า นอนไม่หลับ สูบบุหรี่ ใช้ยาเสพติด

ด้านเศรษฐกิจ... เสียทรัพย์สินเงินทอง เสียค่ารักษาพยาบาล สูญเสียผลิตภาพ สูญเสียค่าใช้จ่าย จากอุบัติเหตุ/ความรุนแรง เสียค่าใช้จ่ายการฟ้องร้องคดีความ เป็นหนี้ชุมชน

ด้านสังคม... ผู้ได้รับผลกระทบเอง ถูกรังเกียจ ขาดความไว้วางใจ สัมพันธภาพกับเพื่อนบ้านบกพร่อง ถูกบีบบังคับทางจิตวิญญาณ **ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเอง** ทะเลาะ ขัดแย้ง ความรุนแรง เลิกร้าง ภาวะดูแลซ้ำซ้อน **ชุมชน/สังคมผู้ได้รับผลกระทบเอง** ราคายู กลัว รังเกียจ ขาดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ขัดแย้งกันในชุมชน สูญเสียและเสียหายทรัพย์สินของชุมชน ชุมชนกองทุนขาดสภาพคล่อง ชุมชนได้รับมลทิน

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชุกชอนปัญหาในครัวเรือน ชุมชน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นวัฏจักร มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

การคัดกรอง ผู้ดื่ม ผู้ได้รับผลกระทบและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในชุมชน มีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเพื่อลดผลกระทบและลดภัยมือสองจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Alcohol Harm to Others)

