

รายงานฉบับสมบูรณ์

การวิเคราะห์สารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในวัตถุดิบ และที่เกิดขึ้น
จากการกระบวนการหมัก และการกลั่นสุรา

(Analysis of toxic substances that distribute in raw material and
appear on the process of alcohol fermentation and distillation)

ข้อตกลงเลขที่

50-ข-076

คณะผู้วิจัย

สิริลักษณ์ ชัยจำรัส
วิสาข์ สุพร摊ไพบูลย์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันเริ่มต้นโครงการ 20 กันยายน 2550
วันสิ้นสุดโครงการ 20 กันยายน 2551

กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ปีงบประมาณ 2551
ผู้วิจัยขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุน จนโครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

บทสรุปผู้บริหาร

จากการสำรวจและตรวจสอบรายชื่อสุรา เช่น และสุรากลั่น ที่มีวางจำหน่ายในร้านค้าขนาดเมือง จังหวัดพิษณุโลกจำนวน 96 ยี่ห้อ ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างสุราในเดือนมกราคม 2551 โดยใช้เทคนิค PPS (Probability Proportional to Size Sampling) ได้จำนวนตัวอย่าง 30 ยี่ห้อ ภายใต้พื้นที่กำหนดเขตศึกษา 3 กลุ่มคือ ชุมชนในเมือง สถานประกอบการของมหาวิทยาลัยเรศวร และชุมชนท้องถิ่นที่มีการผลิตสุรา ตัวอย่างสุราทั้ง 30 ยี่ห้อถูกนำมาวิเคราะห์สารพิษเป็นปีกอน ในกลุ่มสารประกอบบินทรีย์ คือ acetaldehydes, methanol, formaldehyde และยาฆ่าแมลง 4 กลุ่ม คือ Organophosphate, Carbamate, Organochlorine และ Pyrethroid และในกลุ่มของสารโลหะหนัก Arsenic, Cadmium และ Lead วิเคราะห์โดยใช้เทคนิค ICP-MS, GC-MS และ GC พบปริมาณ acetaldehyde เฉลี่ย 234 ± 155 mg/l (อยู่ในช่วง 0 - 690 mg/l) มีค่าเกินมาตรฐานควบคุม (160 mg/l) และพบสูงสุดในสุราแม่โขง 690 mg/l รองลงมาเป็นสุรานำเข้า คือ Black label (309 mg/l) ส่วนสารพิษเป็นปีกอนชนิดอื่น พบว่ามีค่าต่ำกว่ามาตรฐานควบคุม ได้แก่ methanol เฉลี่ย 40 ± 28 mg/l (อยู่ในช่วง 0-108 mg/l) สูงสุดพบในสุรากลั่น Spay royal (108 mg/l) สารโลหะหนัก Arsenic พบปริมาณสูงสุด 0.0084 mg/l ในบีเยร์ช้าง และ Lead พบปริมาณ 0.11 mg/l ในสุราชุมชนยี่ห้อไทยแท้ แต่ไม่พบ Formaldehyde, Cadmium และสารปาราบัคตอร์ฟีฟท์ 4 กลุ่ม

จากการตรวจทางจุลทรรศน์วิเคราะห์รอบปากช่องสุรา พบการปนเปื้อนของเชื้อจุลทรรศน์ในสุราชุมชนเป็นส่วนใหญ่ หลังจากการจำแนกเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวด้วยการทดสอบสีแกรม การวัดขนาดโคโนนี และการทดสอบทางชีวเคมี สามารถจำแนกเชื้อจุลทรรศน์ได้ 4 ชนิด คือ *Staphylococcus coagulase negative*, *Micrococcus spp.*, *Streptococcus nonenterococci* และ *Candida spp.* ซึ่งจุลทรรศน์เหล่านี้ไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร

ผลกระทบต่อสุขภาพแบบกึ่งเรื้อรัง (sub-chronic) ในหนู Wistar ที่กำลังอยู่ในวัยรุ่น จากการได้รับแอลกอฮอล์ร่วมกับสารพิษเป็นปีกอน และตัวอย่างสุราจริง 2 ยี่ห้อคือ แม่โขง และ Black label ที่ตรวจพบว่ามีปริมาณ acetaldehyde สูงสุด และสูงรองตามลำดับ ระยะเวลานาน 3 เดือน ทำให้ระดับเอนไซม์ในตับ ได้แก่ ALT, AST และ ALP สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากตับถูกทำลาย น้ำหนักตับเพิ่มขึ้น เพราะการสร้างไขมันสะสมในตับเมื่อตับถูกทำลายด้วยแอลกอฮอล์ ปริมาณกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มของการเป็นเบาหวาน นอกจากนี้จำนวนเซลล์สีบพันธุ์ (sperm) ลดลงอย่างเห็นได้ชัดในกลุ่มที่ได้รับแอลกอฮอล์ ความสามารถในการเคลื่อนไหวของเซลล์สีบพันธุ์ก็ช้าลงด้วย อายุร่วมมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

Executive summary

Survey and collection of alcoholic beverages in Phitsanulok are performed by probability proportional to size sampling (PPS) for 30 from 96 samples on January 2008. The study area was scoped as in the city, around Naresuan University and the local region. Sample of alcoholic beverages were analyzed toxic substances that distribute and contaminant in the group of organic compound as acetaldehyde, methanol, formaldehyde and 4 pesticide group; Organophosphate, carbamate, Organochlorine and Pyrethroid by GC-MS and GC, including heavy metal group as Arsenic, Cadmium and Lead were determined as well by ICP-MS. Acetaldehyde was found in these samples mean 234 ± 155 mg/l (range 0 - 690 mg/l) which had significantly higher acetaldehyde concentration than the limit (160 mg/l). However, the highest acetaldehyde concentration was found in Maakong (690 mg/l) and the second level was found in Black label (309 mg/l). The other toxic substances were found in lower concentration than the limit such as methanol (40 ± 28 mg/l, range 0-108 mg/l). The highest methanol concentration was found in Spay royal (108 mg/l). Arsenic and lead were found the highest concentration in beer Chang (0.0084 mg/l) and in ThaiTaa (0.11 mg/l) but formaldehyde, Cadmium and 4 pesticide group were not detected.

Alcoholic beverages were smeared around the neck of bottle. The most of local spirit was found poor bottle hygiene. Gram strain, colony size by SEM and biochemical test was used to identify contaminant microorganism which found 4 microorganisms as *Staphylococcus coagulase negative*, *Micrococcus spp.*, *Streptococcus nonenterococci* and *Candida spp.* which they are not serious in control.

Health impact of sub-chronic was determined in early age male Wistar rat by contaminant alcohol and 2 commercial spirits (Maakong and Black label) intake for 3 month. The 2 commercial spirits had highest acetaldehyde. The liver enzyme as ALT, AST and ALP were produced significantly higher in the group of alcohol intake than the control. The high of liver weight to body weight ratio related to fat accumulation caused liver destroy. Glucose in plasma increased significantly lead to diabetes. Moreover, sperm concentration decreased significant when consumed the alcohol and the motility of sperm was also slowly.

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	i
บทสรุปผู้บริหาร (ภาษาไทย)	ii
บทสรุปผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)	iii
สารบัญ	iv
สารบัญตราสาร	v
สารบัญรูป	vi
1. บทนำ	1
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	9
2. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง	10
3. ผลการการทดลอง	16
3.1 ผลการสุมตัวอย่างสุรา	16
3.2 ผลการวิเคราะห์สารพิษ	18
3.3 ผลการทดสอบทางจุลชีววิทยา (Microbiological test)	20
3.4 ผลการทดลองทางชีวภาพในหนู Wistar Rat	22
4. วิจารณ์ผลการทดลอง	26
5. สรุปผลการทดลอง	30
6. เอกสารอ้างอิง	30
7. ภาคผนวก	35

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 เกณฑ์ในการตรวจติดตามคุณภาพสุราที่ผลิตภายในประเทศ	4
1.2 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสุรา เช่น	5
1.3 เกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพสุราที่นำเข้าจากต่างประเทศ	6
2.1 รายการทดสอบยาฆ่าแมลง	11
2.2 กลุ่มสัตว์ทดลองลักษณะของการเกิดพิษแบบกึ่งเรื้อรัง (subchronic) และแบบเรื้อรัง (chronic) จากการบริโภคสุราที่มีสารพิษตอกดังและปนเปื้อน ในหนูเพศผู้ (Wistar rat) อายุ 5 สัปดาห์ น้ำหนักตัว (121-160 กรัม)	14
3.1 แสดงค่าสะสมความนิยมการบริโภคสุรากลุ่มที่ 1 ในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก	16
3.2 แสดงค่าสะสมความนิยมการบริโภคสุรากลุ่มที่ 2 บริเวณสถานประกอบการ รอบมหาวิทยาลัยนเรศวร	17
3.3 แสดงค่าสะสมความนิยมการบริโภคสุรากลุ่มที่ 3 สุราชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก	18
3.4 ผลการวิเคราะห์สารพิษปนเปื้อนในสุราทั้ง 3 กลุ่ม	19
3.5 จำนวนโคโลนีจากการเพาะเชื้อรอบปากขวดสุรา	20
3.6 ผลการทดสอบทางชีวเคมีพบเชื้อในกลุ่ม Streptococci	22
4.1 การวิเคราะห์ Acetaldehyde ในตัวอย่างสุราเบรียบเทียบระหว่าง 2 ห้องปฏิบัติการ	26
4.2 จากการรวมข้อมูล ปริมาณ Acetaldehyde ที่ตรวจพบในสุรากลัน หน่วย mg/L	29

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1.1 เมทาบอลิซึมของแอกลกอฮอล์ในเซลล์ตับ (ADH pathway)	8
3.1 ลักษณะโคโนนีที่ตรวจพบรอบปากขวดบรรจุสุราโดยห้องแม่ยม	21
3.2 ขนาดโคโนนีที่วัดด้วยกล้อง SEM (Scanning Electron Microscope)	21
3.3 สัดส่วนเอนไซม์ ALT/AST ในตับ	23
3.4 ระดับกลูโคสในเลือด	23
3.5 สัดส่วนน้ำหนักตับต่อน้ำหนักตัว	24
3.6 จำนวนความเข้มข้นของเซลล์สีบพันธุ์	24
3.7 ความสามารถในการเคลื่อนที่ของเซลล์สีบพันธุ์	25

1. บทนำ

มีการตรวจพบสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนอยู่ในรูปของ acetaldehyde สารตัวนี้เป็นสารกลิ่นที่ระเหยง่ายพบในเครื่องดื่ม และอาหารหลายชนิด (Liu and Pilone, 2000) ถ้าเป็นกลิ่นผลไม้แสดงว่ามีปริมาณอะซิทัลไดโอดีในระดับต่ำ แต่ถ้ามีความเข้มข้นสูงจะมีกลิ่นฉุน (Miyake and Shibamoto, 1993) อะซิทัลไดโอดีในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจเกิดมาจากยีสต์ หรือแบคทีเรียที่ผลิตกรดอะซิติก และอาจเกิดจากปฏิกิริยาควบคู่ของเอกทานอล และสารประกอบฟีโนลิกเมื่อมีออกซิเจน (couple auto-oxidation) (Liu and Pilone, 2000) ในกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ที่ไม่สมบูรณ์ จะทำให้มีปริมาณ acetaldehyde สูง ซึ่งถ้าอยู่ในรูป formaldehyde สารตัวนี้จะไปกดประสาทผู้ดื่ม นอกจากนี้ acetaldehyde เป็นสารส่วนใหญ่ของกระบวนการสันดาปเอกทานอลซึ่งเป็นสารพิษ จากการสังเกตพฤติกรรมของหนูทดลองที่เปลี่ยนไปเมื่อได้รับสารนี้ พบร่วมปริมาณระดับความเข้มข้นของ noradrenaline และ serotonin จะสูงขึ้นหลังจากมีการให้สาร acetaldehyde ที่แตกต่างกัน (Javier Franco-Perez, et.al., 2006)

อะซิทัลไดโอดีจะมีฤทธิ์อย่างมากเมื่อเข้าเก้าอี้กับโปรตีน ที่ตำแหน่งจำเพาะกับเปลือกถุงไทด์กูลูต้าไธโอน (glutathione) หรือกรดอะมิโนแต่ละตัวที่เป็นสารประกอบให้กลิ่น (Liu and Pilone, 2000; Miyake and Shibamoto, 1993) ได้มีการทดสอบกับสัตว์ทดลองในสถาบันมะเร็งแล้ว พบร่วมอะซิทัลไดโอดี เป็นสารก่อมะเร็งตัวหนึ่งที่สำคัญ และเป็นไปได้ที่จะเกิดกับมนุษย์ด้วย (IARC, 1999) ได้มีการศึกษาກลไกของการเกิดอะซิทัลไดโอดีโดยเอนไซม์ aldehyde dehydrogenase (ALDH) และเป็นสาเหตุของการเกิดเนื้อร้าย (Baan et al., 2007) อะซิทัลไดโอดีเป็นสาเหตุของการก่อพันธุ์เฉพาะจุดในสารพันธุกรรม DNA ที่นำไปสู่การเกิดมะเร็ง (Cheng et al., 2003; Fang and Vaca, 1997; Hecht et al., 2001; Noori and Hou, 2001; Wang et al., 2000; Linderborg et al., 2008) เมื่อเร็วๆ นี้มีการทดลองพบว่าอะซิทัลไดโอดีปริมาณ 100μM สามารถก่อให้เกิดการก่อพันธุ์ระดับเซลล์ (Theruvathu et al., 2005) และสามารถตรวจพบอะซิทัลไดโอดีในน้ำลายมนุษย์ หลังจากการย่อยแอลกอฮอล์ความเข้มข้นระหว่าง 18-143 μM ภายใน 40 นาที (Homann et al., 2002) อะซิทัลไดโอดีความเข้มข้น 40-200 μmol/l สามารถเหนี่ยวนำการก่อพันธุ์และเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็ง (Homann et al., 1997a; Salaspuro et al., 2002) นอกจากนี้อะซิทัลไดโอดียังไปรบกวนการซ่อมแซม DNA โดยไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในกระบวนการดังกล่าว (Espina et al., 1988)

เอทธิลคาร์บามะ (ethyl carbamate) หรือ ยูเรทาน (urethane) มักนิยมใช้เป็นยาฆ่าแมลง ละลายน้ำได้ดี ไม่มีกลิ่น เมื่อร่างกายได้รับ จะเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน สารนี้จะไปกดระบบประสาท ส่วนกลางและทำลายไขกระดูก ทำลายไต ตับ ทำให้เกิดการตกลงเลือด จัดเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งในปอด มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งตับ และเกิดตั้งเนื้อจำนวนมากที่ผิวนัง รวมทั้งเกิดความพิการของทารกในครรภ์ จะทำให้ทารกเจริญเติบโตช้า รูปร่างผิดปกติและพิการ (Naegle and D'Avanzo, 2001)

ไซยาไนด์ (cyanide) เป็นสารปนเปื้อนที่เกิดจากกระบวนการผลิตที่มีการคัดแยกชิ้นส่วนของวัตถุดิบที่ไม่ดี เช่น มีก้าน หรือเมล็ดธัญพืชพากข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ ข้าวจ้าวและข้าวเหนียว ปนในกระบวนการผลิต จัดได้ว่าเป็นสารที่เป็นอันตรายมากอยู่ในรูปของ ไฮโดรเจนไซยาไนด์ และเกลือไซยาไนด์ที่แห้งไม่มีกลิ่น แต่ถ้าซึ่งจะมีกลิ่นเล็กน้อย มีกลิ่นคล้ายอัลมอนด์ ถ้าสัมผัสกับสารพากไนเตรท คลอรอเรท จะเกิดการระเบิดและลูกเป็นไฟได้ ถ้าร่างกายได้รับในปริมาณเล็กน้อย จะเกิดอาการปวดหัว มีน้ำตาล คลื่นไส้ อาเจียน แขน ขา เมื่อยล้า ถ้าได้รับในปริมาณมาก จะเกิดอาการปวดหัว ใจ คลื่นไส้ อาเจียน ประสาทตาและรอบๆตาถูกทำลาย หายใจไม่ออกร และหัวใจหยุดเต้น


ากาน้ำตาล (Molasses) เป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการโรงงานผลิตน้ำตาล สามารถนำมาใช้เป็นแหล่งอาหารเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ เช่น ยีสต์ทำงานบึง หรือใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ (Nikolaos, et. al., 2007) แต่ต้องมีการบำบัดสารปนเปื้อนรวมทั้งดูดซับสีน้ำตาลออกจากน้ำกาน้ำตาล มีฉนั้นจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ทั้งความหนืดและความเข้มข้นของกาน้ำตาลค่อนข้างสูง จำเป็นต้องเจือจางด้วยน้ำ และบางสภาวะของการเพาะเลี้ยง จำเป็นต้องเติมสารอาหารลงไปด้วย กาน้ำตาลของแต่ละโรงงานก็มีคุณภาพไม่เท่ากัน บางโรงงานอาจมีโลหะหนักปนเปื้อนอยู่ในปริมาณสูง ต้องบำบัดก่อนนำไปใช้ ซึ่งบางครั้งราคาก็ใช้จ่ายสูงมากในการบำบัด นอกจากรากาน้ำตาลแล้วแหล่งวัตถุดิบอื่น ๆ เช่น ชัญพีซที่นำมาใช้ในการหมักแอลกอฮอล์ อาจมีการปนเปื้อนของสารฝ่าแมลง ที่ชัดพ่นเพื่อป้องกันศัตรูทำลายทั้งก่อนเก็บเกี่ยวและหลังเก็บเกี่ยว จึงต้องระวังในเรื่องของการทำความสะอาด และความปลอดภัยของผู้บริโภคอย่างมากในการนำไปใช้




การวิเคราะห์สารประกอบที่เป็นพิษ ความเป็นพิษนั้นขึ้นกับความเข้มข้นของสาร ในสุรากลั่น บางครั้งพบเมทานอล (Methanol) อยู่ในปริมาณสูง สาเหตุจากการวัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสุขลักษณะในกระบวนการผลิตด้วย ส่วนในกระบวนการหมักจะพบสารในกลุ่ม acetaldehyde, ethyl acetate และ amyl alcohols เป็นหลัก ซึ่งอะซีตัลไดออกซิดเกิดจากการออกซิเดชันของเอทานอลในระหว่างการกลั่นและการบ่ม และจะพบอัลไดออกซิดที่มีชื่อ เช่น อะโรมาติกอัลไดออกซิด ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการกลั่นและเก็บบ่มปรัตน์ในถังไม้เชือก และจะมีผลต่อกลิ่นรสปรัตน์ดี โดยจะให้กลิ่นของเหล้าอย่าง และกลิ่น "Nutty" (Apostolopoulou, 2005)

โลหะหนัก (heavy metal) เป็นสารปนเปื้อนที่คาดว่ามาจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการหมัก และบางครั้งอาจมาจากน้ำ และวัตถุดิบที่ใช้ จากรายงานผลการวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วที่พบสมพันธ์กับปริมาณเหล็ก จึงสันนิษฐานได้ว่าตะกั่วที่เกิดขึ้นนำมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการหมัก นอกจากนั้นอาจมาจากชนิดของบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมทำให้มีโลหะปนเปื้อนได้


ปฏิกรรมของแอลกอฮอล์

1. Alcohol Oxidation






2. Acetaldehyde Oxidation



3. NADH oxidation (in the mitochondria)



ในกระบวนการกรองลั่นวัสดุทำให้มีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาของสารประกอบต่างๆ ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น ไวน์ ดังนั้นการกรองลั่นไวน์ ผลไม้ที่ผลิตได้ ควรจะมีการทดสอบของวัสดุที่ใช้ทำให้มีผลต่อองค์ประกอบของบรั่นดีที่กลั่น เพราะไวน์ผลไม้แต่ละชนิดมีสารประกอบที่เป็นองค์ประกอบในไวน์ที่ต่างกัน ในการกรองลั่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เมื่อมีการกรองโดยใช้วัสดุทำให้มีผลต่อองค์ประกอบในไวน์ที่ต่างกัน ในการกรองลั่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้น เมื่อมีการกรองโดยใช้วัสดุทำให้มีผลต่อองค์ประกอบในไวน์ที่ต่างกัน ให้ผลของกรรมภัยมรรขของผู้บริโภคต่างกัน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กลั่นจากเครื่องกรองลั่นที่ทำจากทองแดง

การศึกษาผลของการผลิต Cachacas ซึ่งเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับความนิยมในประเทศบราซิลโดยเบรี่บานเทียบทางประเทศไทยของ Cachacas จากการกรองโดยใช้มือกลั่นทองแดง และมือกลั่นเหล็กกล้าไร้สนิม ผลที่ได้ผู้ทดสอบชี้ให้ความชอบใน Cachacas ที่กลั่นโดยใช้มือกลั่นทองแดงมากกว่า Cachacas ที่กลั่นโดยหม้อกลั่นเหล็กกล้าไร้สนิม (Bettin, et.al., 2002) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาผลของการกรองโดยเหล็กกล้าไร้สนิม และแก้วที่นำมาใช้เป็นวัสดุทำให้มีผลต่อคุณภาพของบรั่นดีที่ผลิตจากไวน์มะขามสุรุ่วว่าการใช้มือกลั่นทองแดง เหล็กกล้าไร้สนิม และแก้วเมื่อนำมาทำการกรองลั่นไวน์มะขามจะได้องค์ประกอบของสารที่อยู่ในบรั่นดีแตกต่างกัน โดยบรั่นดีที่กลั่นจากหม้อทองแดง มีองค์ประกอบที่ให้กลิ่นรสที่ดีได้แก่ บริมาณของ อะเซตัลดีไฮด์ เอทิลอะซีเตต และ พูเซลล์อย มากกว่าการกลั่นโดยใช้สแตนเลส สตีล และแก้ว (ชาญณรงค์, 2543)

เนื่องจากมีผู้นิยมดื่มแอลกอฮอล์เป็นจำนวนมาก แต่สุราจัดเป็นเครื่องดื่มที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และยังมีโอกาสได้รับอันตรายเพิ่มจากสารปนเปื้อนในสุราได้อีก ได้แก่ เมทานอล (methanol) อะเซตัลดีไฮด์ (acetaldehyde) เอทิลอะซีเตต (ethyl acetate) แอลกอฮอล์โมเดกุลสูง (higher alcohols) พูเซลล์อย (fusel oil) เป็นต้น โดยที่สารเหล่านี้จะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตสุรา เช่น การศึกษาวิเคราะห์บริมาณ เมทานอล อะเซตัลดีไฮด์ และ เอทิลอะซีเตต ซึ่งปนเปื้อนในสุรา เช่น เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับปรุงและควบคุมขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานต่อผู้บริโภค (ยุพา ศรีนาค, 2531)

เมทานอลหรือเมทิลแอลกอฮอล์ เป็นผลิตภัณฑ์ไม่ได้เกิดจากการหมักแอลกอฮอล์แต่เป็นผลมาจากการไฮโดรเจนออกซิของ Methylate pectin ที่พบในผลไม้ โดยเอนไซม์ Pectin methylesterase (PE) (Hernandez-Gomez, et.al., 2003) เมทานอลในปริมาณดีจะพบในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ตามชนิดและปริมาณเพคติน ในผลไม้แต่ละชนิด โดยทั่วไปจะพบ 0.1188 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก (Amerine, et.al., 1980) ปัจจุบันยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเมทานอลมีบทบาททางประสานสัมผัสอย่างไร แต่มีปริมาณมากจะเป็นอันตรายกับร่างกายโดยเมทานอลจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้เกิดเป็นสารฟอร์มาลดีไฮด์ และกรดฟอร์มิกที่เป็นอันตราย ทั้งนี้เมทานอลจะมีผลต่อระบบประสาทโดยตรง จึงต้องมีการควบคุมให้มีปริมาณเหมาะสมในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยองค์กรที่มีหน้าที่ในการกำหนดค่ามาตรฐานอุตสาหกรรมประเภทสุราลั่น (มอก. 2088-2544) ซึ่งระบุไว้ในตารางที่ 1.1, 1.2 และ 1.3

ตารางที่ 1.1 เกณฑ์ในการตรวจติดตามคุณภาพสุราที่ผลิตภายในประเทศ

1. สุราลั่น ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตได้ตาม ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีบริหารงานสุรา ฉบับที่ 1 และ 2		2. สุราลั่น ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง วิธีบริหารงานสุรา ฉบับที่ 4 (สุราลั่นชุมชน)	
รายการวิเคราะห์	ค่าไม่เกิน	รายการวิเคราะห์	ค่าไม่เกิน
1.1 แจงแอลกอฮอล์	+/- 1	1.1 แจงแอลกอฮอล์	+/- 1
1.2 ฟูเซลออกอยล์	5500 ppm	1.2 ฟูเซลออกอยล์	5500 ppm
1.3 เพอร์ฟิวัล	50 ppm	1.3 เพอร์ฟิวัล	50 ppm
1.4 เอสเทอრ (เอทิลแอซิเทต)	1200 ppm	1.4 เอสเทอร์ (เอทิลแอซิเทต)	1200 ppm
1.5 แอลดีไฮด์ (แอซิทัลดีไฮด์)	160 ppm	1.5 แอลดีไฮด์ (แอซิทัลดีไฮด์)	160 ppm
1.6 เมทิลแอลกอฮอล์	420 ppm	1.6 เมทิลแอลกอฮอล์	420 ppm
1.7 เอทิลcarboxymet	400 ppb	1.7 เอทิลcarboxymet	400 ppb
1.8 ชัลเฟอร์ไดออกไซด์ทั้งหมด	350 ppm	1.8 กรดเบนโซิกหรือเกลือของกรดเบนโซิก	200 ppm
1.9 กรดเบนโซิกหรือเกลือของกรดเบนโซิก	200 ppm	1.9 สารหนู	0.1 ppm
1.10 กรดซอร์บิกหรือเกลือของกรดซอร์บิก	200 ppm	1.10 ตะกั่ว	0.2 ppm
1.11 สารหนู	0.1 ppm		
1.12 ตะกั่ว	0.2 ppm		
1.13 ทองแดง	5 ppm		

หมายเหตุ มีการตรวจติดตามคุณภาพสุราในประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ตารางที่ 1.2 เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสุขาชีวะ

3. สุขาชีวะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เว่อร์ วิธีบริหารงานสุขา ฉบับที่ 1 และ 2		4. สุขาชีวะที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เว่อร์ วิธีบริหารงานสุขา ฉบับที่ 3 (สุขาชีวะ พื้นเมือง)		5. สุขาชีวะประเภทเบียร์ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง เว่อร์ วิธีบริหารงานสุขา ฉบับที่ 1 และ 2	
รายการวิเคราะห์	ค่าไม่เกิน	รายการวิเคราะห์	ค่าไม่เกิน	รายการวิเคราะห์	ค่าไม่เกิน
1.1 แรงแอลกอฮอล์	+/-1	1.1 แรงแอลกอฮอล์	+/-1	1.1 แรง	+/-1
1.2 ฟูเซลออกอิล	2500 ppm	1.2 เมทิลแอลกอฮอล์	420 ppm	แอลกอฮอล์	
1.3 เอสเทอร์ (เอทิลแอซิเทต)	1200 ppm	1.3 ชัลเพอร์ไಡ ออกไซด์ทั้งหมด	300 ppm	1.2 ชัลเพอร์ไಡ ออกไซด์ทั้งหมด	30 ppm
1.4 แอลดีไฮด์ (แคชิทัลดีไฮด์)	160 ppm	1.4 กรดเบนโซิกหรือ เกลือของกรดเบนโซ	250 ppm	1.3 ทองแดง	1.5 ppm
1.5 เมทิลแอลกอฮอล์	420 ppm	อะกิ		1.4 เหล็ก	1.5 ppm
1.6 เอทิลคาร์บามेट	200 ppb	1.5 กรดซอร์บิกหรือ เกลือของกรดซอร์บิก	200 ppm		
1.7 ชัลเพอร์ไಡ ออกไซด์ทั้งหมด	300 ppm	1.6 สารหนู	0.1 ppm		
1.8 กรดเบนโซิกหรือ เกลือของกรดเบนโซ	250 ppm	1.7 ตะกั่ว	0.2 ppm		
อะกิ		1.8 ทองแดง	5 ppm		
1.9 กรดซอร์บิกหรือ เกลือของกรดซอร์บิก	200 ppm	1.9 เหล็ก	15 ppm		
1.10 สารหนู	0.1 ppm	1.10 เพอร์โวไซยาไนด์	ไม่พบ		
1.11 ตะกั่ว	0.2 ppm				
1.12 ทองแดง	5 ppm				
1.13 เหล็ก	15 ppm				
1.14 เพอร์โวไซยาไนด์	ไม่พบ				

ตารางที่ 1.3 เกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพสุราที่นำเข้าจากต่างประเทศ

สุรากลั่น (มอก.2088-2544)		ไวน์ (มอก.2089-2544)		เบียร์ (มอก.2090-2544)	
รายการวิเคราะห์	ค่าไม่เกิน	รายการวิเคราะห์	ค่าไม่เกิน	รายการวิเคราะห์	ค่าไม่เกิน
1.1 แรงแอลกอฮอล์	+/-1	1.1 แรงแอลกอฮอล์	+/-1	1.1 แรงแอลกอฮอล์	+/-1
1.2 ฟูเซลโคลอยล์	2500 ppm	1.2 เมทิลแอลกอฮอล์	420 ppm	1.2 ชัลเฟอร์ไดออกไซด์ทั้งหมด	30 ppm
1.3 เอสเทอร์ (เอทิล酇ิทีต)	1200 ppm	1.3 ชัลเฟอร์ไดออกไซด์ทั้งหมด	300 ppm	1.3 ทองแดง	1.5 ppm
1.4 แอลดีไฮด์ (แอซิทัลดีไฮด์)	160 ppm	1.4 กรดเบนโซอิกหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	250 ppm	1.4 เหล็ก	1.5 ppm
1.5 เมทิลแอลกอฮอล์	420 ppm	1.5 กรดซอร์บิกหรือเกลือของกรดซอร์บิก	200 ppm		
1.6 เอทิลคาร์บามेट	200 ppb				
1.7 ชัลเฟอร์ไดออกไซด์ทั้งหมด	300 ppm	1.6 สารอนุตัวต่อ 1.7 ตะกั่ว	0.1 ppm 0.2 ppm		
1.8 กรดเบนโซอิกหรือเกลือของกรดเบนโซอิก	250 ppm	1.8 ทองแดง 1.9 เหล็ก	5 ppm 15 ppm		
1.9 กรดซอร์บิกหรือเกลือของกรดซอร์บิก	200 ppm	1.10 เฟอร์โนไซยาไนด์	ไม่พบ		
1.10 สารอนุตัวต่อ	0.1 ppm				
1.11 ตะกั่ว	0.2 ppm				
1.12 ทองแดง	5 ppm				
1.13 เหล็ก	15 ppm				
1.14 เฟอร์โนไซยาไนด์	ไม่พบ				

ที่มา : <http://lab.excise.go.th/group1/spirit/scer.htm>

เฟอร์ฟูโรอล (furfural) เป็นผลผลิตได้จากการให้ความร้อนในรายการกลั่นสุรา เมื่อร่วงภายในได้รับเข้าไปจะเกิดการระคายเคืองต่อระบบหายใจและปอด ทำให้เกิดการไอ อาจมีอาการน้ำท่วมปอด และมะเร็งตับ

เอสเทอร์ หรือเอทิล酇ิทีต (ester/ethyl acetate) ละลายน้ำได้ในสัดส่วน 83.1 กวัมต่อน้ำ 1 ลิตร มีจุดเดือดที่ 77.2 องศาเซลเซียส ถ้าร่างกายได้รับเข้าไป จะเกิดอาการปวดหัว มึนง คลื่นไส้ และหมัดสติ มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ ทำการทดสอบโดยวิธี AOAC (1995) ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุราตามประกาศของกระทรวงการคลัง โดยสุราจะเข้าข่ายด้วยมาตรฐานคุณภาพน้ำสุราตามนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นข้อกำหนดบางส่วนของมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไวน์ (มอก.2089-2544) โดยจะทำการตรวจวิเคราะห์ 10 รายการ คือ แรงแอลกอฮอล์ เมทิลแอลกอฮอล์ วัตถุเจือปนในอาหาร ได้แก่ ชัลเฟอร์ไดออกไซด์ กรดเบนโซิก สารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว สารหนู เฟอร์โรไซยาไนด์ ส่วนสุรากลั่นชุมชน จะยึดตามมาตรฐานสุรากลั่นชุมชนตามนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นข้อกำหนดบางส่วนของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุรากลั่น (มอก.2088-2544) โดยจะทำการตรวจวิเคราะห์ 10 รายการ คือ แรงแอลกอฮอล์ คุณลักษณะทางเคมี ได้แก่ พูเชลโอยล์ เฟอร์ฟิวัล เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ เมทิลแอลกอฮอล์ เอทิลคาร์บามेट วัตถุเจือปนในอาหาร ได้แก่ กรดเบนโซิก สารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ ตะกั่ว สารหนู โดยเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ GC , HPLC, AAS และ UV-VIS

สุราส่งผลต่อสุขภาพร่างกายทั้งแบบเฉียบพลัน (acute) ซึ่งจะเกิดการเสียการควบคุมระบบกล้ามเนื้อ (muscular incoordination) (Sullivan, 1995) ระยะเวลาการตัดสินใจช้าลง สมรรถภาพการมองเห็นลดลง ขาดความยับยั้งชั่งใจ มีความกล้ามากขึ้น ขับรถด้วยความประมาท มึนง (stuporous) ยังตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ การหายใจและการเต้นของหัวใจลูกกัด (Johnson, 1995) ประสาทสัมผัสต่าง ๆ จะเสียไป ไม่รู้สึกตัว (unconsciousness) การหายใจช้าลง และอาจเสียชีวิตได้ (บริหารศ ศิลป กิจ, 2542) ผู้ที่ดื่มสุราติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลต่อร่างกายแบบเรื้อรัง ทำให้เกิดการเป็นพิษต่ออวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ดังนี้ เช่น

จากการศึกษาของ Fazakas และคณะ (2005) ที่ศึกษาผลต่อระบบประสาทของการได้รับแอลกอฮอล์ 5% v/v ร่วมกับโลหะหนัก 2 ชนิดคือ proto และตะกั่ว โดยใช้เวลาในการศึกษา 12 สัปดาห์ ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการได้รับแอลกอฮอล์ร่วมกับโลหะหนักมีผลทำให้การเกิดพิษต่อระบบประสาททั้ง central และ/หรือ peripheral neurotoxic มาจากนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Pecze และคณะ (2005) ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการได้รับแอลกอฮอล์ร่วมกับตะกั่ว ที่ส่งผลต่อระบบประสาททั้งแบบเฉียบพลัน และก่อให้ร้องเข่นกัน


ผลต่อไടอลกอฮอล์จะลดการผลิตອอร์โมนแอนต์狄ยูเรติก (antidiuretic hormone) ของต่อมพิทูอิทารี (pituitary) จะทำให้ร่างกายสูญเสียโซเดียมออกมาก ร่างกายจะดูดนำเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดที่ลงมา อาจทำให้เกิดภาวะน้ำเป็นพิษได้ (ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น, 2546)

จากการทดสอบในหมู่พบว่า acetaldehyde ทำให้เกิดการสร้างเซลล์มะเร็ง และทำให้ครอโนโซมในเซลล์พิດปกติ เกิด sister chromatid exchanges และพบว่า acetaldehyde ทำให้เกิดปฏิกิริยาในลักษณะการรวมตัวกันของ DNA เป็น N(2)-ethyl-2'-deoxyguanosine ซึ่งพบปริมาณมากขึ้นในเซลล์ตับของหมูที่ให้กินแอลกอฮอล์ และในเม็ดเลือดขาวของคนที่ดื่มแอลกอฮอล์แบบบันท้าย (alcohol abusers) (Qiu, 2005) และมีการรายงานของศูนย์ IARC กล่าวว่า acetaldehyde ส่งผลทำให้มีความผิดปกติในการตั้งท้องของสัตว์และยังเป็นสารทำให้เกิดมะเร็งในมนุษย์อีกด้วย (IARC, 1984)

เซลล์ตับทำหน้าที่หลายประการ เช่น เกิดขบวนการเมแทบอลิซึมของสารอาหาร สร้างวิตามินสร้างและหลังน้ำดี กำจัดสารพิษที่ได้รับจากภายนอกหรือสร้างจากร่างกายเอง สารหล่ายชนิดที่สร้างจาก

ตับจะถูกขับออกทางท่อน้ำดี การทดสอบตับโดยการตรวจวัดเอนไซม์ที่บ่งชี้ว่ามีการทำลายหรือซ่อมแซมเซลล์ตับการเพิ่มขึ้นของเอนไซม์จะขึ้นกับชนิด ความรุนแรง ระยะเวลาของสิ่งกระตุ้น การเปลี่ยนแปลงค่าเอนไซม์อาจไม่เป็นอักเสบการทำงานตามปกติของตับในช่วงเวลาที่ตรวจได้

ผลต่อตับเนื่องจากตับเป็นแหล่งสันดาปที่สำคัญของแอลกอฮอล์ (รูปที่ 1.1) ดังนั้นตับจึงเป็นอวัยวะที่รับพิษของแอลกอฮอล์มากกว่าอวัยวะอื่น (Naegle and D'Avanzo, 2001) พิษของแอลกอฮอล์จะทำให้เกิดการสะสมไขมันและโปรตีนในตับนำไปสู่โรคตับเหลือง (fatty liver) ตับอักเสบเนื่องจากพิษของสุรา (alcoholic hepatitis) และตับแข็ง (cirrhosis)



รูปที่ 1.1 เมทาบอดีซึมของแอลกอฮอล์ในเซลล์ตับ (ADH pathway)

แอลกอฮอล์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเอนไซม์ในตับ และยังเกี่ยวเนื่องระหว่างปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้รับกับแอลกอฮอล์ที่ซักนำให้เกิดโรคตับ การศึกษาของชาวอิตาลีพบว่าแอลกอฮอล์น่าจะเป็นสาเหตุของการป่วยเป็นโรคตับถึง 23% และพบว่าการวิเคราะห์จำแนกเอนไซม์ตับ จากผลของน้ำหนักตัวหรือการบริโภคแอลกอฮอล์มีความแตกต่างกัน (Duk-Hee, 2001)

รายงานเกี่ยวกับโมเดลหนูแบบใหม่ซึ่งใช้หนูแรทสายพันธุ์ Wistar เพศเมีย โดยได้รับแอลกอฮอล์ปริมาณ 5 g/kg BW ทุก 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่าแอลกอฮอล์สามารถซักนำให้มีการสะสมไขมันมากขึ้น เช่น โรคไขมันอุดตันในเส้นเลือด รวมทั้งทำให้เกิดการอักเสบและการตายของเนื้อเยื่อตับเพิ่มมากขึ้น (Enomoto, 1999)

เอนไซม์ Alanine aminotransferase (ALT) หรือ SGPT การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการซึมผ่านของผนังเซลล์ตับจะเกิดการหลังเอนไซม์ ระดับการเพิ่มขึ้นของเอนไซม์สะท้อนถึงปริมาณของเซลล์ตับที่เสียหาย พบว่าค่าครึ่งชีวิตของ ALT มีค่าเป็นชั่วโมง แต่ในทางคลินิกค่าครึ่งชีวิตจะยาวนานจากปัจจัยอื่นๆ

นอกจาก ALT ยังมีเอนไซม์อีกชนิดคือ Aspartate aminotransferase (AST) หรือ SGOT ซึ่งพบในเซลล์ตับและในเซลล์กล้ามเนื้อด้วย เนื่องจากการอักเสบของกล้ามเนื้อพบได้น้อยในสุนัขและแมว การวัดเอดทิวิติของเอนไซม์ creatine kinase จะบ่งบอกภาวะกล้ามเนื้อดีกว่า ดังนั้น AST จึงสามารถใช้ทดสอบตับได้ด้วย โดย AST มี 2 รูปแบบ คือละลายได้ใน cytosol (Soluble form) หรือจับกับ organelles ภายในเซลล์ (Bound form) ดังนั้นการเปลี่ยนความสามารถในการซึมผ่านของผนังเซลล์ตับจะมีการหลั่ง AST รูป soluble form ออกมาก แต่ถ้าตับถูกทำลายรุนแรงขึ้น จึงจะหลั่ง bound form

ในกรณีที่ตับถูกทำลายอย่างเฉียบพลันจะมีการเพิ่มขึ้นของ enzyme ALT และ AST โดยพบว่า AST จะกลับเข้าสู่ปกติเร็วกว่า ตับมีการผลิตเอนไซม์ alanine aminotransferase (ALT) เมื่อได้รับความเสียหาย บาดเจ็บ หรือเป็นโรคเกี่ยวกับตับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคตับแข็ง และโรคตับอักเสบซึ่งมีสาเหตุมาจากแอลกอฮอล์ ยา หรือไวรัส การวัดปริมาณเอนไซม์ ALT โดยการเจาะเลือดซึ่งเห็นผลภายใน 24 ชั่วโมง จะใช้ร่วมกับการวัดปริมาณเอนไซม์ aspartate aminotransferase (AST) อัตราส่วนของ AST ต่อ ALT บ่งบอกถึงการที่ตับได้รับความเสียหายจากปริมาณของแอลกอฮอล์ (Sydney, 2006)

จากสถิติการป่วยด้วยโรคมะเร็งตับในโรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับข้อมูลเบื้องต้นจากการตรวจวินิจฉัยในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ว่างจำหน่ายในท้องตลาดเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ส่วนใหญ่พบสารพิษในกลุ่มอะซิทาลดีไฮด์เกินค่ามาตรฐานควบคุม เป็นเหตุให้ต้องทำการวินิจฉัยหาสารพิษตกค้างและปนเปื้อนชนิดอื่นร่วมด้วย เพื่อทดสอบผลของการบริโภคสุราที่มีสารพิษเหล่านี้ต่อการทำลายเซลล์ตับในหมู่แรก

วัตถุประสงค์ของการตรวจ

1. เพื่อทราบปริมาณสารพิษตกค้าง และปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์สุรา
2. เพื่อทราบชนิดของจุลินทรีย์ปนเปื้อนอยู่กับบรรจุภัณฑ์สุราที่ไม่ถูกสุขอนามัย
3. เพื่อทราบผลกระทบต่อสุขภาพจากการบริโภคสุราที่มีสารพิษปนเปื้อนในหมู่ทดลอง

2. อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง

2.1 ตัวอย่าง (Samples)

2.1.1 รวบรวมรายชื่อชื่อห้องสุราเช่นสุรากลั่นได้ 96 ชื่อห้องในช่วงเดือนพฤษภาคม 2550 และเดือนธันวาคม 2550 ที่วางจำหน่ายในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ

1. ในเขตตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก
2. สถานประกอบการใกล้กับสถานศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
3. หมู่บ้านที่มีผลิตภัณฑ์ของชุมชน

2.1.2 สุ่มเก็บตัวอย่างสุราจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนที่รวบรวมได้ในแต่ละกลุ่ม ด้วยเทคนิค PPS (Probability proportional to size sampling technique) ซึ่งใช้การสำรวจความนิยมในการบริโภคสุราแต่ละชื่อ (ภาคผนวก ก) โดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ สำหรับตัวอย่างสุรากลุ่มที่ 1 และ 2 คือ สุราในเขตตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก และสุราบริเวณสถานประกอบการใกล้กับสถานศึกษาตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่ 3 สุราชุมชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ค่าความนิยมมาจากข้อมูลสุราที่เสียภาษีตามจำนวนขาด ของสำนักงานสรรพากรสามิติจังหวัดพิษณุโลก (ธันวาคม 2550)

2.1.3 จัดอันดับให้กับสุราแต่ละชื่อห้อยในกลุ่มการทดลองโดยการจับสลาก (ลำดับที่ 1-34, กลุ่ม 1; ลำดับที่ 1-34 กลุ่ม 2; ลำดับ 1-28, กลุ่ม 3) แต่ละกลุ่มจะกำหนดค่าประชากรสะสมเริ่มต้น ก่อนนำไปคำนวณค่าคะแนนค่าสะสมของความนิยมเพื่อหาค่า Sampling Interval (SI) คือ จำนวนประชากรสะสมทั้งหมดหารด้วยจำนวนประชากรที่ถูกเลือกในที่นี่คือ 10 และค่า Random Start (RS) คือค่าประชากรสะสมเริ่มต้น โดยเลือกค่าเริ่มต้นขึ้นมา 1 ค่าและนำไปคำนวณเพื่อหาตัวอย่างที่ถูกเลือกดังนี้ RS, RS+SI, RS+2SI, RS+3SI, RS+4SI, RS+5SI, RS+6SI, RS+7SI, RS+8SI, RS+9SI ซึ่งเป็นการสุ่มที่สมบูรณ์โดยใช้ความลำเอียง

2.2 การวิเคราะห์ทางเคมี (Chemical analysis)

เป็นการวิเคราะห์ทางเคมี และปริมาณสารพิษที่ตกค้างหรือปนเปื้อนอยู่ในตัวอย่างสุราที่ได้รับการสุ่มเก็บ โดยจำแนกประเภทสารพิษเป็น 2 กลุ่มหลักคือ

1. ประเภทสารอินทรีย์ในกลุ่มสารโลหะหนัก คือ Arsenic, Cadmium และ Lead วิเคราะห์ด้วยเทคนิค ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)
2. ประเภทสารอินทรีย์ คือ สารในกลุ่มของ acetaldehydes, methanol, formaldehyde ยืนยันผลด้วยเทคนิค FID และยาฆ่าแมลง 4 กลุ่ม คือ Organophosphate, Carbamate, Organochlorine และ Pyrethroid วิเคราะห์ด้วย GC-MS (Gas chromatography) (ตารางที่ 2.1)

ตารางที่ 2.1 รายการทดสอบยาฆ่าแมลง

กลุ่ม	รายการทดสอบ	กลุ่ม	รายการทดสอบ
Organophosphate group	Methamidophos Mevinphos Diazinon Monocrotophos Dimethoate Pirimiphos-methyl Chlorpyrifos Parathion-methyl Pirimiphos-ethyl Malathion Prothiofos Profenofos triazophos	Organochlorine group	Total BHC - Alpha-BHC - Beta-BHC - Gamma-BHC (lindane) Heptachlor&Heptachlor epoxide Aldrin & Dieldrin Total DDT Total Endosulfan Total Chlordane Endrin Dicofol
Carbamate group	Oxamyl Methomyl Carbaryl Isoprocarb Fenobucarb Methiocarb Total aldicarb Total carbofuran	Pyrethroid group	Bifenthrin Permethrin L-Cyhalothrin Cypermethrin Cyfluthrin Fenvalerate deltamethrin

ตัวอย่างสุราจะถูกซื้อมาจากร้านค้าที่วางขาย เก็บรวบรวมไว้ในห้องควบคุมอุณหภูมิ 25°C และจะไม่ถูกเปิดออกก่อนทำการวิเคราะห์ ซึ่งทำการวิเคราะห์โดยบริษัทห้องปฏิบัติการกลางตรวจสอบผลิตภัณฑ์เกษตร และอาหาร (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยตรวจสอบที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อสนับสนุนการส่งออกและคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย และศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มน้ำคล้ำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมสุรพสามิตร ให้เป็นหน่วยงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพสุรา เช่น และผลิตภัณฑ์รวมทั้งเป็นหน่วยงานตรวจวิเคราะห์สุราคลั่นชุมชน

2.3 การทดสอบทางจุลชีววิทยา (Microbial test)

2.3.1 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ (Media preparation)

ใช้สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ Nutrient Agar (NA) เป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงเชื้อบakteri ไว้ใน 1 ลิตร ประกอบด้วย Beef extract 3 g, Peptone 5 g, Agar 15 g แบ่งน้ำกลั่นออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 500 ml ละลาย Peptone และ beef extract ลงในน้ำส่วนที่หนึ่ง นำน้ำส่วนที่สองไปต้มกับหัวหนองละลายดีแล้ว จึงนำทั้งสองส่วนผสมมาเทปนกัน เติมน้ำกลั่นที่ขาดหายไปจากการระเหยจนครบ 1000 ml

2.3.2 ทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ที่อยู่รอบ ๆ ปากชุดบรรณาธิการ โดยใช้สำลีป้ายรอบคอขาด 2-3 รอบ แล้วนำสำลีนั้นไปสัมผัสกับอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้ และนำไปบ่มในตู้บ่มเชื้อ เพื่อตรวจนับชนิด และปริมาณเชื้อจุลินทรีย์

2.3.3 การย้อมสี Gram จะแบ่งแบคทีเรียออกเป็น 2 พาก ซึ่งขึ้นอยู่กับการติดสี แบคทีเรียที่ติดสี crystal violet (สีน้ำเงินหรือม่วง) หลังจากการล้างด้วยแอลกอฮอล์เรียกว่า "Gram-positive" ส่วนพากที่ไม่ติดสีของ crystal violet แต่ติดสีที่ย้อมทับ (Counter stain) ของ Safranin (สีแดง) เรียกว่า Gram-negative
วิธีการย้อมแกรม

1. สเมียร์ (smear) เชื้อที่ป้ายจากรอบ ๆ ปากชุดบรรณาธิการบนสไลด์ ทิ้งไว้ให้แห้ง นำแผ่นสไลด์ผ่านเปลวไฟอย่างเร็ว โดยให้ด้านที่มีแบคทีเรียอยู่ด้านบน ระวังอย่าให้แผ่นสไลด์ร้อนจนเกินไป การลนไฟเพื่อให้เซลล์ของแบคทีเรียติดแน่นอยู่บนแผ่นสไลด์ระหว่างขั้นตอนการย้อมสี

2. หยดสารละลาย Crystal violet ให้ท่วมเซลล์แบคทีเรียทั้งใบหน้า 1 นาที เทสารละลายออก ใช้น้ำล้างสีย้อมเบา ๆ จนไม่มีสีย้อมละลายออกไปกับน้ำอีก

3. หยดสีย้อม Lugol's iodine ให้ท่วม ทิ้งไว้ 1 นาที ล้างน้ำอีกครั้ง ซับให้แห้ง

4. หยด ethyl alcohol 95% ลงบนเซลล์แบคทีเรีย 2 – 3 วินาที (อย่าให้นานเกิน 30 วินาที) ซับแผ่นสไลด์ให้แห้ง

5. หยดสีย้อม Safranin O ทิ้งไว้นาน 20 วินาที ล้างน้ำอีกครั้ง แล้วซับแผ่นสไลด์ให้แห้ง ตรวจสอบแบคทีเรียโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ชนิด compound microscope กำลังขยาย 1,000 เท่า โดยใช้ oil immersion แบคทีเรียแกรมบวกจะติดสีฟ้าม่วง ส่วนแกรมลบจะติดสีแดงอมชมพู

การเตรียมสีในการย้อมแกรม

1. Ammonium oxalate crystal violet

เตรียมสารละลาย Gram's crystal violet และ Ammonium oxalate ผสมเข้าด้วยกัน โดยวิธีการเตรียมทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.1 เตรียม Gram's crystal violet ทำการละลาย Crystal violet 2.0 กรัม ในเอทิลแอลกอฮอล์ 20 มิลลิลิตร

1.2 เตรียม Ammonium oxalate น้ำ Ammonium oxalate, C.P 0.8 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 80 มิลลิลิตร

เมื่อได้ทั้ง Gram's crystal violet และ Ammonium oxalate แล้ว จากนั้นให้ผสมสารละลายทั้งสองเข้าด้วยกันและคนให้เข้ากัน

2. สารละลายไอโอดีน โดยชั้ง Iodine, C.P 1.0 กรัม และ Potassium Iodide, C.P (KI) 2.0 กรัม ละลายในน้ำกลั่น 300.0 มิลลิลิตร

3. สารละลาย Safranin โดยชั้ง Safranin 0.25 กรัม ละลายในเอทิลแอลกอฮอล์ 10 มิลลิลิตร น้ำกลั่น 100 มิลลิลิตร ทำการคนให้เข้ากัน จากนั้นกรองผ่านกระดาษกรองเอาแต่ส่วนที่เป็นของเหลวสีแดงไปใช้

2.3.4 การใช้กล้อง SEM (Scanning Electron Microscope) วัดขนาดโคโลนีทั้ง 3 สี

2.3.5 การทดสอบเชื้อทางชีวเคมี

1. การทดสอบ gelatin liquefaction
2. การทดสอบความทนต่อ 1% acetic acid
3. การทดสอบ urea hydrolysis
4. การทดสอบการสร้าง extracellular amyloid compound
5. การทดสอบความสามารถในการเจริญบน 50% glucose medium
6. การทดสอบความสามารถในการเจริญบน 10% NaCl plus 5% glucose medium
7. การทดสอบการทำปฏิกิริยากับ fast blue B salt หรือ Diazonium Blue B
8. การทดสอบความสามารถในการหมักคาร์บอไฮเดรต

2.4 การทดสอบทางชีวภาพในหนู Wistar rat

2.4.1 การเติร์ยมสารประกอบสุราปนเปื้อนสารพิษที่จัดทำขึ้น (artificial alcohol) โดยทำการผสมเอทิลแอลกอฮอล์ ร่วมกับสารพิษในปริมาณเท่าที่วิเคราะห์พบสูงสุดในตัวอย่างสุรา (ตารางที่ 2.2) และใช้ตัวอย่างสุราจริง 2 ยีห้อซึ่งเป็นตัวแทนของสุราที่ผลิตในประเทศไทย แม่โจง และตัวอย่างสุรานำเข้าจากต่างประเทศคือ Black label เหตุที่ใช้ 2 ยีห้อนี้คือ การตรวจพบปริมาณสารอะซิทัลเดไฮด์ (Acetaldehyde) สูงสุด และสูงรองตามลำดับ

2.4.2 การทดสอบในหนูเพศผู้ (Wistar rat) อายุ 5 สัปดาห์ อุณหภูมิในช่วงวัยรุ่น (น้ำหนักระหว่าง 121-160 กรัม) ใช้หนูทดลอง 8 ตัวต่อกลุ่ม (หั้งหมด 9 กลุ่ม) ระยะเวลาศึกษานาน 3 เดือน สำหรับศึกษาการก่อพิษแบบกึ่งเรื้อรัง (Sub-chronic) และใช้หนู 10 ตัวต่อกลุ่ม ใน 9 กลุ่มทดลองเข่นกัน (ตารางที่ 2.2) เป็นเวลานาน 6 เดือนสำหรับการก่อพิษแบบเรื้อรัง (Chronic) หนูทดลองได้รับสารประกอบสุราที่ป่นเปื้อนสารพิษที่จัดทำขึ้น (artificial alcohol) ใช้ความเข้มข้นของเอทิลแอลกอฮอล์ 35% (v/v) หรือ 1.95 g/Kg BW/day ปริมาตรที่ให้ 7.0 ml/Kg BW/day ให้วันละ 1 ครั้ง และใช้วิธีป้อนแบบส่งตรงถึงกระเพาะอาหาร (gavage)

ตารางที่ 2.2 กลุ่มสัตว์ทดลองลักษณะของการเกิดพิษแบบกึ่งเรื้อรัง (subchronic) และแบบเรื้อรัง (chronic) จากการบริโภคสุราที่มีสารพิษตกค้างและปนเปื้อน ในหนูเพศผู้ (Wistar rat) อายุ 5 สัปดาห์ น้ำหนักตัว (121-160 กรัม)

กลุ่มสัตว์ทดลอง (กลุ่มละ 8-10 ตัว)	ชนิดของสารพิษที่ให้ (9 กลุ่ม)	ลักษณะการ ให้สารพิษ	ระยะเวลาของการติด ตามผลกระทบต่อตับ
กลุ่มบริโภคปริมาณสูง 1 (heavy alcohol Consumption)	1. สารประ kob สุราที่ ตกค้างและปนเปื้อน สารพิษผสมที่จัดทำขึ้น (artificial alcohol)	ทุกวัน (gavage)	ทำการวิเคราะห์ระดับ ของเอนไซม์ตับในช่วง 2 ชนิด คือ AST และ ALT วัดปริมาณน้ำตาล และ สารเคมีอื่นๆ
กลุ่มบริโภคปริมาณสูง 2 (control) (heavy alcohol Consumption) สุราผสมสารพิษสูง 2 ระดับ ที่ จัดทำขึ้น (artificial alcohol)	2. Acetaldehyde สูงสุด	ทุกวัน (gavage)	ระยะเวลาเมื่อสิ้นสุด เดือนที่ 3 และ 6
	3. Acetaldehyde สูงรอง	ทุกวัน (gavage)	
กลุ่มบริโภคปริมาณสูง 2 (heavy alcohol Consumption) สารประ kob สุราที่มีสารพิษตกค้าง และปนเปื้อนสารพิษสูงสุด (ตัวอย่างสุราจริง) 2 ยี่ห้อ	4. Acetaldehyde สูงสุด (แม่ใจ)	ทุกวัน (gavage)	
	5. Acetaldehyde สูงรอง (Black label)	ทุกวัน (gavage)	
กลุ่มบริโภคปริมาณปานกลาง (medium alcohol Consumption)	6. สารประ kob สุราที่ ตกค้างและปนเปื้อน สารพิษที่จัดทำขึ้น	4 วันต่อสัปดาห์ (gavage)	
	น้ำกลั่น	3 วันต่อสัปดาห์	
กลุ่มบริโภคปริมาณน้อย (low alcohol Consumption)	7. สารประ kob สุราที่ ตกค้างและปนเปื้อน สารพิษที่จัดทำขึ้น	1 วันต่อสัปดาห์ (gavage)	
	น้ำกลั่น	6 วันต่อสัปดาห์	
กลุ่มควบคุม 1 (control 1)	8. เอทานอล 32% V/V *	ทุกวัน (gavage)	
กลุ่มควบคุม 2 (control 2)	9. น้ำกลั่น	ทุกวัน	

2.4.3 เมื่อครบกำหนดเวลา 3 และ 6 เดือน จะทำให้หนูตายโดยใช้ก้าซคาร์บอนไดออกไซด์ และดูดเลือดออกจากหัวใจ ก่อนผ่าເຂົາວໜ້ວຍວະກາຍໃນແຍກເກີບໃນໂຕຣເຈນເຫລວ ແລະແຂ່ຟອ່ວມາລືນໄວ້

ดำเนินการวิจัยโดยมีเอกสารรับรองการทำการวิจัยในสัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้การดูแล และความร่วมมือกับสำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศala ya จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่การเตรียมหนูทดลองและการทดสอบเบื้องต้น ก่อนทำการทดลองจริงระหว่างเดือนพฤษภาคม และเดือนตุลาคม

2551

ปริมาณแคลอรีขอสูตรที่ให้กับหนู เท่ากับ 2.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ซึ่งเป็นปริมาณที่ระบุในการศึกษาของ Pecze et al (2005) และอยู่ในช่วงมาตรฐานของการบริโภคน้ำหนักที่ 10 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน (Harkness and Wagner, 1989; Olfert et al., 1993) และเป็นปริมาณที่สอดคล้องกับปริมาณที่ระบุไว้ในงานวิจัยของ Gupta and Gill (2000) คือ 1-5 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

3. ผลการทดลอง

3.1 ผลการสุ่มตัวอย่างสุรา

3.1.1 ผลการสุ่มตัวอย่างสุราภัณฑ์ที่ 1 สุราในเขตตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก

ค่า Sampling Interval (SI) คือจำนวนประชากรสะสมทั้งหมด (657) หารด้วยจำนวนประชากรที่ถูกเลือก (10) เท่ากับ 65.7 ค่า Random Start (RS) ที่ถูกเลือกคือ 59 ฉะนั้นสุราที่ถูกเลือกตามลำดับคือ 59, 59+65.7, 59+(2x65.7), 59+(3x65.7), 59+(4x65.7), 59+(5x65.7), 59+(6x65.7), 59+(7x65.7), 59+(8x65.7), 59+(9x65.7) หรือ 59, 125, 191, 257, 323, 389, 455, 521, 587 และ 653 ตามลำดับ (ตารางที่ 3.1)

ตารางที่ 3.1 แสดงค่าสะสมความนิยมการบริโภคสุราภัณฑ์ที่ 1 ในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	ยี่ห้อสุรา	ค่าสะสม	คัดเลือก	ลำดับ	ยี่ห้อสุรา	ค่าสะสม	คัดเลือก
1	Red lable	26		18	Blue egle	367	
2	Ben more	61	59	19	Black lable	387	389
3	เชียงชุน	75		20	ลีโอด	409	
4	Blend 285	118		21	เบียร์เชียร์	423	
5	swing	132	125	22	ไอกเนกัน	443	
6	Troopers	146		23	Dewar's	452	
7	ไทรเบียร์	158		24	John master	465	455
8	Ballantine's	164		25	มังกรทอง	483	
9	Regency	188		26	100 Piper	544	521
10	William lawson's	203	191	27	Jack daniel's	551	
11	หงส์ทอง	230		28	Golden knight	565	
12	สุราโรงงาน 40 ดีกรี	250		29	แม่โขง	583	587
13	Spay royal	268	257	30	Chevaz legal	600	
14	แสงโสม	292		31	Cooper	608	
15	สิงห์	312		32	Red suntory	619	
16	Master blend	332	323	33	อาชา	638	
17	ช้าง	352		34	Clown 99	657	653

3.1.2 ผลการสุ่มตัวอย่างสุ่วากลุ่ม 2 สุราบิเวณสถานประกอบการรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร
ค่า Sampling Interval (SI) คือจำนวนประชากรสะสมทั้งหมด (10137) หารด้วยจำนวนประชากรที่ถูกเลือก (10) เท่ากับ 1013.7 ค่า Random Start (RS) ที่ถูกเลือกคือ 939 ฉะนั้นสุราที่ถูกเลือกตามลำดับคือ 59, 59+65.7, 59+(2x65.7), 939+(3x1013.7), 939+(4x1013.7), 939+(5x1013.7), 939+(6x1013.7), 939 +(7x1013.7), 939 +(8x1013.7), 939 +(9x1013.7) หรือ 939, 1953, 2967, 3981, 4995, 6009, 7023, 8037, 9051 และ 10065 ตามลำดับ (ตารางที่ 3.2)

ตารางที่ 3.2 แสดงค่าสะสมความนิยมการบริโภคสุรากลุ่มที่ 2 บริเวณสถานประกอบการรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร

ลำดับ	ยี่ห้อสุรา	ค่าสะสม	คัดเลือก	ลำดับ	ยี่ห้อสุรา	ค่าสะสม	คัดเลือก
1	แม่โขง	279		18	Blue egle	5403	
2	Blend 285	547		19	Master blend	5707	
3	ซัง	948	939	20	SangSom	6051	6009
4	Cooper	1225		21	Regency	6326	
5	มักราทอง	1508		22	ลีโอด์	6760	
6	ไชนาเก้น	1802		23	Chevaz legal	7027	7023
7	Blend 285	2130	1953	24	Jack daniel's	7303	
8	แสตนด์	2394		25	John master	7572	
9	Golden knight	2662		26	สุราโรงงาน 40 ดีกรี	7879	
10	William lawson's	2919		27	สยามสาโท	8146	8037
11	เชียงชุน	3174	2967	28	Spay royal	8436	
12	100 Piper	3664		29	Clown 99	8700	
13	สิงห์	3985	3981	30	Black lable	9011	
14	swing	4250		31	เบียร์เชียร์	9286	9051
15	Ben more	4630		32	อาชา	9579	
16	Dewar's	4885		33	Ballantine's	9838	
17	Troopers	5140	4995	34	Red lable	10137	10065

3.1.3 ผลการสุ่มตัวอย่างสุ่วากลุ่ม 3 สุราษฎร์ธานีเขตcombeoเมืองจังหวัดพิษณุโลก
ค่า Sampling Interval (SI) คือจำนวนประชากรสะสมทั้งหมด (15400) หารด้วยจำนวนประชากร
ที่ถูกเลือก (10) เท่ากับ 1540 ค่า Random Start (RS) ที่ถูกเลือกคือ 809 ฉะนั้นสุราที่ถูกเลือกตามลำดับ
คือ 809, 809 +65.7, 809 +(2x65.7), 809 +(3x1013.7), 809 +(4x1540), 809 +(5x1540), 809

+(6x1540), 809 +(7x1540), 809 +(8x1540), 809 +(9x1540) หรือ 809, 2349, 3889, 5429, 6969, 8509, 10049, 11589, 13129 และ 14669 ตามลำดับ (ตารางที่ 3.3)

ตารางที่ 3.3 แสดงค่าสะสมความนิยมการบริโภคสุรากลุ่มที่ 3 สุราชุมชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลจากสำนักงานสภาพสमมติตรวจหัวดพิษณุโลก (มีนาคม 2550)

ลำดับ	ยี่ห้อสุรา	ค่าสะสม	คัดเลือก	ลำดับ	ยี่ห้อสุรา	ค่าสะสม	คัดเลือก
1	ຈະເຂົ້າ	200		15	ໄວນ໌ຈຸຫາຮສ (ກະຈາຍດຳ)	6500	
2	ເທວາ	800		16	ສາມແຜ່າ	8500	6969
3	ໄທຢແທ້	1000	809	17	ຂ້າວໄທຍ	9500	8509
4	Songkwe Wine	1100		18	ຈະເຂົ້າ	9700	
5	ໂຄໄທ	2200		19	ກວາງແຮນເດີຍົງ	10900	10049
6	ແມ່ຍມ	2700	2349	20	ໜອນພູຍາຍອ	11000	
7	ລະເອີຍດໄວນ໌ໄທຍ (ກະເຈື້ຍບ)	2900		21	ລະເອີຍດໄວນ໌ໄທຍ (ເຕາວລົມເບຣີຢູງ)	11200	
8	ໄວນ໌ຈຸຫາຮສ (ກະແໜ່ງ)	3250		22	ໜ່າທອງ	11800	11589*
9	ໄປໂພຣິເຈິນ	4150	3889	23	ແສງທອງ	12300	
10	ແມ່ຍມ	4350		24	ທ່າທອງ	13100	
11	ໄກຄູ່	4550	5429	25	ສູຮາຂາວ 40 ຕີກີ່	13400	13129*
12	ຕັນໂພຣີ	4750		26	ກວາງແຮນເດີຍົງ	13800	
13	ໄກຄູ່	6250	4995	27	ເທວາ	14900	14669
14	ໜອນພູຍາຍອ	6350		28	ທຸ່າທອງ	15400	

3.2 ผลการวิเคราะห์สารพิษในสุรา

จากการวิเคราะห์ปริมาณสารโลหะหนักในกลุ่มของ Asenic, Cadmium และ Lead ไม่พบแคดเมียมในตัวอย่างสุราทุกยี่ห้อ แต่พบ Arsenic และ Lead เพียงเล็กน้อยในบางตัวอย่าง ปริมาณ Arsenic ที่พบสูงสุด 0.0084 mg/l ในเบียร์ช้าง และพบ Lead สูงสุด 0.11 mg/l ในสุรากลันชุมชนໄທຢແທ້ ส่วนสารอินทรีย์ระเหยง่ายไม่พบ formaldehyde แต่พบ acetaldehyde ปริมาณสูงสุด 690.22 mg/l ในแม่ใจ และพบ methanol ปริมาณสูงสุด 108.27 mg/l ใน spay royal นอกจากนี้ไม่พบยาฆ่าแมลงทั้ง 4 กลุ่ม คือ Organophosphate, Carbamate, Organochlorine และ Pyrethroid ในทุกยี่ห้อ (ตารางที่ 3.4)

ตารางที่ 3.4 ผลการวิเคราะห์สารพิษปนเปื้อนในสุราทั้ง 3 กลุ่ม

กลุ่ม	ยี่ห้อสุรา	Acetaldehyde (mg/l)	Formaldehyde (mg/l)	Methanol (mg/l)	Arsenic (mg/l)	Cadmium (mg/l)	Lead (mg/l)
A1	Ben more	231.21	ND	87.85	ND	ND	ND
A2	swing	392.323	ND	91.3	ND	ND	ND
A3	William lawson's	161.81	ND	33.5	ND	ND	ND
A4	Spay royal	113.60	ND	108.27	ND	ND	ND
A5	Master blend	93.37	ND	ND	ND	ND	ND
A6	Black lable	309.9	ND	30.1	ND	ND	ND
A7	John master	52.99	ND	8.1	ND	ND	ND
A8	100 Piper	140.69	ND	22.5	ND	ND	ND
A9	แม่โขง	690.22	ND	11.1	ND	ND	ND
A10	Clown 99	127.82	ND	23.34	ND	ND	ND
B1	ข้าว	<10.00	ND	ND	0.0084	ND	ND
B2	Blend 285	59.17	ND	15.03	ND	ND	ND
B3	เชียงวน	260.98	ND	20.28	ND	ND	ND
B4	สิงห์	ND	ND	MD	<0.006	ND	ND
B5	Troopers	189.2	ND	17.1	ND	ND	ND
B6	SangSom	<20.00	ND	15.26	ND	ND	ND
B7	Chevass legal	214.65	ND	30.9	ND	ND	ND
B8	สยามสาโท	122.57	ND	ND	ND	ND	ND
B9	เบียร์เชียร์	45.74	ND	ND	<0.006	ND	ND
B10	Red lable	164.48	ND	56.48	ND	ND	ND
C1	ไทยแท้	373.28	ND	51.49	ND	ND	0.11
C2	แม่ยม	408.8	ND	42.73	ND	ND	ND
C3	ใบโพธิเงิน	269.96	ND	75.46	ND	ND	0.0084
C4	ไก่คุ่	321.88	ND	58.26	ND	ND	ND
C5	สามเณร	226.1	ND	14.23	ND	ND	<0.0060
C6	ข้าวไทย	545.61	ND	63.01	<0.006	ND	ND
C7	กวางแวนเดียร์	319.65	ND	<5	ND	ND	ND
C8*	หนองทอง	37.68	ND	<5	ND	ND	ND
C9*	สุราขาว 40 ดีกรี	199.26	ND	25.6	ND	ND	ND
C10	เทวา	245.13	ND	35.21	ND	ND	0.0079
	mean	234 ± 155		40 ± 28			
	Range	0 - 690		0 - 108			

หมายเหตุ * ตัวอย่างสุรา C8 และ C9 เป็นผลิตภัณฑ์สุราชุมชน ได้ถูกบันทึกไว้ในขบวนรวมรายชื่อ เพื่อทำการสูม แต่โรงงานเปิดไปก่อนการเก็บตัวอย่างสุราจะเริ่มนี้ จึงนำสุราชนิดที่มีการบริโภคสูง 2 ยี่ห้อมาทดสอบคือ ทรงทอง และสุราขาว 40 ดีกรี

ND = not detected

LOD (Limit of Detection) for formaldehyde and acetaldehyde = 4 mg/L

LOD (Limit of Detection) for methanol 10 mg/L

LOQ (Limit of Quantification) of acetaldehyde and formaldehyde = 10 mg/L

3.3 ผลการทดสอบทางจุลชีววิทยา (Microbiological test)

เชื้อจุลทรรศน์ที่ปนเปื้อนรอบปากขวดสุรา (รูปที่ 3.1) ส่วนใหญ่เป็นขาดของผลิตภัณฑ์สุราชุมชนพบจำนวนโคโลนีสีขาว เหลือง และส้ม ดังตารางที่ 7 โดยเฉพาะสุราแม่ยมจะพบโคโลนีทั้ง 3 ชนิดในปริมาณมากที่สุด (ตารางที่ 3.5) โคโลนีเหล่านี้จะถูกนำมาไว้วัดขนาดโคโลนีด้วยกล้อง SEM พบว่าโคโลนีสีขาว ($1.489 \times 0.884 \mu\text{m}$) สีเหลือง ($0.744 \times 0.549 \mu\text{m}$) และสีส้ม ($0.772 \times 0.707 \mu\text{m}$) มีขนาดแตกต่างกัน (รูปที่ 3.2) เมื่อนำไปทดสอบทางชีวเคมี (ภาชนะที่ 7 และตารางที่ 3.6) เพื่อจัดจำแนกเชื้อที่พบ


ตารางที่ 3.5 จำนวนโคโลนีจากการเพาะเชื้อรอบปากขวดสุรา

ยี่ห้อสุรา	จำนวนโคโลนี			หมายเหตุ
	ขาว	เหลือง	ส้ม	
Clown 99	1	-	-	
Chevaz legal	1	-	1	
สยามสาโท	2	-	-	
ไทยแท้	4	-	2	
แม่ยม	23	21	14	โคโลนีสีขาวชุน
ใบโพธิ์เงิน	43	-	-	
ไก่คู่	43	-	-	
สามเณร	34	-	-	
ข้าวไทย	27	-	-	
กว้างเรนเดียร์	10	-	-	




รูปที่ 3.1

ลักษณะโคโลนีที่ตรวจพบรอบปากขวดบรรจุสุรายีห่อแม่ยม



(a)

(b)



(c)

รูปที่ 3.2

ขนาดโคโลนีที่วัดด้วยกล้อง SEM (Scanning Electron Microscope)

(a) โคโลนีสีขาว (b) โคโลนีสีเหลือง (c) โคโลนีสีเข้ม

ตารางที่ 3.6 ผลการทดสอบทางชีวเคมีพิเศษในกลุ่ม Streptococci


Test	Enterococcus				Non – Enterococcus	
	E.faecalis	E.faecium	E. durans	E.gallinarum	S.bovis 1	S.bovis 2
Bile-esculin	+	+	+	+	+	+
6.5% NaCl	+	+	+	+	-	-
Haemolysis	$\gamma(\beta)$	$\gamma(\infty)$	$\gamma(\infty,\beta)$	$\gamma(\infty,\beta)$	$\gamma(\infty)$	$\gamma(\infty)$
Arabinose	-	+	-	+	-	-
Mannitol	+	+	-		+	-
Sorbitol	+	-(+)	-	-	-	-
Motility	-	-		+		

การทดสอบหาเชื้อจุลินทรีย์ (bacteria, yeasts, molds) ที่มีการปนเปื้อนบริเวณปากช่องบรรจุภัณฑ์สูราที่ได้รับการสูบหั่งหมด พบร่วมกับเชื้อจุลินทรีย์ส่วนใหญ่จากสุรากลุ่ม 3 ผลิตภัณฑ์ชุมชน วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบคือ การขยี้อนสีแกรม การทดสอบทางชีวเคมี และการถ่ายภาพด้วยกล้อง SEM (Scanning Electron Microscope) สามารถจำแนกเชื้อที่พบได้ 4 ชนิดคือ *Staphylococcus coagulase negative*, *Micrococcus spp.*, *Streptococcus nonenterococci* และ *Candida spp.*


3.4 ผลการทดสอบทางชีวภาพในหนู Wistar Rat

ผลการทดสอบความเป็นพิษแบบกึ่งเรื้อรัง หลังจากป้อนสุราร่วมกับสารพิษในหนูทดลองเป็นระยะเวลา 3 เดือน

3.4.1 ผลการตรวจเลือดทางด้านเคมีคลินิก
พบรความแตกต่างในแต่ละกลุ่มการทดลองของปริมาณเอนไซม์ในตับ ได้แก่ ALP, ALT, AST และสัดส่วนของเอนไซม์ ALT/AST อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (รูปที่ 3.3) นอกจากนี้ยังพบรความแตกต่างของปริมาณกลูโคส (รูปที่ 3.4) อย่างมีนัยสำคัญด้วย แต่ไม่พบรความแตกต่างของปริมาณ Triglyceride, Cholesterol, BUN, T.Bili, Globulin, Albumin, Uric acid และ Total protein




รูปที่ 3.3 สัดส่วนเอนไซม์ ALT/AST ในตับ




รูปที่ 3.4 ระดับกลูโคสในเลือด

3.4.2 ผลของสัดส่วนน้ำหนักตับต่อน้ำหนักตัว พ布ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จากรูปที่ 3.5 จะเห็นว่า การได้รับแอลกอฮอล์อย่างเดียวทุกวัน จะมีผลทำให้ขนาดตับใหญ่ขึ้น




รูปที่ 3.5 สัดส่วนน้ำหนักตับต่อน้ำหนักตัว

3.4.3 ผลของเซลล์สีบพันธุ์ หนูที่ได้รับแอลกอฮอล์ร่วมกับสารพิษ และสุราจริง ทุกวันจะมีจำนวนเซลล์สีบพันธุ์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (รูปที่ 3.6) และการเคลื่อนไหวของตัวเซลล์สีบพันธุ์ก็ช้าลง มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มการทดลองอย่างมีนัยสำคัญ เช่นกัน (รูปที่ 3.7)



รูปที่ 3.6 จำนวนความเข้มข้นของเซลล์สีบพันธุ์



รูปที่ 3.7 ความสามารถในการเคลื่อนที่ของเซลล์สีบพันธุ์

B = เซลล์สีบพันธุ์มีการเคลื่อนไหวทั้งหัวและหาง

C+D = หัวหรือหางเซลล์สีบพันธุ์มีการเคลื่อนไหว

4. วิจารณ์ผลการทดลอง

4.1 การตรวจวิเคราะห์สารพิษปนเปื้อนในสุรา

จากการวิเคราะห์ของบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือได้ว่าเป็น reference lab พบว่า Aldehyde ในรูปของ acetaldehyde ของตัวอย่างสุราส่วนใหญ่ที่นำมาตรวจสอบ พบว่ามีค่าสูงเกินมาตรฐานอุตสาหกรรมสุรากลั่น (มอก. 2088-2544) ซึ่งระบุไว้ไม่เกิน 160 mg/l ขณะเดียวกันได้ส่งตัวอย่างเดียวกันไปวิเคราะห์ใหม่ ที่ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ม.ขอนแก่น ซึ่งที่นี่ได้รับอนุญาตจากกรมสรรพาณิชให้เป็นผู้ตรวจสอบมาตรฐานสุรากลั่นทุกชน ผลปรากฏว่าตัวอย่างสุราทุกชนิดกลับมีค่าต่ำกว่ามาตรฐานทุกยี่ห้อ จากความแตกต่างของค่าที่วิเคราะห์ได้จากทั้ง 2 แห่งนี้มีค่าสูงมาก ดังนั้นจึงให้ทั้ง 2 ห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ใหม่อีกครั้งเพื่อยืนยันผล ปรากฏว่าได้ผลเหมือนเดิม (ตารางที่ 4.1) เนื่องจาก acetaldehyde เป็นสารระเหยง่าย จึงเป็นไปได้ว่าวิธีการเตรียมตัวอย่างก่อนส่งเข้าเครื่องวิเคราะห์ และวิธีการวิเคราะห์ จะต่างกันทำให้ค่าที่วิเคราะห์ออกมาเป็นไปในทางเดียวกันทั้งๆด

ตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์ Acetaldehyde ในตัวอย่างสุราเบริ่ยบเทียบระหว่าง 2 ห้องปฏิบัติการ

ตัวอย่างสุรา	Acetaldehyde [mg/L] [บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด]	Acetaldehyde [mg/L] [ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่ม มูลค่าผลิตภัณฑ์ฯ มข.]
สุราขาว 40 ดีกรี (บางปี้ชั่น)	199.26	23.4
Troopers	189.20	17.9
กว้างเงวนเดียร์	319.65	54.3
Chevaz Regal	214.65	34.5
Red label	164.48	25.1
William lawson's	161.81	30.1
แม่โขง	690.22	110.0
สยามสาโท	122.57	49.5
เชียงชูน	260.98	20.6
Black label	309.93	39.0
Ben more	231.21	19.5
100 Piper	140.69	19.0
RSD (%)	13.68	14.2
LOD (mg/L)	4	2
method	GC-FID	GC

mean	250 ± 151	37 ± 26
Range	123 - 690	18 – 110
Number (n)	12	12

จากข้อมูลที่ต่างกันดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยได้ติดต่อกับกรมวิทยาศาสตร์บิวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้อง แต่ทางสถาบันแจ้งว่ายังไม่เคยวิเคราะห์สารตัวนี้มาก่อน จำเป็นต้องศึกษาและใช้เวลานานพอสมควรประมาณ 3 เดือน ต่อมาได้ปรึกษากับทาง สาขาวช. ซึ่งที่นี่รับวิเคราะห์สารระเหยง่าย acetaldehyde และ formaldehyde ที่มีอยู่ในอากาศ แต่สามารถปรับให้มาวิเคราะห์ในของเหลวได้ ทางผู้วิจัยของ สาขาวช. จึงสนใจจะทำวิจัยเชิงคุณภาพให้ โดยเสนอที่จะวิเคราะห์ด้วย HPLC เพราะจะให้ความไว (sensitivity) และความเสถียรในการวิเคราะห์มากกว่า GC สามารถวิเคราะห์ได้ค่า LOD ต่ำกว่า 1 mg/l เพราภารวิเคราะห์สารระเหยง่ายที่ทำให้อยู่ในสภาวะของเหลว ก่อน จะเสถียรกว่าการวิเคราะห์ในสภาวะก๊าซ รวมทั้งการเตรียมตัวอย่างที่จำเป็น ต้องเติมสารเคมีบางชนิดในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อทำให้สารระเหยง่ายที่ต้องการวิเคราะห์มีความเสถียรก่อนการวิเคราะห์ ก็เป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งจากการสอบถามทางศูนย์วิจัยการมะกอกของ มข. ยังไม่ได้ระวังในฤดูนี้ แต่ทางศูนย์ฯ กำลังตรวจสอบคุณภาพการวิเคราะห์อย่างเร่งด่วนเข่นกัน

จากการสืบค้นข้อมูล พบร่วมกับการตรวจสอบปริมาณ acetaldehyde ในสุราหล่ายชนิดทั้งในยุโรป และบร้าซิล พบร่วมกับสุราของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกันของปริมาณ acetaldehyde ค่อนข้างมาก (ตารางที่ 4.2) ในอดีตขั้นตอนการวิเคราะห์ และการรายงานผลยังไม่ครอบคลุมนัก จนกระทั่งปี 2000-2008 ที่ทาง Lachenmeier and Sohnius (2008) ได้ทำการสำรวจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ปี 2000-2008 ที่วางแผนทั้งปี จำกัดอยู่ในร้านค้าของประเทศสาธารณรัฐเยอรมันนี มีทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศและสุรานำเข้าจากทางเอเชียและอเมริกาใต้หลายยี่ห้อถูกรวบรวมได้มากกว่า 1500 ชนิด เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปริมาณ acetaldehyde เนื่องจากความเป็นพิษของ acetaldehyde มีผลไปทำลายสารพันธุกรรม DNA ก่อให้เกิดการกลายพันธุ์และเป็นสารก่อมะเร็งสำหรับผู้ดื่ม ซึ่งไม่พบความแตกต่างของปริมาณ acetaldehyde ในสุราและสุราภัณฑ์ หากคำนวนปริมาณ acetaldehyde ต่อปริมาณ ethanol คลบบิสุธิ

Miyake and Shibamoto (1993) พบร่วมกับปริมาณ acetaldehyde ในเบียร์อยู่ในช่วง 5-12 mg/l ไวน์ 33-66 mg/l และวิสกี้ 25-102 mg/l ส่วน Lachenmeier และ Sohnius (2008) ตรวจพบสุราภัณฑ์ที่มาจากเชียร์มีปริมาณ acetaldehyde สูงมาก เช่น ที่มาจากประเทศจีนตรวจพบ 620 mg/l เหตุที่สูงอธิบายได้เนื่องจากยีสต์ที่ใช้ทำให้เกิดการสะสมของ acetaldehyde ในระหว่างการหมัก และการกลั่นน้ำ釀ที่ไม่สามารถแยก acetaldehyde ที่มีปริมาณสูงออกໄไป ส่วนสุราภัณฑ์จากประเทศบร้าซิล ที่ผลิตจากกากน้ำตาลพบ acetaldehyde ปริมาณ 52 - 328 mg/l (Miranda et al., 2007) มาตรฐานควบคุมของบร้าซิลต่างกว่าของไทยคือ 120 mg/l

Acetaldehyde จะถูกผลิตขึ้นจากเซลล์ยีสต์ในกระบวนการหมัก醪糟 และแบคทีเรียที่ป่นเปี้ยนในขณะหมัก เช่น acetic acid bacteria นอกจากนี้ยังเกิดจากปฏิกิริยาการออกซิไดซ์醪糟 และสารประกอบบีโนลิกที่ผสมอยู่ ส่วนสภาวะที่มีผลต่อการเกิด acetaldehyde คือ อุณหภูมิ ระดับของออกซิเจน และอานาหารที่ใช้เลี้ยงยีสต์ รวมทั้งกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกสุขอนามัย อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารนี้ได้ (Lachemeier, 2007) เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากยีสต์ *Saccharomyces cerevisiae* จะเกิด Acetadehdye 0.5-286 mg/l สูงกว่าใช้ยีสต์ *Kloeckera apiculata* (9.5-66 mg/l) (Liu and Pilone, 1993)

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ขึ้นชื่อของฝรั่งเศส คือสุราแอ๊ส Cider ผลิตจากผลแอปเปิลใช้สำหรับการผลิตสุราคลื่น Cavados ตรวจพบปริมาณ Acetaldehyde ตั้งแต่ระดับปานกลาง 150-400 mg/l จนสูงถึง 1000 mg/l (Coton and Coton, 2003) ขณะที่มาตรฐานควบคุมของฝรั่งเศสมิ่งเกิน 120 mg/l การที่ Cavados มีปริมาณ acetaldehyde สูงจะก่อให้เกิดมะเร็งกับผู้บริโภค (Linderborg et al., 2008)

มีผู้ให้ข้อสังเกตว่าในระหว่างกระบวนการผลิต Cavados อาจทำให้มีระดับ acetaldehyde สูงกว่าปกติถึงที่มีรายงานไว้อาจเนื่องมาจากการ

ประการแรก เชื้อที่ใช้ในการหมัก Cider หรือไวน์แอปเปิล คือ *Zymomonas mobilis* ทำให้เกิดการสะสม acetaldehyde สูง (200 mg/l)

ประการที่สอง ระบบการกลั่นที่ทำให้เกิดการสะสมของ acetaldehyde สูง (Claus and Berglund, 2005) การกลั่นซ้ำ (double distillation system) จะทำให้มีระดับของ acetaldehyde สูงกว่ากลั่นแบบต่อเนื่อง (rectification still system)

ประการที่สาม การใช้หม้อทองแดงในการกลั่นทำให้ตรวจวัดระดับ acetaldehyde ได้สูงเนื่องจาก acetaldehyde จะฟอร์มอยู่ที่ผิวของทองแดง (Rodríguez Madrera et al., 2006)

ประการที่สี่ ชนิดของไม้ที่ใช้ในการปั่นสุราบางชนิดทำให้มี acetaldehyde เพิ่มขึ้น (ไม้อีโคสาย พันธุ์ฝรั่งเศส) บางชนิดทำให้มี acetaldehyde ลดลง (ไม้อีโคสายพันธุ์อเมริกา)

รัฐบาลฝรั่งเศสจึงมีข้อกำหนดให้การกลั่นน้ำแรก (the first fraction) ที่มี alcohol, acetaldehyde และ ester สูงถูกแยกออกไปจากผลิตภัณฑ์ก่อน ซึ่งจะทำให้มีปริมาณ acetaldehyde สูงสุดไม่เกิน 100 และ 200 mg/l (République Francaise, 2000)

ตารางที่ 4.2 จากการรวมข้อมูล ปริมาณ Acetaldehyde ที่ตรวจพบในสุรากลั่น หน่วย mg/L

References	Country	Number (n)	Mean	Range	Method
Lachenmeier and Sohnius (2008)	Germany	834	61 ± 101	0 - 1159	GC
Linderborg et al. (2008)	Finland	25	78 ± 38	20 - 173	GC
Geroyiannaki et al. (2007)	Greece	28	325 ± 8	196 - 536	GC-FID
Miranda et al. (2007)	Brazil	94	80 ± 52	0 - 328	GC
Coton and Coton (2003)	France		400	150 -1000	GC
Ronaldo et al. (1997)	Brazil	56	44.8 ± 16	0 - 80	HPLC
Miyake and Shibamoto (1993)	Japan			25-102	GC
This work (2008)	Thailand	30	234 ± 155	0 - 690	GC-FID

4.2 การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์รอบปากขวดสุรา

จากการทดสอบบั้มสีแกรมแบคทีเรีย การวัดขนาดโคโลนีด้วยกล้อง SEM และการทดสอบทางชีวเคมีสามารถจำแนกชนิดของแบคทีเรียได้ 4 ชนิดคือ *Staphylococcus coagulase negative*, *Micrococcus spp.*, *Streptococcus nonenterococci* และ *Candida spp.* ซึ่งไม่เป็นเชื้อที่มีอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร

4.3 การทดสอบความเป็นพิษของสุราในหนูทดลอง

ผลกระทบต่อสุขภาพแบบกึ่งเรื้อรัง (sub-chronic) จากการได้รับแอลกอฮอล์ร่วมกับสารพิษปนเปื้อน และตัวอย่างสุราจริง ในหนูทดลอง ระยะเวลานาน 3 เดือน ทำให้ระดับเอนไซม์ในตับ ได้แก่ ALT, AST และ ALP สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ความเชื่อมั่น 95% แสดงว่าตับถูกทำลาย น้ำหนักตับก็เพิ่มขึ้น เช่นกัน สัมพันธ์กับการสร้างไขมันสะสมอยู่ในตับ เมื่อถูกทำลายด้วยแอลกอฮอล์ ปริมาณกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มของการเป็นเบาหวาน นอกจากนี้ยังพบว่าจำนวนเซลล์สีบพันธุ์ (sperm) ลดลงอย่างเห็นได้ชัด เมื่อปริมาณแอลกอฮอล์ และความสามารถในการเคลื่อนไหวของเซลล์สีบพันธุ์ลดลง เช่นกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

5. สรุปผลการทดลอง

จำนวนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกสุม 30 ตัวอย่าง ตรวจพบปริมาณ acetaldehyde เฉลี่ย 234 ± 155 mg/l อยู่ในช่วง 0 - 690 mg/l มีค่าเกินมาตรฐานควบคุม และพบสูงสุดในสุราแม่ขิง 690 mg/l รองลงมาเป็นสุรานำเข้าคือ Black label (309 mg/l) สารพิษปนเปื้อนอื่นๆ มีค่าอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานควบคุมได้แก่ methanol เฉลี่ย 40 ± 28 mg/l (0-108 mg/l) สูงสุดพบในสุรากลัน Spay royal (108 mg/l) พบสารโลหะหนัก Arsenic ปริมาณสูงสุด 0.0084 mg/l ในเบียร์ช้าง และ lead ปริมาณ 0.11 mg/l ในสุราชุมชนยี่ห้อไทยแท้ แต่ไม่พบ formaldehyde, Cadmium และสารปราบศัตรูพืชทั้ง 4 กลุ่ม

จากการตรวจทางจุลทรรศน์วิทยารอบปากชุดสุรา พบรากับปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในสุราชุมชนเป็นส่วนใหญ่ หลังจากการจำแนกเขือแบบที่เรียดังกล่าวด้วยการทดสอบสีเกรม การวัดขนาดโคโนนี และการทดสอบทางชีวเคมี สามารถจำแนกแบบที่เรียกออกเป็น 4 ชนิด คือ *Staphylococcus coagulase negative*, *Micrococcus spp.*, *Streptococcus nonenterococci* และ *Candida spp.* ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร

ผลกระทบต่อสุขภาพแบบกึ่งเรื้อรัง (sub-chronic) จากการได้รับแอลกอฮอล์ร่วมกับสารพิษปนเปื้อน และตัวอย่างสุราจริง ในหนู Wistar ระยะเวลา 3 เดือน ทำให้ระดับเอนไซม์ตับ ได้แก่ ALT, AST และ ALP สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ความเชื่อมั่น 95% แสดงว่าตับถูกทำลาย น้ำหนักตับก็เพิ่มขึ้น สัมพันธ์กับการสร้างไขมันสะสมอยู่ในตับเมื่อถูกทำลายด้วยแอลกอฮอล์ ปริมาณกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้นเมื่อแนวโน้มของการเป็นเบาหวาน นอกจากนี้ยังพบว่าจำนวนเซลล์สีบพันธุ์ (sperm) ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อปริโภคแอลกอฮอล์ และความสามารถในการเคลื่อนไหวของเซลล์สีบพันธุ์ลดลงเช่นกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

6. เอกสารอ้างอิง

กรมสุขภาพจิต. (2547) รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต. กรุงเทพฯ. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

ชาญณรงค์ ชุมนาวงศ์. (2543) ผลของวัตถุดิบ วัสดุที่ใช้ทำหม้อถัง และการบ่มแบบเร่ง ที่มีต่อคุณภาพของฟрукตบรั่นดีที่ ผลิตจากมะขาม. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

บริหารศ ศิลปกิจ และคณ. (2542) รายงานการวิจัยความชุกและภาวะสุขภาพจิตของคนไทยที่ติดสุรา. เชียงใหม่. โรงพยาบาลสวนปฐง.

พันธุ์นภา กิตติรัตน์เพบูลย์. (2547) การดื่มอย่างนิดหน่อย รายงานการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ. สยามมาเกตติ้ง.

ไพรัตน์ พฤกษาติคุณاجر. (2542) ตำราจิตเวชศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 1). เชียงใหม่. โรงพิมพ์แสงศิลป์.

- ญุพา ศรีนาค. (2531) การตรวจหาปริมาณสารที่อาจเป็นอันตรายในสุราเดือนและสุราทั่วไป.
วิทยานิพนธ์ปริญญาโท. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- สาวีตีร์ อัชณางค์กรชัย และสุวรรณฯ อรุณพงศ์เพศาล. (2543). รายงานการบทวนองค์ความรู้เรื่อง
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากแอลกอฮอล์. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. (มปพ).
- สุวนิย์ เกierge กิงแท็ก. (2544) แนวคิดพื้นฐานทางการพยายามบาลจิตใจ (พิมพ์ครั้ง
3). พิชณ์โลก มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- ศูนย์บำบัดรักษาเสพติดขอนแก่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2546) แนวทางการดูแล
ผู้ป่วยที่ติดสุรา. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข.
- Amerine, M.A., Berg, H.W., Kunkee, R.E., Ough, C.S. and Singleters , A.D. (1980) Technology
of wine making. The AVI Publishing Company, Inc., U.S.A.
- Apostolopoulou, A.A., Flouros, I.A., Demertzis, G.P. and Akrida-Demertz, K. (2005) Differences
in concentration of principal volatile constituents in traditional Greek distillates. Food
Control. 16, 157-164.
- Barbara Jaruge, Feng Hong, Won-Ho Kim, rui Sun, Saijun Fan, Bin Gao, (2004) Chronic alcohol
consumption accelerates liver injury in t cell mediated hepatitis: alcohol dysregulation of
hepatic NF-xB and STAT signaling pathways. J Physiol Gastrointest Liver Physiol (in
press).
- Bettin, S. M., Cervoni, J. L., Lima Neto, B. S. and Franco, D. W. (2002) Determination of
polycyclic aromatic hydrocarbon in sugar cane spirit by HPLC. II Brazilian Meeting on
the chemistry of food and beverage. Araraquara-SP, 1-3.
- Claus, M.J. and Berglund, K.A. (2005) Fruit brandy production by batch column distillation with
reflux. J. Food Process Eng. 28, 53-67.
- Coton, E. and Coton, M. (2003) Microbiological origin of "framboisé" in French ciders. J. Inst.
Brew. 109, 299-304.
- Daugulis, A.J., Brown, N.M., Cluett, W.R. and Dunlop, D.B. (1981) Production of ethanol by
adsorbed yeast cells. Biotechnol. Lett. 3, 651-656.
- Duk-Hee Lee, Myung-Hwa Ha and David C Christiani. (2001) Body weight, alcohol consumption
and liver enzyme activity—a 4-year follow-up study. Epidemiology.
- Enomoto, N., Yamashina, S., and Kono, H. (1999) Development of a new, simple model of early
alcohol-induced liver injury based on sensitization of Kupffer cells. Hepatology
29(6):1680-1689.

- Fazakas Z, Lengyel Z and Nagymajtenyi L. (2005) Combined effects of subchronic exposure to lead, mercury and alcohol on the spontaneous and evoked cortical activity in rats. *Arh Hig RadaToksikol.* Sep; 56(3):249-56
- Gupta, V., Gill, K.D., (2000) Influence of ethanol on lead distribution and biochemical changes in rats Exposed to lead. *Alcohol.* 20, 9-17
- Harkness, J.E., Wagner, J.E., (1989) *The Biology and Medicine of Rabbits and Rodents*, third ed. Lea & Febiger, Philadelphia.
- Hernandez-Gomez, L. F. and Briones, J. U. B. A. (2003) Melon fruit distillates: comparison of different distillation methods. *Food Chemistry.* 82, 539–543.
- Hough, J.S., (1985) *The Biotechnology of Malting and Brewing* Cambridge University Press, Cambridge. 70-71.
- IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans. (1984) Allyl Compounds, Aldehydes, Epoxides and Peroxides, International Agency for Research on Cancer:Lyon. 36, 101-132.
- Javier Franco-Perez, Monica Padilla, and Carios Paz. (2006) Sleep and brain monoamine change produced by acute and chronic acetaldehyde administration in rats. 174, 86-92.
- Johnson, B.S. (1995) *Child, Adolescent, and Family Psychiatric Nursing*. Philadelphia. J.B.Lippincott.
- Lachenmeier, D.W. (2007) Consequences of IARC re-evaluation of alcoholic beverage consumption and ethyl carbamate on food control. *Deut. Lebensm. Rundsch.* 103, 307-311.
- Linderborg, K., Joly, J.P., Visapää, J.P. and Salaspuro, M. (2008) Potential mechanism for Calvados-related oesophageal cancer. *Food Chem. Toxicol.* 45, 476-479.
- Liu, S.Q. and Pilone, G.J. (2000) An overview of formation and roles of acetaldehyde in winemaking with emphasis on microbiological implications. *Int. J. Food Sci. Technol.* 35, 49-61.
- Kano, M., F. Ishikawa, S. Matsubara, H. Kikuchi-Hayakawa and Y. Shimakawa, (2002) Soymilk Products Affect Ethanol Absorption and Metabolism in Rats during Acute and Chronic Ethanol Intake, Yakult Central Institute for Microbiological Research, Yaho 1796, Kunitachi, Tokyo 186-8650, Japan, *J. Nutr.* 132:238-244.
- Kato, H., and Tsuchida, H. (1981). Estimation of Melanoidin Structure by Pyrolysis and Oxidation. *Prog. Food Nutr. Sci.*, 5, 147-156.

- Kida, K., Morimura, S. and Zhong, Y.L. (1997) Production of ethanol from molasses by flocculating yeast for use as an alternative energy source. *Seibutsu-kogaku. Kais.* 75(1), 15-34.
- Kolovou, G.D., Milkailidis, D.P., Adamopoulou, E.N., Salpea, K.D., Kafaltis, N., Bilianou, N., Malakos, J., Pilatis, N.D., Mykoniatis, M., Cokkinos, D.V. (2005) The effect of nicotinic acid and alcohol co-administration in Wistar rats 27(1): 17
- Lobo, C.P, Jauaribe, F.E., Rodrigues, J. D Rocha da, A.A.F. (2007) Economics of alternative sugar cane milling options. *Applied Thermal Engineering.* 27, 1405-1413.
- Michael D, Hammond B.Sc. (1975) The Use of an Internal Standard in the Determination of Ethanol in Blood, Brain and Vapour. *Addiction* 70 (2), 162–164.
- Naegle, M.A., and D'Avanzo, C.E. (2001) Addiction and substance abuse: Strategies for advanced practice nursing. New Jersey: Prentice Hall.
- Nikander, P., Seppaelae, T., Kilonzo, P.G., Huttunen, P., Saarinen, L., Kilima, E. and Pitkaenen, T. (1991) Ingredients and contaminants of traditional alcoholic beverages in Tanzania. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene.* Volume 85, Issue 1, 133-135 pp.
- Nikolaos Kopsahelis, Nikolaos Agouridis, Argyro Bekatorou and Maria Kanellaki. (2006) Comparative study of spent grains and delignified spent grains as yeast supports for alcohol production from molasses. *Bioresource Technology.* 98, 1440-1447.
- Nikolaos Kopsahelis, Maria Kanellaki and Argyro Bekatorou. (2007) Low temperature brewing using cells immobilized on brewer's spent grains. *Food Chemistry.* (in press)
- Olfert, E.D., Cross, B.M., Mcwilliam, A.A. (Eds.), (1993) Guide to the Care and Use of Experimental Animals, vol. 1, second ed. Canadian Council on Animal Care, Ontario, 211pp
- Pecze La 'szlo', Papp Andra' s, Institoris La 'szlo', Szabo' Andrea and Nagymajte' nyi La 'szlo'. (2005) Acute and subchronic effects of lead on the central and peripheral nervous systems in rats in combination with alcohol. *Ecotoxicology and Environmental Safety.* 61, 139-144.
- Qiu D., Kurosawa M., Lin Y., Inaba Y., Matsuba T., Kikuchi S., Yagyu K., Motohashi Y., and Tamakoshi A. JACC Study Group. (2005) Overview of the epidemiology of pancreatic cancer focusing on the JACC Study. *Alcohol.* 35, 187-193.

- Rehm J, Room R, Monteiro M, Gmel G, Graham K, Rehn T, Sempos CT, Frick U, Jernigan D. Alcohol. (2004) In: WHO (ed), Comparative quantification of health risks: Global and regional burden of disease due to selected major risk factors. Geneva:WHO.
- République Française (2000) Décret du 2 juin 2000 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pays d'Auge". J. Off. République Française 4 juin, 8425-8428.
- Rodríguez Madrera, R., Suárez Valles, B., García Hevia, A., García Fernandez, O., Fernández Tascón, N., and Mangas Alonso, J.J. (2006) Production and composition of cider spirits distilled in "Alquitara". *J. Agri Food Chem.* 54, 9992-9997.
- Silva, M. L. and Malcata, F. X. (1998). Relationships between storage conditions of spirits obtained here form. *American Journal of Enology and Viticulture.* 49, 56-64.
- Sullivan, E.J. (1995) Nursing care of clients with substance abuse. St. Louis. Mosby.
- Sydney Youngerman-Cole, RN, BSN, RNC. (2006) Alanine Aminotransferase (ALT). *Gastroenterology.*
- Zoecklein, B.W., Fugelsang, K.c., Gump, B.H. and Nury, F.S. (1995). Wine Analysis and Production. Chapman and Hall, New York.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ตารางค่าความนิยมของการบริโภคสุราแต่ละยี่ห้อ

ตารางที่ 1 แสดงค่าความนิยมการบริโภคสุราลุ่มที่ 1 ในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	รายชื่อสุรา	ค่าความนิยม	ลำดับ	รายชื่อสุรา	ค่าความนิยม
1	Red lable	26	18	Blue egle	15
2	Ben more	35	19	Black lable	20
3	เชียงซุน	14	20	ลีโอ	22
4	Blend 285	43	21	เบียร์เชียร์	14
5	swing	14	22	ไชน่าเก็น	20
6	Troopers	14	23	Dewar's	9
7	ไทเบียร์	12	24	John master	13
8	Ballantine's	6	25	มังกรทอง	18
9	Regency	24	26	100 Piper	61
10	William lawson's	15	27	Jack daniel's	7
11	หงส์ทอง	27	28	Golden knight	14
12	สุราโรงงาน 40 ดีกรี	20	29	แม่โขง	18
13	Spay royal	18	30	Chevas legal	17
14	แสงสม	24	31	Cooper	8
15	สิงห์	20	32	Red suntory	11
16	Master blend	20	33	อาชา	19
17	ช้าง	20	34	Clown 99	19

หมายเหตุ ค่าความนิยมคำนวณจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ร้านค้าจำนวน 25 ร้าน ในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดพิษณุโลก (มีนาคม 2550) โดยแต่ละร้านจะถูกจัดลำดับความนิยมสุราที่มีการจำหน่ายมากที่สุด 3 อันดับแรก เรียงจากมากไปน้อย เพื่อให้คะแนน

อันดับ 1 ให้ 4 คะแนน

อันดับ 2 ให้ 3 คะแนน

อันดับ 3 ให้ 2 คะแนน

และสุราที่มีจำหน่ายแต่ไม่ถูกเลือกให้ 1 คะแนน

ตารางที่ 2 แสดงค่าสะสมความนิยมการบริโภคสุรากลุ่มที่ 2 บริเวณสถานประกอบการใกล้กับ
สถานศึกษา

ลำดับ	รายชื่อสุรา	ค่าความนิยม	ลำดับ	รายชื่อสุรา	ค่าความนิยม
1	แม่โขง	279	18	Blue egle	263
2	Blend 285	328	19	หงส์ทอง	304
3	ซ้าย	401	20	Jack daniel's	264
4	Cooper	277	21	Regency	275
5	มังกรทอง	283	22	ลีโอ	434
6	ไฮเนเก้น	294	23	Master blend	276
7	Blend 285	268	24	Chevas legal	267
8	แสงสม	344	25	John master	269
9	Golden knight	268	26	สุราโรงงาน 40 ดีกรี	307
10	William lawson's	257	27	สาไก	267
11	เชียงชูน	255	28	Spay royal	290
12	100 Piper	490	29	Clown 99	264
13	สิงห์	321	30	Black lable	311
14	swing	265	31	เบียร์เชียร์	275
15	Ben more	380	32	อาชา	293
16	Dewar's	255	33	Ballantine's	259
17	Troopers	255	34	Red lable	299

หมายเหตุ ค่าความนิยมคำนวณจากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์นิสิตในมหาวิทยาลัยนเรศวร
จำนวน 255 คน (ธันวาคม 2550) โดยการให้คะแนนจากการเรียงอันดับสุราที่นิสิตตีมเป็น
ประจำ 3 อันดับแรกเรียงจากมากไปน้อย เพื่อให้คะแนน

อันดับ 1 ให้ 4 คะแนน

อันดับ 2 ให้ 3 คะแนน

อันดับ 3 ให้ 2 คะแนน

และสุราที่มีจำนวนน้อยแต่ไม่ถูกเลือกให้ 1 คะแนน

ตารางที่ 3 แสดงค่าสําสมความนิยมการบริโภคสุรากลุ่มที่ 3 สุราหมูนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
พิษณุโลกข้อมูลปี 2550 (สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดพิษณุโลก, 2550)

ลำดับ	รายชื่อสุรา	ค่าความนิยม	ลำดับ	รายชื่อสุรา	ค่าความนิยม
1	ຈະເຊື້ອ 0.330 L	200	15	ໄວນ්ຈຸຫາຣສ 0.640 L (ກະບາຍດຳ)	150
2	ເຫວາ 0.330 L	600	16	ສາມແຕ່ມາ 0.625 L	2000
3	ໄທຢແຫ້ 0.625 L	200	17	ຂ້າວໄທຢ 0.625 L	1000
4	Songkwe Wine 0.750 L	100	18	ຈະເຊື້ອ 0.625 L	200
5	ໂຄ້າທ 0.330 L	1100	19	ກວາງແຮນເດີຢົກ 0.625 L	1200
6	ແມ່ຍມ 0.330 L	500	20	ໜອນພູມຍອ 0.330 L	100
7	ລະເອີດໄວນ໌ໄທຢ 0.640 L (ກະເຈື້ຍບ)	200	21	ລະເອີດໄວນ໌ໄທຢ 0.640 L (ເຕາວລົມປຣີຍງ)	200
8	ໄວນ්ຈຸຫາຣສ 0.640 L (ກະແຂ່ງ)	350	22	ສູງາຂາງ 40 ດີກີ່ອ 0.625 L	600
9	ໄປໂພທີເງິນ 0.625 L	900	23	ແສງທອງ 0.625 L	500
10	ແມ່ຍມ 0.625 L	200	24	ທ່າທອງ 0.625 L	800
11	ໄກ່ຕູ້ 0.625 L	200	25	ໄວນ්ຈຸຫາຣສ (ສັບປະຈຸດ) 0.750 L	300
12	ຕັ້ນໄພທີ 0.625 L	200	26	ກວາງແຮນເດີຢົກ 0.330 L	400
13	ໄກ່ຕູ້ 0.625 L	1500	27	ເຫວາ 0.625 L	1100
14	ໜອນພູມຍອ 0.625 L	100	28	ທຸ່ງທອງ 0.625 L	500

หมายเหตุ ค่าความนิยมคำนวณจากจำนวนแستตมป์ที่ซื้อ
ประจำเดือนมีนาคม 2550 รายงานยืนยันการซื้อขายภาคชีวิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
พิษณุโลก สาขาเมืองพิษณุโลก

ภาคผนวก ๖ ข้อมูลพื้นฐานตัวอย่างสูราที่ถูกสุ่ม

ตัวอย่าง	ยี่ห้อ	ราคา (บาท)	ประเภทสูรา	วัตถุดิบ	ดีกรี
A1	Ben more	285	สุราสี	premium	40
A2	swing	1511	สุราพิเศษ	super premium	40
A3	William lawson's	349	สุราพิเศษ	premium	40
A4	Spay royal	279	สุราสี	premium	40
A5	Master blend	195	สุราพิเศษ	standard	40
A6	Black lable	1050	สุราพิเศษ	premium	40
A7	John master	169	สุราสี	premium	30
A8	100 Piper	249	สุราสี	premium	40
A9	แม่โขง	129	สุราปุงพิเศษ	กากน้ำตาล	40
A10	Clown 99	189	สุราสี	premium	35
B1	ข้าว	38	เบียร์	ข้าว	6.4
B2	Blend 285	189	สุราสี	premium	35
B3	เชียงซุน	88	สุราผสม	กากน้ำตาล	30
B4	สิงห์	46	เบียร์	ข้าว	5
B5	Troopers	229	สุราสี	กากน้ำตาล	35
B6	วงศ์ทอง	158	สุราสี	กากน้ำตาล	40
B7	Chevas legal	849	สุราพิเศษ	premium	43
B8	สยามสาโท	26	สุราเหล้า	ข้าวเหนียว	8
B9	เบียร์เชียร์	33	เบียร์	ข้าว	5
B10	Red lable	619	สุราพิเศษ	standard	40
C1	ไทยแท้	60	สุราขาว	ข้าวเหนียว	40
C2	แม่ยม	65	สุราขาว	ข้าวเหนียว	40
C3	ใบโพธิ์เงิน	70	สุราขาว	ข้าวเหนียว	40
C4	ไก่คุ่	60	สุราขาว	ข้าวเหนียว	40
C5	สามเณร	65	สุราขาว	ข้าวเหนียว	40
C6	ข้าวไทย	60	สุราขาว	ข้าวเหนียว	40
C7	กว้างแรมเดียร์	65	สุราขาว	ข้าวเหนียว	40
C8	วงศ์ทอง	75	สุราขาว	กากน้ำตาล	40
C9	สุราขาว 40 ดีกรี	85	สุราขาว	กากน้ำตาล	40
C10	เทวา	60	สุราขาว	ข้าวเหนียว	40

ภาคผนวก ค แบบสอบถามและสัมภาษณ์ความนิยมของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แบบสอบถาม "ความนิยมของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์"

ชื่อวัน.....

ที่อยู่.....

Black lable		แสงสม	
Chevas legal		หงส์ทอง	
Red lable		มังกรทอง	
100 Piper		แม่โขง	
Regency		สุราโรงงาน 40 ดีกรี	
Ben more		สุราโรงงาน 30 ดีกรี	
Blue egle		สุราโรงงาน 28 ดีกรี	
Master blend		เชียงซุน	
Blend 285		ไสเนเก้น	
Clown 99		สิงห์	
Red suntory		ช้าง	
Spay royal		ลีโอด	
Swing		อาชา	
Dewar's		อาชาชี	
William lawson's		เบียร์เชียร์	
Jack daniel's		ไทด์เบียร์	
Ballantine's		ไทด์เกอร์	
Golden knight		ไวน์ในประเทศ	
Troopers		สาโท	
Cooper		กระแซ่	
John master		ธุ	

ภาคผนวก ง แบบสอบถามและสัมภาษณ์ปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แบบสอบถามปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

1. สถานภาพส่วนบุคคล

1.1 เพศ

ชาย หญิง

1.2 อายุ

<input type="checkbox"/> ต่ำกว่า 18	<input type="checkbox"/> 18-25
<input type="checkbox"/> 26-30	<input type="checkbox"/> 31-35
<input type="checkbox"/> 36-40	<input type="checkbox"/> ปัจจุบัน.....

1.3 อาชีพ

<input type="checkbox"/> นักเรียน/นักศึกษา	<input type="checkbox"/> ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
<input type="checkbox"/> พนักงานบริษัท	<input type="checkbox"/> กิจการส่วนตัว
<input type="checkbox"/> รับจ้างทั่วไป	<input type="checkbox"/> เกษตรกร
<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	

1.4 ระดับการศึกษา

<input type="checkbox"/> ประถมศึกษา	<input type="checkbox"/> มัธยมต้น/ปวช.
<input type="checkbox"/> อนุปริญญา/ปวส.	<input type="checkbox"/> ปริญญาตรี
<input type="checkbox"/> สูงกว่าปริญญาตรี	<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....

1.5 รายได้ต่อเดือน

<input type="checkbox"/> น้อยกว่า 6,000 บาท	<input type="checkbox"/> 6,001-8,000 บาท
<input type="checkbox"/> 8,001-10,000 บาท	<input type="checkbox"/> 10,001-15,000 บาท
<input type="checkbox"/> 15,001-20,000 บาท	<input type="checkbox"/> 20,001-30,000 บาท
<input type="checkbox"/> 30,001-40,000 บาท	<input type="checkbox"/> มากกว่า 40,000 บาท
<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....	

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

2.1 คุณเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อายุ.....ปี

2.2 โดยปกติคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ยี่ห้ออะไร เลือก 3 อันดับที่ดื่มเป็นประจำ (โดยระบุเป็นตัวเลขเรียงจากมากไปน้อย)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Black lable | <input type="checkbox"/> Chevas legal |
| <input type="checkbox"/> Red lable | <input type="checkbox"/> 100 Piper |
| <input type="checkbox"/> Regency | <input type="checkbox"/> Ben more |
| <input type="checkbox"/> Blue egle | <input type="checkbox"/> Master blend |
| <input type="checkbox"/> Blend 285 | <input type="checkbox"/> Clown 99 |
| <input type="checkbox"/> Red suntory | <input type="checkbox"/> Spay royal |
| <input type="checkbox"/> swing | <input type="checkbox"/> Dewar's |
| <input type="checkbox"/> William lawson's | <input type="checkbox"/> Jack daniel's |
| <input type="checkbox"/> Ballantine's | <input type="checkbox"/> Golden knight |
| <input type="checkbox"/> Troopers | <input type="checkbox"/> Cooper |
| <input type="checkbox"/> John master | <input type="checkbox"/> แสงโสม |
| <input type="checkbox"/> หลังกอง | <input type="checkbox"/> มังกรกอง |
| <input type="checkbox"/> แม่โขง | <input type="checkbox"/> เชียงชูน |
| <input type="checkbox"/> สุราโรงงาน 40 ดีกรี | <input type="checkbox"/> สุราขาวบ้าน |
| <input type="checkbox"/> ไชน่าเก้น | <input type="checkbox"/> สิงห์ |
| <input type="checkbox"/> ชา | <input type="checkbox"/> สีโอล |
| <input type="checkbox"/> อาชา | <input type="checkbox"/> อาชาชี |
| <input type="checkbox"/> เปียร์เชียร์ | <input type="checkbox"/> ไทด์เบียร์ |
| <input type="checkbox"/> ไทน์เกอร์ | <input type="checkbox"/> ไวน์ในประเทศไทย |
| <input type="checkbox"/> สาโท | <input type="checkbox"/> กระแทก |
| <input type="checkbox"/> คุ้ | <input type="checkbox"/> ชื่นๆระบุ..... |

2.3 เหตุผลของการเลือกเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์คืออะไร (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ โดยระบุเป็นตัวเลขเรียงจากมากไปน้อย)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> ราคาถูก | <input type="checkbox"/> รสชาติดี |
| <input type="checkbox"/> ปริมาณของสินค้า | <input type="checkbox"/> ความชอบส่วนตัว |
| <input type="checkbox"/> ตามความนิยม | <input type="checkbox"/> ชื่นๆระบุ..... |


ภาคผนวก จ โคลนีที่เกิดขึ้นจะถูกนำไปทดสอบทางชีวเคมี เพื่อจัดจำแนกเชื้อพบ

1. ผลการสร้างเอนไซม์ Catalase เพื่อแยกแบคทีเรีย staphylococci ออกจาก streptococci และใช้ในการแยกแบคทีเรียอื่นๆ ถ้ามีการสร้างฟอง O_2 ถือว่าเป็นผลบวก ไม่เกิดฟองเป็นผลลบ



รูปที่ 1 การแสดงผลบวก (เกิดฟองแก๊ส) ของการสร้าง catalate

2. ผลการสร้าง coagulase เป็นลักษณะสำคัญที่จะแยกเชื้อ *staphylococcus aureus* ออก จาก *Staphylococcus* sp. อื่นๆ เพราะ *S.aureus* ส่วนมากจะสร้างเอนไซม์ coagulase ที่ทำให้ plasma จับตัวแข็งเป็นก้อน และถ้าเชื้อที่ทดสอบสร้าง coagulase หากไม่มีการสร้าง Plasma จะเหลว หมายเหตุ : การแข็งตัวของ plasma มีหลายระดับ อาจจะแข็งเป็นบางส่วนหรือแข็งทั้งหมดก็ได้



รูปที่ 2 การแสดงผลการสร้าง Coagulase

3. ผลการเกิดออกซิเดส์และการหมัก (Oxidation-Fermentation Test)

อาหารด้านบนเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลือง แสดงว่าเป็น oxidation แต่ถ้าอาหารด้านล่างเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลือง แสดงว่าเป็น fermentation แต่ถ้าเกิดอาหารเปลี่ยนสีทั้งหมด แสดงว่าเป็น oxidation and fermentation

4. ผลการสร้างสายและโคโนเดียป่อง(Dalmau plate)



รูปที่ 3 แสดงวิธีการทำ Dalmau plate

5. ผลการสร้าง Bile esculin ใช้เพื่อแยกเชื้อกลุ่ม enterococci (Group D streptococci)
ผลบวกอาหารจะถูกเปลี่ยนเป็นสีดำ ส่วนผลลบอาหารจะไม่เปลี่ยนสี




รูปที่ 4 แสดงการทดสอบ Bile esculin

6. ผลการทดสอบ 6.5 % NaCl ผลการทดสอบเป็นบวกจะเกิดสีเหลือง ส่วนผลลบจะเกิดสีแดง



รูปที่ 5 แสดงการทดสอบ 6.5 % NaCl



รูปที่ 6 แผนผังการจัดจำแนกแบปค์ที่เรียบบนอาหาร Blood agar

ภาคผนวก ๔ ตารางการคำนวณค่าทางสถิติ

GLU (mg/dl)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
273.8	216.6	152.9	186.1	224.4	236.6	159.3	223.3	129.8		
235.5	200.8	177.9	220.4	240.1	205.5	197.1	232.8	226.7		
241.8	238.1	175.5	168.9	273.8	228.0	189.0	196.4	230.0		
211.5	159.5	180.0	263.7	135.6	224.1	208.6	250.2	241.8		
200.9	222.9		368.8	371.0	230.9	235.1	261.1	197.5		
	196.9		400.0	319.8	226.7	222.1	260.8	236.9		
			299.1	298.0	252.1	283.3			227.0	
			304.0							
รวม	1163.5	1234.8	686.3	2211.0	1862.7	1603.9	1494.5	1424.6	1489.7	13171
ค่าเฉลี่ย	232.7	205.8	171.6	276.4	266.1	229.1	213.5	237.4	212.8	2045.4
จำนวนช้ำ	5	6	4	8	7	7	7	6	7	57
ผลรวมแต่ละตัว^2	273986.99	257822.08	118227.07	659164.52	530074.21	368676.73	328319.17	341421.58	326265.03	3203957.38
SOV	df	S.S.	M.S.	F-value	F จาก					
Treatment	8	47776.56	5972.07	2.54	ตาราง					
Error	48	112755.54	2349.07							
Total	56	160532.10								
C.F.	3043425.28		C.V.	2.37						

ดังนั้น สรุปได้ว่า การทดลองนี้มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

CREA (mg/dl)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	0.56	0.47	0.51	0.47	0.48	0.44	0.42	0.53	0.40	
	0.50	0.44	0.46	0.59	0.49	0.44	0.49	0.46	0.46	
	0.53	0.56	0.43	0.43	0.52	0.45	0.45	0.42	0.48	
	0.61	0.47	0.40	0.61	0.47	0.48	0.42	0.45	0.48	
	0.53	0.43		0.47	0.50	0.44	0.52	0.40	0.46	
		0.55		0.55	0.55	0.46	0.50	0.48	0.50	
				0.48	0.49	0.52	0.51		0.46	
				0.54						
รวม	2.7	2.9	1.8	4.1	3.5	3.2	3.3	2.7	3.2	27.61
ค่าเฉลี่ย	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.4
จำนวนช้ำ	5	6	4	8	7	7	7	6	7	57
ผลรวมแต่ละตัว^2	1.50	1.44	0.82	2.17	1.75	1.50	1.58	1.26	1.51	13.52
SOV	df	S.S.	M.S.	F-value	F จาก					
Treatment	8	0.05	0.01	2.96	ตาราง					
Error	48	0.09	0.00		2.14					
Total	56	0.14								
C.F.	13.37			C.V.	1.02					

ดังนั้น สรุปได้ว่า การทดลองนี้มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

Ratio ALT/AST	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(U/L)	58.12	50.0	56.55	42.89	39.72	43.70	42.62	38.44	30.53
	39.98	44.05	75.38	56.46	51.24	52.67	42.59	45.74	55.03
	53.37	57.08	71.70	42.06	46.30	42.56	34.79	40.04	42.80
	43.35	69.24	46.02	72.61	29.05	48.81	69.74	39.60	42.33
	51.76	70.58		74.84	44.42	32.54	60.37	45.00	70.79
		64.01		59.66	62.10	54.15	66.20	42.11	59.04
				56.29	58.16	54.86	34.69		48.96
				61.12					
รวม	246.6	355.0	249.7	465.9	331.0	329.3	351.0	250.9	349.5
ค่าเฉลี่ย	49.3	59.2	62.4	58.2	47.3	47.0	50.1	41.8	49.9
จำนวนช้า	5	6	4	8	7	7	7	6	7
ผลรวมแต่ละตัว^2	12382.86	21571.52	16138.78	28133.10	16402.94	15878.28	18934.76	10539.39	18478.08
SOV	df	S.S.	M.S.	F-value	F จากตาราง				
Treatment	8	2070.83	258.85	2.11	2.14				
Error	48	5899.05	122.90						
Total	56	7969.88							
	C.F.	150489.83		C.V.	2.38				

2928.8087
465.3
57

158459.71

ดังนั้น สรุปได้ว่า การทดลองนี้ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ALT (U/L)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	51.9	38.0	48.8	37.4	31.3	34.0	36.7	29.6	19.6	
	36.1	42.6	59.1	69.0	51.6	39.5	39.4	40.3	36.1	
	49.9	62.1	56.0	40.8	50.0	42.6	31.9	38.8	31.2	
	53.5	78.1	39.3	81.1	47.2	45.0	61.3	25.5	27.6	
	39.6	60.7		103.5	42.2	22.0	64.9	31.5	58.4	
		73.8		46.3	55.7	48.9	66.0	33.9	64.0	
				47.0	53.8	45.7	29.0		37.8	
				52.5						
รวม	231.0	355.3	203.2	477.6	331.8	277.7	329.2	199.6	274.7	2680.1
ค่าเฉลี่ย	46.2	59.2	50.8	59.7	47.4	39.7	47.0	33.3	39.2	422.5
จำนวนช้า	5	6	4	8	7	7	7	6	7	57
ผลรวมแต่ละตัว^2	10917.24	22345.71	10554.74	32222.80	16147.86	11519.71	17083.56	6797.40	12357.97	139946.99

SOV	df	S.S.	M.S.	F-value	F จาก
					ตาราง
Treatment	8	4176.66	522.08	2.57	2.14
Error	48	9753.91	203.21		
Total	56	13930.57			

C.F. 126016.42 C.V. 3.37

ดังนั้น สรุปได้ว่า การทดลองนี้มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

AST (U/L)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	89.3	76.0	86.3	87.2	78.8	77.8	86.1	77.0	64.2	
	90.3	96.7	78.4	122.2	100.7	75.0	92.5	88.1	65.6	
	93.5	108.8	78.1	97.0	108.0	100.1	91.7	96.9	72.9	
	123.4	112.8	85.4	111.7	162.5	92.2	87.9	64.4	65.2	
	76.5	86.0		138.3	95.0	67.6	107.5	70.0	82.5	
		115.3		77.6	89.7	90.3	99.7	80.5	108.4	
				83.5	92.5	83.3	83.6		77.2	
				85.9						
รวม	473.0	595.6	328.2	803.4	727.2	586.3	649.0	476.9	536.0	5175.6
ค่าเฉลี่ย	94.6	99.3	82.1	100.4	103.9	83.8	92.7	79.5	76.6	812.8
จำนวนช้า	5	6	4	8	7	7	7	6	7	57
ผลรวมแต่ละตัว^2	45950.64	60378.26	26987.02	83922.28	80047.52	49861.43	60590.06	38607.83	42507.10	488852.14
					F จาก					
SOV	df	S.S.	M.S.	F-value	ตาราง					
Treatment	8	5306.76	663.35	2.34	2.14					
Error	48	13600.90	283.35							
Total	56	18907.66								
	C.F.	469944.48		C.V.	2.07					

ดังนั้น สรุปได้ว่า การทดลองนี้มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ALP (U/L)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	65	69	55	68	53	59	74	54	63	
	58	62	58	68	74	48	73	61	68	
	63	57	57	86	75	77	65	56	61	
	70	72	48	77	80	81	52	60	63	
	63	66		64	96	60	69	46	47	
		79		85	69	88	82	100	68	
				74	103	53	62		56	
				78						
รวม	319.0	405.0	218.0	600.0	550.0	466.0	477.0	377.0	426.0	3838
ค่าเฉลี่ย	63.8	67.5	54.5	75.0	78.6	66.6	68.1	62.8	60.9	597.8
จำนวนช้ำ	5	6	4	8	7	7	7	6	7	57
ผลรวมแต่ละตัว^2	20427.00	27635.00	11942.00	45454.00	44896.00	32428.00	33063.00	25489.00	26252.00	267586.00
SOV	df	S.S.	M.S.	F-value	F จากตาราง					
Treatment	8	2499.39	312.42	2.25	2.14					
Error	48	6661.28	138.78							
Total	56	9160.67								
C.F.		258425.33		C.V.	1.97					

ดังนั้น สรุปได้ว่า การทดลองนี้มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

ratio LW/BW	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3.03	3.49	2.74	2.98	2.89	3.58	2.82	3.20	3.13	
	3.04	2.71	3.12	3.16	3.03	2.38	2.63	3.23	3.18	
	2.78	2.94	3.48	2.81	2.89	3.03	2.60	3.41	3.10	
	3.06	3.00	3.07	3.30	3.13	3.25	2.70	3.21	2.38	
	3.24	3.22	3.13	3.08	3.29	3.19	3.05	3.24	2.80	
		2.94		2.80	3.08	3.95	2.98	3.26	2.74	
				3.33	2.39	2.63	2.76	3.10	2.63	
				2.96		3.02	2.90	3.62	2.71	
รวม	15.14	18.2985377	15.54	24.4346543	20.7015311	25.0425773	22.4327409	26.2739761	22.6855934	190.55
ค่าเฉลี่ย	3.03	3.05	3.10856285	3.05	2.95736159	3.13	2.80	3.28	2.84	3.02
จำนวนข้า	5	6	5	8	7	8	8	8	8	63
ผลรวมแต่ละ										
ตัว^2	45.96	56.17	48.59	74.91	61.71	80.11	63.09	86.47	64.88	581.89
SOV	df	S.S.	M.S.	F-value	F จากตาราง					
Treatment	8	1.38	0.17	2.25	2.1					
Error	54	4.14	0.08							
Total	62	5.52								
C.F.	576.36		C.V.	9.16						

ดังนั้น สรุปได้ว่า การทดลองนี้มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

Concentration (*10 ⁶ cell / ml)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7	12	23	26	20	26	25	20	26		
10	20	20	21	21	32	28	25	27		
12	12	18	20	24	25	21	25	32		
15	20	24	26	21	22	24	27	33		
14	23	23	24	24	20	25	24	28		
	28		26	26	30	29	32	28		
			30	30	28	24	34	26		
			24		33	26	29	32		
รวม	58.00	115	108.00	197	166	216	202	216	232	1510.00
ค่าเฉลี่ย	11.60	19.17	21.6	24.63	23.7142857	27.00	25.25	27.00	29.00	23.97
จำนวนช้า	5	6	5	8	7	8	8	8	8	63
ผลรวมแต่ละตัว ²	714.00	2401.00	2358.00	4921.00	4010.00	5982.00	5144.00	5976.00	6786.00	38292.00
SOV	df	S.S.	M.S.	F-value	F จากตาราง					
Treatment	8	1297.90	162.24	10.92	2.1					
Error	54	802.04	14.85							
Total	62	2099.94								
C.F.	36192.0635		C.V.	16.08						

ดังนั้น สรุปได้ว่า การทดลองนี้มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญยิ่งที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

% Motility B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	50	60	70	70	60	80	80	80	80	
	60	70	70	60	60	80	80	80	80	
	60	50	70	70	80	80	80	80	80	
	60	70	80	80	60	70	70	80	80	
	50	70	70	80	70	60	70	80	80	
				70	80	70	80	70	70	
				80	80	70	70	60	80	
				70	80	80	70	70	70	
รวม	280.00	320	360.00	580	490	590	610	600	620	4450.00
ค่าเฉลี่ย	56.00	64.00	72	72.50	70	73.75	76.25	75.00	77.50	71.77
จำนวนช้า	5	5	5	8	7	8	8	8	8	62
ผลรวมแต่ละตัว^2	15800.00	20800.00	26000.00	42400.00	34900.00	43900.00	46700.00	45400.00	48200.00	324100.00

SOV Treatment	df	S.S.	M.S.	F-value	F จาก
					ตาราง
	8	2109.84	263.73	5.39	2.1
Error	53	2595.00	48.96		
Total	61	4704.84			
C.F.		319395.16		C.V.	9.75

ดังนั้น สรุปได้ว่า การทดลองนี้มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

% Motility	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
C+D	50	40	30	30	40	20	20	20	20	
	40	30	30	40	40	20	20	20	20	
	40	50	30	30	20	20	20	20	20	
	40	30	20	20	40	30	30	20	20	
	50	30	30	20	30	40	30	20	20	
			30	20	30	20	30	30		
				20	20	30	30	40	20	
					30	20	20	30	30	
รวม	220.00	180	140.00	220	210	210	190	200	180	1750.00
ค่าเฉลี่ย	44.00	36.00	28	27.50	30	26.25	23.75	25.00	22.50	28.23
จำนวนช้า	5	5	5	8	7	8	8	8	8	62
ผลรวมแต่ละ ตัว^2	9800.00	6800.00	4000.00	6400.00	6900.00	5900.00	4700.00	5400.00	4200.00	54100.00
SOV	df	S.S.	M.S.	F-value	F จาก	ตาราง				
Treatment	8	2109.84	263.73	5.39	2.1					
Error	53	2595.00	48.96							
Total	61	4704.84								
	C.F.	49395.16		C.V.	24.79					

ดังนั้น สรุปได้ว่า การทดลองนี้มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95%