



รายงานฉบับสมบูรณ์

ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกในครัวเรือนต่อมาตราที่
ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรและบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี ในจังหวัดเพชรบูรณ์

Harms from household members's drinking to mothers who are
responsible for raising children and their children under 5 years
in Phetchabun province

สัญญาเลขที่ 65-10068-29

โดย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สอนทน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา

นางอัมพร สอนทน

ชื่องค์กรรับทุน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ได้รับทุนสนับสนุนโดย

แผนงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มกราคม 2567

ສັນຖາເລກທີ 65-10068-29

รายงานฉบับສມບູຮົນ

ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกในครัวเรือนต่อการดูแล
ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรและบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี ในจังหวัดเพชรบูรณ์

Harms from household members's drinking to mothers who are
responsible for raising children and their children under 5 years
in Phetchabun province

ໂດຍ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ໄພທຸຣຍ໌ ສອນທນ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ນາມລ ຈັນທິມາ

นางອິນພຣ ສອນທນ

ຈື້ອອງຄົບຖຸນ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ມหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ໄດ້ຮັບຖຸນສັນບສູນໂດຍ

ແຜນງານศູນຍົງຈັຍປໍລູຫາສູາ

คณะแพทยศาสตร์ ມหาวิทยาลัยສົງລານຄຣິນທີ

Final Report

Harms from household members's drinking to mothers who are responsible for raising children and their children under 5 years
in Phetchabun province

(Contract no 65-10068-29)

By
Project manager
Asst. Prof. Dr. Paithoon Sonthon
Asst. Prof. Dr. Narumon Janma
Mrs Aumporn Sonthon

Organization
Faculty of Science and Technology,
Phetchabun Rajabhat University

This project was supported by
Center for Alcohol Studies,
Faculty of Medecine, Prince of Songkla University

January 2024

บทคัดย่อ

เป็นการศึกษาแบบเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study) มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดร้อยละของผลกระทบและอิทธิพลลักษณะของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดาและต่อเด็ก และเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนกับผลกระทบต่อมารดาและต่อเด็ก เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ คำนวณขนาดตัวอย่างจากสูตรประมาณค่าสัดส่วน ได้ขนาดตัวอย่าง 1,500 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนและแบบกลุ่ม (Multi-stage cluster random sampling) ได้จำแนก 6 แห่ง ๆ ละ 1 ตำบล ๆ ละ 10 หมู่บ้าน รวม 60 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,503 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Multiple binary logistic regression

ผลการวิจัย พบร่วม ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิด ร้อยละ 23.0 โดยผลกระทบต่อมารดา มีร้อยละสูงสุดในเรื่องเคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ดูด่าว่ากล่าว ทะเลาะกัน ดูถูก เหยียดหยาม หยาบคาย ดูหมิ่นและทะเลาะร้อยละ 3.8 รองลงมา เคยโดยสารหรือนั่งรถไปกับคนขับรถที่ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.2 และร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็ก อย่างน้อย 1 ชนิด ร้อยละ 3.5 โดยผลกระทบต่อเด็ก มีร้อยละสูงสุดในเรื่อง เด็กที่ดูแลถูกดูด่าอย่างรุนแรง เนื่องจาก การดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว ร้อยละ 2.2 และเคยมีเงินไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ร้อยละ 1.8

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ได้แก่ จำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ดื่มอย่างหนัก ≥ 2 คน ($AOR = 22.96; 95\%CI = 8.05, 65.46$) จำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ดื่มอย่างหนัก 1 คน ($AOR = 10.39; 95\%CI = 7.13, 15.14$) และสมาชิกคนอื่น ๆ ดื่ม แต่ไม่ดื่มอย่างหนัก ($AOR = 3.91; 95\%CI = 2.78, 5.49$) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมารดา ได้แก่ มารดาดื่มอย่างหนักเป็นประจำ ($AOR = 3.25; 95\%CI = 1.58, 6.68$) และมารดาดื่มแต่ไม่ดื่มอย่างหนัก ($AOR = 1.77; 95\%CI = 1.19, 2.63$) และมารดา มีอาชีพรับจ้าง ($AOR = 1.66; 95\%CI = 1.08, 2.55$) มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ได้แก่ จำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ดื่มหนัก 1 คน ($AOR = 11.1; 95\%CI = 4.73, 26.44$) และสมาชิกคนอื่น ๆ ดื่มแต่ไม่ดื่มอย่างหนัก ($AOR = 3.41; 95\%CI = 1.41, 8.22$) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมารดา ได้แก่ มารดาดื่มอย่างหนักเป็นประจำ ($AOR = 5.75; 95\%CI = 1.69, 19.61$) และมารดาดื่มแต่ไม่ดื่มอย่างหนัก ($AOR =$

4.23; 95%CI = 1.96, 9.16) มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ดังนั้น หน่วยงานในระดับนโยบาย ควรออกกฎหมายหรือมาตรการ ห้ามสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนรวมถึงมารดาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากในครัวเรือนมีมารดาที่กำลังเลี้ยงดูบุตรหรือมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี หน่วยงานระดับปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง ควรจัดกิจกรรมการคัดกรองและการส่งเสริมสุขภาพแก่มารดาหรือเด็กที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน เช่น ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และควรจัดช่องทางในการสื่อสาร การขอรับการช่วยเหลือต่าง ๆ แก่มารดาและเด็กกลุ่มเสี่ยงที่ครัวเรือนมีสมาชิกคนอื่น ๆ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คำสำคัญ : การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สมาชิกในครัวเรือน ผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่น
มารดาและเด็ก

Abstract

This is a cross-sectional analytical study. The objective of this study was to measure the percentage and describe the harms from other household members' alcohol drinking to mothers and children, and to investigate the association between household members' alcohol-drinking behavior and harm to mothers and children. The data collection tool was an interview which was checked for content validity by 3 experts. Data was collected through interviews. Calculate sample size from the proportion estimation formula, the sample size was 1,500 participants. Multi-stage cluster random sampling was done, resulting in 6 districts, each district was selected 1 sub-district, and each sub-district was selected 10 villages, and each village used the entire participants. Data were collected from a total sample of 1,503 participants, accounting for 100 %. Descriptive statistics were used, including frequency, percentage, mean, and standard deviation. and use inferential statistics such as multiple binary logistic regression.

The results of this study found that the percentage of the harm of at least one type from alcohol drinking by other members in a household on the mother was 23.0%, with the harm on the mother having the highest percentage in ever being attacked by someone who drinks alcohol, scolding, yelling, insulting, disrespecting, being rude, disrespecting, and fighting at 3.8 %, followed by having traveled or ridden with a driver who drank alcohol at 3.2 %. The percentage of harm from drinking alcohol by other members in a household on children at least 1 type was 3.5%, with effects on children has the highest percentage of children in their care were harshly scolded. Due to the alcohol consumption of 2.2% of family members and having insufficient money to pay for raising children in their care due to family members' alcohol use 1.8 %.

Alcohol drinking by other members of the household included having ≥2 other heavy drinkers ($AOR = 22.96$; $95\%CI = 8.05, 65.46$), having other heavy drinkers 1 person ($AOR = 10.39$; $95\%CI = 7.13, 15.14$) and others drank but did not drink heavily ($AOR = 3.91$; $95\%CI = 2.78, 5.49$). Mothers' alcohol use included regular heavy drinking ($AOR = 3.25$; $95\%CI = 1.58, 6.68$) and drinking but not episodic drinking ($AOR = 1.77$; $95\%CI = 1.19, 2.63$) were associated with at least one type of maternal harms that is statistically significant.

Alcohol drinking by other members of the household included having one other person heavy drinking ($AOR = 11.1$; $95\%CI = 4.73, 26.44$) and having other people drink

but not heavy drinking (AOR = 3.41; 95%CI = 1.41, 8.22) Maternal alcohol drinking included regular heavy drinking (AOR = 5.75; 95%CI = 1.69, 19.61) and drinking but not heavy drinking (AOR = 4.23; 95%CI = 1.96, 9.16) were associated with at least one type of harm to children with statistical significance.

Therefore, agencies at the policy level should have a law passed prohibiting other members of the household including the mother have drinking alcohol if there is a mother or child under 5 years of age in the household. The relevant operational level agency should organize activities to screen and health promotion for mothers or children who are at risk of being harmed by the drinking of other members of the household, such as households where one member of the household drinks alcohol, and should provide communication channels requesting various assistance for at-risk mothers and children whose households have other household members who drinking alcoholic.

Keywords: Alcohol drinking, household members, harms from others drinking, mothers, and children

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณอาสาสมัคร datum ที่เป็นอาสาสมัครในงานวิจัยนี้ ที่ให้ความร่วมมือและเสียเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์ในงานวิจัยนี้

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง ๖ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล อำเภอปีงสามพัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่อนุญาตให้คณะผู้วิจัยได้เข้าเก็บรวมข้อมูล อำนวยความสะดวก เตรียมพื้นที่ในการเก็บข้อมูลและให้การสนับสนุนสถานที่ทำการวิจัย

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ คณะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง ๖ แห่ง ที่ให้ความอนุเคราะห์เตรียมชุมชนและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลงานวิจัยในครั้งนี้ จนสำเร็จด้วยดี

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สนับสนุนทุนวิจัยในการดำเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้

คณะผู้วิจัย
มกราคม 2567

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ก
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ค
กิตติกรรมประกาศ	จ
สารบัญ	ฉ
สารบัญตาราง	ณ
สารบัญแผนภูมิ	ญ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 คำจำกัดความการวิจัย.....	3
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย.....	3
1.4 สมมติฐานการวิจัย.....	3
1.5 ขอบเขตการวิจัย.....	3
1.6 ตัวแปรที่ศึกษา.....	4
1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย.....	6
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	7
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม.....	8
2.1 ความซุกของผลกระทบจากการดีเมเครื่องดีเมและผลกระทบ.....	8
2.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการดีเมเครื่องดีเมและผลกระทบของผู้อื่นต่อผู้หญิง.....	9
2.3 ความซุกของผลกระทบจากการดีเมเครื่องดีเมและผลกระทบของผู้อื่นต่อเด็ก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบ.....	10
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย	
3.1 รูปแบบการวิจัย.....	12
3.2 สถานที่ทำการวิจัย.....	12
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย.....	12
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.....	14
3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย.....	16
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล.....	17
3.7 ข้อพิจารณาทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์.....	18

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการวิจัย.....	19
4.1 ลักษณะทางประชารถของกลุ่มตัวอย่าง.....	20
4.2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง.....	22
4.3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือน.....	23
4.4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักของผู้ดื่มหนักในครัวเรือน ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด.....	24
4.5 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดา อย่างน้อย 1 ชนิด จำแนกตามพฤติกรรมการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ใน ครัวเรือน.....	26
4.6 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดาเป็นรายเหตุการณ์.....	30
4.7 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ใน ครัวเรือนต่อมารดา.....	31
4.8 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อนและ คนแปลกหน้าต่อมารดาเป็นรายเหตุการณ์.....	32
4.9 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็ก อย่างน้อย 1 ชนิด จำแนกตามพฤติกรรมการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ใน ครัวเรือน.....	34
4.10 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็ก.....	38
4.11 ร้อยละของผลกระทบโดยรวมและระดับความรุนแรงจากการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือน เพื่อนและคนแปลกหน้า ต่อมารดาและเด็ก	39
4.12 ร้อยละของการดูแลผู้ดื่มแอลกอฮอล์และเด็กในความดูแลของมารดา จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือน.....	40
4.13 การขอรับความช่วยเหลือ กรณีที่มารดาหรือเด็กเคยได้รับผลกระทบ.....	41
4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิก คนอื่นๆ ในครัวเรือนกับผลกระทบต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิด.....	42
4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิก คนอื่นๆ ในครัวเรือนกับผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด.....	45

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อจำกัดและจุดแข็ง และข้อเสนอแนะ.....	48
5.1 สรุปผลการวิจัย.....	48
5.2 อภิปรายผลการวิจัย.....	50
5.3 ข้อจำกัดและจุดแข็ง.....	52
5.4 ข้อเสนอแนะ.....	52
เอกสารอ้างอิง.....	54
ภาคผนวก.....	57
ภาคผนวก ก ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์.....	58
ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์.....	60
ภาคผนวก ค ประวัติคณาจารย์.....	67
ภาคผนวก ง ภาพกิจกรรมโครงการ.....	71

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างมาตราที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี จำแนกตามเพศ.....	11
4.1 ร้อยละของลักษณะทางประชารัฐของกลุ่มตัวอย่าง ($n= 1,503$).....	20
4.2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง ($n= 1,503$).....	22
4.3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือน ($n= 1,503$)...23	23
4.4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักของผู้ดื่มหนักในครัวเรือน ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ($n= 234$).....	24
4.5 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดา อย่างน้อย 1 ชนิด จำแนกตามพฤติกรรมการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ($n=1,503$)	27
4.6 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดาเป็นรายเหตุการณ์ ($n=1,503$).....	30
4.7 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดา ($n=1,503$)	32
4.8 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อนและคนแปลกหน้า ต่อมารดาเป็นรายเหตุการณ์ ($n=1,503$)	33
4.9 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด จำแนกตามพฤติกรรมการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ($n=1,503$).....35	35
4.10 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็ก ($n=1,503$)	38
4.11 ร้อยละของผลกระทบโดยรวมและระดับความรุนแรงจากการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน เพื่อนและคนแปลกหน้าต่อมารดา และเด็ก ($n=1,503$)	39
4.12 ร้อยละของการดูแลผู้ดื่มแอลกอฮอล์และเด็กในความดูแลของมาตรา จากการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือน ($n=1,503$)	40
4.13 การขอรับความช่วยเหลือกรณีมาตราหรือเด็กเคยได้รับผลกระทบจากการดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ($n= 378$)	41
4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่นๆใน ครัวเรือนกับผลกระทบต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิด.....	43
4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่นๆใน ครัวเรือนกับผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด.....	46

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่	หน้า
1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย.....	6

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ผลกระทบจากการดีมเครื่องดีมแอลกอฮอล์ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อตัวผู้ดื่มเองแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อผู้อื่น ซึ่งผลกระทบต่อผู้อื่นนั้นมีผลกระทบมากกว่าผลกระทบต่อตัวผู้ดื่มเอง ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากการดีมเครื่องดีมแอลกอฮอล์ของผู้อื่น ผลกระทบอาจมีเพียงเล็กน้อยจนถึงแก่ชีวิต เช่น นอนไม่หลับ วิตกกังวล การบาดเจ็บ การถูกทอดทิ้ง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ปัญหาทางการเงิน อุบัติเหตุจราจร และความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น ผู้หญิงเป็นเพศที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการดีมเครื่องดีมแอลกอฮอล์ของผู้อื่นสูงกว่าผู้ชาย การศึกษาใน 19 ประเทศในทวีปยุโรป พบว่า ทุก ๆ การเพิ่มขึ้นของชุกของการดีมอย่างหนัก 1 % เพิ่มความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการดีมเครื่องดีมแอลกอหอล์ของผู้อื่นในเพศชาย 5 % และในเพศหญิง 6% (Sundin et al., 2022) การศึกษาในประเทศไทย เผยว่า เพศหญิงและผู้ที่มีอายุน้อย มีความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากการดีมเครื่องดีมแอลกอหอล์จากผู้อื่นสูงกว่ากลุ่มอื่น ๆ (Moan et al., 2019) การศึกษาในประเทศไทยระบุเมริกา จำนวน 5 เรื่อง พบร่วมกันว่า เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการดีมเครื่องดีมแอลกอหอล์มากกว่าเพศชาย (White, 2020) การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการดีมเครื่องดีมแอลกอหอล์ของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเงินใน 15 ประเทศ รวมถึงประเทศไทย พบร่วมกันว่า ผู้หญิงมีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการดีมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเงินมากกว่าเพศชาย และความชุกอยู่ในประเทศไทย อินเดียและศรีลังกา ประมาณ 12-22% (Laslett et al., 2020) ผลกระทบจากการดีมเครื่องดีมแอลกอหอล์ของผู้อื่น ยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิง ได้แก่ ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ความคิดจะฆ่าตัวตาย การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและการใช้สารเสพติด (White, 2020) และมีคะแนนคุณภาพชีวิตที่ลดลง (Callinan et al., 2019) เป็นต้น นอกจากนั้น ผลกระทบจากการดีมเครื่องดีมแอลกอหอล์ของผู้อื่น ยังสร้างภาระในการดูแลอย่างมหาศาล จากการศึกษาการในการดูแลอย่างไม่เป็นทางการ เนื่องมาจากการดีมเครื่องดีมแอลกอหอล์ของผู้อื่นใน 11 ประเทศรวมถึงประเทศไทย ในกลุ่มตัวอย่าง 20,728 คน พบร่วมกันว่า ความชุกโดยรวมของการดูแลอย่างไม่เป็นทางการสูงถึง 47% ในประเทศไทย และผู้หญิงมีอัตราการดูแลเด็กและผู้อุปถัมภ์ในความอุปการะอื่น ๆ มากกว่าผู้ชาย (Jiang et al., 2022)

การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบจากการดีมเครื่องดีมแอลกอหอล์ของผู้อื่นต่อผู้หญิง โดยเฉพาะต่อมารดาที่ทำหน้าที่ในการดูแลบุตรทั้งในต่างประเทศและของประเทศไทยนั้นมีจำกัด ทำให้ขาดข้อมูลปัญหาผลกระทบจากการดีมของผู้อื่นต่อมารดาที่ทำหน้าที่ในการเลี้ยงดูบุตร ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบาง ที่อาจส่งผลกระทบต่อมารดาเองและบุตรที่กำลังเลี้ยงดู ครอบครัวและสังคมในระยะยาว

เพาะผลผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่นต่อมารดาที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยดูบุตรนั้น จะครอบคลุมถึงผลกระทบต่อจิตใจ ความรู้สึกไม่ปลดปล่อย ผลกระทบต่อร่างกายและทางเพศ ผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุจากรา ผลกระทบต่อทรัพย์สินเสียหายและการเงิน การมีภาระหน้าที่ในการดูแลผู้ที่ดื่มและผลลัพธ์ที่ตามมาที่เกิดขึ้นกับมารดา (Preampruchcha et al., 2022; Quigg et al., 2019a; Waleewong et al., 2017a) รวมทั้งผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่น ต่อบุตรที่กำลังเลี้ยงดู จะครอบคลุมในด้านประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ด้านวิชาชีพ ด้านการเงิน ด้านจิตใจ ด้านร่างกายและด้านการเคยใช้บริการหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองเด็กหรือบริการครอบครัว (Preampruchcha et al., 2022) เพาะผลผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่นต่อเด็กในประเทศไทย : บทเรียนจากโครงการขององค์กรอนามัยโลกและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)” โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลการสำรวจในปี ค.ศ. 2012-2013 ในเป็นปีดาหรือ มาตรา 952 คน ซึ่งมีเด็กในความปกครองอายุต่ำกว่า 18 ปี จาก 4 จังหวัดใน 4 ภาคและ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สุราษฎร์ธานี พบร่วม ความชุกของผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นต่อเด็กสูงถึงร้อยละ 15.89 ผลกระทบจากการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ของผู้อื่นต่อเด็ก กระจายตามลักษณะทางประชائر เศรษฐกิจและสังคม และผลกระทบตัวอยู่ในครอบครัวที่มีสมาชิก ในครัวเรือนที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก (Laslett et al., 2017) ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ พัฒนาการของเด็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Guttmannova et al., 2017) ครัวเรือนที่มีนักดื่มที่ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักและดื่มบ่อย มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นต่อเด็กเมื่อ เทียบกับครัวเรือนที่ไม่มีนักดื่ม 4.75 เท่าและ 1.95 เท่า ($AOR=4.75$ และ 1.92) ตามลำดับ (Preampruchcha et al., 2022) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่นรวมทั้งบิดาหรือมารดา (Guttmannova et al., 2017) การอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกับผู้อื่นที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างหนัก เพิ่มความเสี่ยงของผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นต่อเด็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Kaplan et al., 2017) ผลกระทบจากการศึกษาจะนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายสำหรับประเทศไทย ในการป้องกัน ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดาที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีต่อไป ประกอบกับอัตราความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน ประชากรวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไปของจังหวัดเพชรบูรณ์ สูงเป็นลำดับที่ 25 ของประเทศ (ร้อยละ 39.3) ซึ่งมีความเสี่ยงต่อมารดาที่กำลังเลี้ยงดูบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาเรื่อง ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกในครัวเรือนต่อมารดาที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรและบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี ในจังหวัดเพชรบูรณ์

1.2 คำถ้ามการวิจัย

1) ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ต่อมารดาที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีเป็นเท่าไร และชนิดของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดาที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มีชนิดใดบ้างและมีร้อยละเท่าไร

2) จำนวนนักดื่มคนอื่น ๆ ในครัวเรือน พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ความถี่ของการดื่มและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักของกลุ่มตัวอย่างและปัจจัยอื่น ๆ มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อมารดาที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรและต่อเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี หรือไม่ และมีขนาดความสัมพันธ์เป็นเท่าไร

1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) เพื่อวัดร้อยละและอธิบายลักษณะของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดาที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรและเด็กต่ำกว่า 5 ปี

2) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมารดา กับผลกระทบต่อมารดาที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรและต่อเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

1.4 สมมุติฐานการวิจัย

1) เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีหรือมารดาที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตร ผู้ที่มีสมาชิกในครัวเรือนคนอื่น ๆ เป็นนักดื่ม มีโอกาสได้รับผลกระทบจากการดื่มมากกว่าผู้ที่ไม่มีสมาชิกในครัวเรือนคนอื่น ๆ เป็นนักดื่ม

2) เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีหรือมารดาที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตร ผู้ที่มีสมาชิกในครัวเรือนคนอื่น ๆ มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำและดื่มอย่างหนัก มีโอกาสจะได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ที่ไม่มีสมาชิกในครัวเรือนคนอื่น ๆ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3) เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีหรือมารดาที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตร ผู้ที่มีมารดาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประจำและดื่มอย่างหนัก มีโอกาสจะได้รับอันตรายมากกว่าผู้ที่มารดาไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

1.5 ขอบเขตของการวิจัย

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา มีดังนี้

ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดา หมายถึง ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ซึ่งเป็นสมาชิกในครัวเรือน ไม่รวมถึงการดื่มของคนแปลกหน้าหรือเพื่อนบ้าน โดยประเมินจากประสบการณ์ของมารดาในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ ด้านจิตใจและความรู้สึกไม่ปลดภัย ด้านร่างกายและทางเพศ ด้านการเกิด อุบัติเหตุจราจร ด้านทรัพย์สินเสียหายและการเงิน ด้านภาระหน้าที่และการดูแลผู้ที่ดื่มและด้าน

ผลลัพธ์ที่ตามมา (Preampruchcha et al., 2022; Quigg et al., 2019a; Waleewong et al., 2017a)

ผลกระทบจากการดีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือนต่อเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี หมายถึง ผลกระทบจากการดีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนรวมถึงการดีมของกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่รวมถึงการดีมของคนแปลกหน้าหรือเพื่อนบ้าน โดยประเมินจากประสบการณ์ของมารดาในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ที่มีต่อบุตรของกลุ่มตัวอย่างและเด็กคนอื่น ๆ ในครัวเรือนที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ได้แก่ ด้านประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ด้านวิชา ด้านการเงิน ด้านจิตใจ ด้านร่างกายและด้านการเคยใช้บริการหน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองเด็กหรือบริการครอบครัว (Preampruchcha et al., 2022)

พฤติกรรมการดีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หมายถึง การเคยดีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความถี่ในการดีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การเคยดีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก ความถี่ของการดีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักและชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดีมบ่อยที่สุด

2) ขอบเขตด้านประชากร ประชากรเป็นมารดาที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรที่มีบุตรในความดูแล อายุต่ำกว่า 5 ปีอย่างน้อย 1 คน ครัวเรือนละ 1 คน ทุกคนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 25-30 คน รวม 1,503 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างในช่วงที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

3) ขอบเขตพื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการในพื้นที่ 6 อำเภอละ 1 ตำบลละ 10 หมู่บ้าน ๆ รวม 60 หมู่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์

4) ขอบเขตระยะเวลา ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวม 3 เดือน

1.6 ตัวแปรที่ศึกษา

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม พฤติกรรมการดีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมารดา พฤติกรรมการดีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการดีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดาและต่อเด็ก จึงได้กำหนดเป็นตัวแปรในการวิจัยดังนี้

ตัวแปรต้น ได้แก่

ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม ได้แก่

- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพสมรสอาชีพ
- รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
- การพักอาศัย

- จำนวนสมาชิกทั้งหมดที่อาศัยในครัวเรือน

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมารดา

- ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

- ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก

- ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มปอย

พฤติกรรมการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ได้แก่

- การมีสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือนที่ดื่ม

- จำนวนสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือนที่ดื่ม


- การมีสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือนที่ดื่มหนัก

- จำนวนสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือนที่ดื่มหนัก

**ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ใน
ครัวเรือนต่อมาตราและต่อเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี**

1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้น



แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการ เป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 เรื่อง
- 2) ต้นฉบับบทความสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนและของมารดาที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 1 เรื่อง
- 3) ผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง

บทที่ 2

การทบทวนวรรณกรรม

การวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกในครัวเรือนต่อมาตราที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรและบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้

- 2.1 ความชุกของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่นต่อผู้หญิงและผลกระทบ Callinan และคนอื่นๆ ได้ทำการศึกษาผลกระทบจากการดื่มของคู่สมรส เป็นการศึกษาในระดับนานาชาติ ผลกระทบและการลดลงของคุณภาพชีวิตในผู้หญิงใน 9 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ไอสแลนด์ ไทย ศรีลังกา อินเดีย ในจีเรีย เวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนลาว จากผู้หญิงที่อาศัยอยู่กับคู่สมรส จำนวน 7,091 คน พบว่า ผู้หญิงมีการรายงานว่าคู่สมรสดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักจนเป็นอันตราย ร้อยละ 4 ในประเทศไทยในจีเรีย ถึงร้อยละ 33 ในประเทศไทย เวียดนาม การดื่มอย่างหนักของนักดื่มในครัวเรือนเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่น นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้หญิงที่อาศัยอยู่กับคู่สมรสที่มีการดื่มอย่างหนักจนมีผลกระทบ มีความพึงพอใจในชีวิตที่ลดลง (Callinan et al., 2019) George และ Devi ได้ศึกษาเชิงคุณภาพในประเทศอินเดีย เพื่อทำความเข้าใจในประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ชายที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์ (AUD) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อเลือกผู้หญิงที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ชายที่เป็นโรคผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์ ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกบำบัดการเสพติด จำนวน 11 คน พบว่า ผู้หญิงต้องเผชิญกับปัญหานับไม่ถ้วน ทั้งสุขภาพที่ย่ำแย่ ความทุกข์ยาก ทางกาย ความบ้าดหมายในชีวิตสมรส ความปั่นป่วนทางอารมณ์ ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ตึงเครียด และภาระทางการเงิน (George & Devi, 2022) Greenfield และคนอื่นๆ ได้มีการศึกษาแนวโน้มของผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นต่อครอบครัว จากการศึกษาในระดับชาติ 4 ครั้ง โดยการวิเคราะห์แนวโน้มของผลกระทบในประชากรของประเทศไทยในระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-2015 โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากกลุ่มตัวอย่าง 21,184 คน พบว่า ผลกระทบที่สำคัญคือ ปัญหาครอบครัว/การแต่งงาน ปัญหาทางการเงิน การถูกทำร้ายและการก่อการ ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

- 2.1 ความชุกของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่นต่อผู้หญิงและผลกระทบ Callinan และคนอื่นๆ ได้ทำการศึกษาผลกระทบจากการดื่มของคู่สมรส เป็นการศึกษาในระดับนานาชาติ ผลกระทบและการลดลงของคุณภาพชีวิตในผู้หญิงใน 9 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ไอสแลนด์ ไทย ศรีลังกา อินเดีย ในจีเรีย เวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนลาว จากผู้หญิงที่อาศัยอยู่กับคู่สมรส จำนวน 7,091 คน พบว่า ผู้หญิงมีการรายงานว่าคู่สมรสดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักจนเป็นอันตราย ร้อยละ 4 ในประเทศไทยในจีเรีย ถึงร้อยละ 33 ในประเทศไทย เวียดนาม การดื่มอย่างหนักของนักดื่มในครัวเรือนเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่น นอกจากนั้นยังพบว่า ผู้หญิงที่อาศัยอยู่กับคู่สมรสที่มีการดื่มอย่างหนักจนมีผลกระทบ มีความพึงพอใจในชีวิตที่ลดลง (Callinan et al., 2019) George และ Devi ได้ศึกษาเชิงคุณภาพในประเทศอินเดีย เพื่อทำความเข้าใจในประสบการณ์ชีวิตของผู้หญิงที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ชายที่มีความผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์ (AUD) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เพื่อเลือกผู้หญิงที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ชายที่เป็นโรคผิดปกติจากการใช้แอลกอฮอล์ ที่เข้ารับการรักษาในคลินิกบำบัดการเสพติด จำนวน 11 คน พบว่า ผู้หญิงต้องเผชิญกับปัญหานับไม่ถ้วน ทั้งสุขภาพที่ย่ำแย่ ความทุกข์ยาก ทางกาย ความบ้าดหมายในชีวิตสมรส ความปั่นป่วนทางอารมณ์ ความสัมพันธ์ทางสังคมที่ตึงเครียด และภาระทางการเงิน (George & Devi, 2022) Greenfield และคนอื่นๆ ได้มีการศึกษาแนวโน้มของผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นต่อครอบครัว จากการศึกษาในระดับชาติ 4 ครั้ง โดยการวิเคราะห์แนวโน้มของผลกระทบในประชากรของประเทศไทยในระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-2015 โดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากกลุ่มตัวอย่าง 21,184 คน พบว่า ผลกระทบที่สำคัญคือ ปัญหาครอบครัว/การแต่งงาน ปัญหาทางการเงิน การถูกทำร้ายและการก่อการ ซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้น

อย่างมีนัยสำคัญจากปี 2000 ถึงปี 2015 ($P < 0.001$) และมีผลกระทบที่ต่ำมา คือ ภาวะซึมเศร้า และ/หรือความวิตกกังวล ซึ่งเกิดจากการดื่มของคุ่สมรส/คุ่ครอง และ/หรือสมาชิกในครอบครัว การคันพับชา คือ การดื่มอย่างหนักของเหยื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่น (Greenfield et al., 2015) งานวิจัยของ Sundin และคนอื่น ๆ ได้ศึกษาความชุกของผลกระทบร้ายแรงจากการดื่มของผู้อื่นเปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิง เป็นสำรวจแบบภาคตัดขวางในประชากรทั่วไปของประเทศไทย จำนวน 15,576 คน พบว่า ความชุกของผลกระทบร้ายแรงจากการดื่มของผู้อื่นในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาจากนักดื่มที่รู้จักและไม่รู้จักในผู้หญิง ร้อยละ 4.9 และร้อยละ 1.8 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าผู้ชาย ร้อยละ 1.9 และร้อยละ 1.2 ตามลำดับ การติดสุราเป็นปัจจัยทำนายผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นสำหรับทั้งสองเพศ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ของผลกระทบร้ายแรงจากนักดื่มที่รู้จักในเพศชายที่เป็นนักดื่มและผู้ที่ดื่มอย่างหนักมีประสบการณ์ของผลกระทบร้ายแรงจากนักดื่มที่รู้จัก ข้อสรุป ผู้หญิงต้องทนทุกข์ทรมานบ่อยมากขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่น ผู้ชายและผู้หญิงรายงานประสบการณ์ของผลกระทบร้ายรุนแรงที่แตกต่างกันจากการดื่มของคนที่รู้จัก (Sundin et al., 2021)

2.2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่นต่อผู้หญิง

งานวิจัยของ Seid และคนอื่น ๆ ได้ทำการสำรวจในระดับชาติของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2011 ในกลุ่มตัวอย่างประชากรทั่วไป จำนวน 2,569 คน พบว่า อายุที่น้อยกว่าและการดื่มอย่างหนักของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่น ผู้หญิงและผู้ที่มีการศึกษาดีกว่ามีแนวโน้มที่จะรายงานผลกระทบด้านลบต่อผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่น ผู้ที่มีการศึกษาดีกว่ามีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบด้านการเงินหรือการบาดเจ็บจากการดื่มของผู้อื่น (Seid et al., 2015) การศึกษาของ Quiquero และคนอื่น ๆ ได้ศึกษาความรุนแรงของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้อื่น (AHTO) และความสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยและสาธารณจักร เป็นการสำรวจแบบภาคตัดขวาง เก็บรวบรวมข้อมูลจากชาวเวลส์ รวม 891 คน ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ผ่านการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยถามประสบการณ์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาของ 9 ผลกระทบโดยตรงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่นและผลที่เชื่อมโยงต่อเนื่อง (เช่น ความเป็นห่วงลูก ดื่มเพื่อรับมือ) พบว่า ร้อยละ 43.5 ของกลุ่มตัวอย่าง มีประสบการณ์ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ร้อยละ 45.5 เกิดผลลัพธ์ที่เชื่อมโยงอย่างน้อยหนึ่งอย่าง โอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่นอย่างน้อย 1 ชนิดเพิ่มขึ้นเมื่อกลุ่มอายุลดลง (Adjusted Odds Ratio [AORs]: 1.9 เท่าในกลุ่มอายุ 65–74 ปี เป็น 4.2 เท่าในกลุ่มอายุ 18–34 ปี) และผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักเพิ่มความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่น 1.5 เท่า (AOR; 1.5, $p < 0.05$) ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่นด้านการเงิน (AOR 2.2; $p < 0.001$) การถูกเพิกเฉย (AOR 2.3; $p < 0.01$) และความเสียหายต่อทรัพย์สิน (AOR 2.2; $p < 0.05$) (Quiquero et al., 2019b) และการศึกษาของ Greenfield และคนอื่น ๆ ได้มีการศึกษาแนวโน้ม

ของผลกระทบจากการดีมของผู้อื่นต่อครอบครัว จากการศึกษาในระดับชาติ 4 ครั้ง ในประชากรของประเทศไทยหรือเมริกาในระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-2015 พบว่า การดีมอย่างหนักของเหยื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากการดีมของคนอื่น (Greenfield et al., 2015) จะเห็นได้ว่าปัจจัยด้าน อายุ ระดับการศึกษา การดีมของกลุ่มตัวอย่างและการดีมของผู้อื่นมีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการดีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่นต่อผู้หญิง

2.3 ความชุกของผลกระทบจากการดีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่นต่อเด็ก ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบ

การศึกษาของ Perawas Preampruchcha และคนอื่น ๆ ในประเทศไทย เรื่อง “ ผลกระทบจากการดีมของผู้อื่นต่อเด็กในประเทศไทย : บทเรียนจากโครงการขององค์กรอนามัยโลกและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ” โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลการสำรวจในปี ค.ศ. 2012-2013 กลุ่มตัวอย่างเป็นพ่อแม่ จำนวน 952 คน ที่มีเด็กหรือวัยรุ่นในปีครอง อายุต่ำกว่า 18 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี สุราษฎร์ธานีและกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผลกระทบจากการดีมของผู้อื่นในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ใน 6 ประเดือน โดยใช้คำตาม 1) “เด็ก ๆ เคยพบเห็นความรุนแรงในบ้านบ้างหรือไม่” 2) “เด็กถูกดูด่า วิจารณ์ ลูกทำร้ายด้วยวาจา หรือไม่” 3) “เงินไม่พอสำหรับสิ่งของที่เด็กๆ ต้องการใช้หรือไม่” 4) “เด็กถูกทอดทิ้งในสถานการณ์ที่ไม่ได้รับการดูแลหรือไม่ปลดภัยหรือไม่” 5) “เด็กถูกทำร้ายทางร่างกาย?” 6) “มีการเรียกหน่วยงานคุ้มครองเด็กหรือบริการครอบครัวหรือไม่” แต่ละข้อมูลตอบให้กับกลุ่มตัวอย่างเลือก ไม่เคย, 1-2 ครั้ง และ 3 ครั้งขึ้นไป แต่ละคำตาม หากกลุ่มตัวอย่างตอบว่าเคย จะถูกถามต่อว่า “บุคคลที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ มีความสัมพันธ์อะไรกับเด็ก” คำตอบมีให้เลือก “พ่อแม่ พ่อเลี้ยง พี่น้อง ลูกพี่ลูกน้อง และคนอื่นๆ โปรดระบุ....” ผลการศึกษาพบว่า ความชุกของผลกระทบจากการดีมของผู้อื่นต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด ร้อยละ 15.89 พ่อแม่ที่อายุมากกว่า 60 ปีเป็นปัจจัยป้องกันผลกระทบจากการดีมของผู้อื่นต่อเด็ก เมื่อเทียบกับพ่อแม่ที่อายุ 18-29 ปี ($AOR= 0.19; 95\%CI: 0.06-0.58$) ครัวเรือนที่มีนักดีมอย่างหนักและมีความถี่ในการดีมบ่อย มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการดีมของผู้อื่นต่อเด็กเมื่อเทียบกับครัวเรือนที่ไม่มีนักดีม ($AOR=4.75$ และ 1.92 ตามลำดับ) (Preampruchcha et al., 2022) การศึกษาในประเทศไทยหรือเมริกาของ Guttmannova และคนอื่น ๆ แบบระยะยาวยา (Cohort study) ในบิดาหรือมารดาที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูเด็กในปีครองอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 123 คน พบว่า การดีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบิดาหรือมารดา ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Guttmannova et al., 2017) การศึกษาของ Freisthler และคนอื่น ๆ แบบผสมผสาน (Mixed method) ทั้งเชิงปริมาณแบบภาคตัดขวางในบิดามารดา จำนวน 1,599 คน และเชิงคุณภาพในบิดามารดา จำนวน 23 คน พบว่า ปริมาณการดีมที่เพิ่มขึ้นของบิดาหรือมารดา เพิ่มความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการดีมของผู้อื่นต่อเด็ก (Freisthler et al., 2020) และงานวิจัยของ Kaplan และคนอื่น ๆ แบบภาคตัดขวาง ในบิดาหรือมารดา จำนวน 764 คน พบว่า ความชุกของผลกระทบจากการดีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่นต่อเด็ก ร้อยละ 7.4 ผู้ดูแลเด็กที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกับผู้อื่น

ที่มีการดื่มอย่างหนัก มีความเสี่ยงของผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นต่อเด็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Kaplan et al., 2017) งานวิจัยของ Laslett และคนอื่น ๆ ในระดับนานาชาติจาก 8 ประเทศรวมถึงประเทศไทย เกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่นต่อเด็ก เป็นการสำรวจในระดับครัวเรือนในบิดาหรือมารดา จำนวน 7,848 คน ที่มีเด็กในความดูแลอายุ 0-17 ปี โดยพิจารณาผลกระทบ 4 ด้าน ได้แก่ ถูกทำร้ายด้านร่างกาย ถูกทำร้ายทางวาจา ถูกกระทำการรุนแรงในครอบครัวและถูกปล่อยทิ้งไว้ในสถานที่ไม่ปลอดภัย พบว่า ความชุกของผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นต่อเด็กมีความหลากหลายตั้งแต่ ร้อยละ 4 ในประเทศไทยจนถึงร้อยละ 14 ในประเทศเวียดนาม ผลกระทบจากการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ของผู้อื่นต่อเด็กกระจายตามลักษณะทางประชากรเศรษฐกิจและสังคม และผลกระทบตัวอยู่ในครอบครัวที่มีสมาชิกดื่มอย่างหนัก (Laslett et al., 2017) โดยสรุปจะเห็นได้ว่า ความชุกของผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นต่อเด็กมีความหลากหลายในต่างประเทศ แต่มีอัตราที่สูงในประเทศไทย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นต่อเด็ก ได้แก่ ลักษณะทางประชากรเศรษฐกิจและสังคม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักและพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบิดาหรือมารดา มีความสัมพันธ์กับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่นต่อเด็ก

บทที่ 3

ระเบียบวิธีการวิจัย

3.1 รูปแบบงานวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study)

3.2 สถานที่ทำวิจัย

พื้นที่ดำเนินการ 6 อำเภอ 1 ตำบล ละ 10 หมู่บ้านฯ รวม 60 หมู่บ้าน ในจังหวัดเพชรบูรณ์

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ประชากรเป้าหมาย

เป็นมาตราที่กำหนดให้เด็กดูบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี ในจังหวัดเพชรบูรณ์

เกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าสู่การศึกษา (Eligibility criteria)

เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria)

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และมีบุตรในความดูแลอายุต่ำกว่า 5 ปีอย่างน้อย 1 คน

เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria)

เป็นมาตราเดี้ยงเดี้ยวหรืออ่านภาษาไทยไม่ได้

เกณฑ์ยุติการศึกษา (Termination criteria)

ไม่มี

กลุ่มตัวอย่าง

เป็นมาตราที่กำหนดให้เด็กดูบุตร ที่มีบุตรอยู่ในความดูแลอายุต่ำกว่า 5 ปีอย่างน้อย 1 คน ครัวเรือนละ 1 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง ในช่วงการเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวม 3 เดือน

การคำนวณขนาดตัวอย่าง

การวิจัยนี้ คำนวณขนาดตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้สูตรประมาณค่าสัดส่วน กรณีที่رابประชากร มีสูตรดังนี้

$$n = \left(\frac{NZ_{\alpha/2}^2 p^{(1-p)}}{(N-1)e^2 + Z_{\alpha/2}^2 p^{(1-p)}} \right) \times \text{design effect}$$

เมื่อ เมื่อ n = ขนาดตัวอย่าง

N = ประมาณการมาตราที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 18,000 คน

$$Z\alpha/2 = \text{ค่าคงแหน่งปกติมาตรฐานที่ระดับ } \alpha = 0.05 \approx 1.96$$

ρ = ความชุกของผลกระทบจากการตื้มของผู้อ่อนต่อเด็กในประเทศไทย ร้อยละ 15.89 (Preampruchcha et al., 2022)

$$e = \text{ค่าความแม่นยำของการประมาณค่า} = 0.03$$

ได้ขนาดตัวอย่าง = 1,473 คน งานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 1,500 คน

การสุ่มตัวอย่าง

มีวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนและแบบกลุ่ม (Multi-stage cluster random sampling) ดังนี้

- 1) สุ่มอำเภออย่างง่ายมา 6 อำเภอ จาก 11 อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์
- 2) แต่ละอำเภอ ทำการสุ่มตัวอย่างตำบลอย่างง่าย อำเภอละ 1 ตำบล ได้ตำบล 6 ตำบล
- 3) แต่ละตำบล ทำการสุ่มตัวอย่างหมู่บ้านอย่างง่าย (Simple random sampling) ตำบลละ 10 หมู่บ้าน ได้หมู่บ้าน รวม 60 หมู่บ้าน
- 4) แต่ละหมู่บ้าน จะใช้กลุ่มตัวอย่างมาตราที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตร ที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี อย่างน้อย 1 คน ครัวเรือนละ 1 คน ทุกคนที่อยู่ในความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) หมู่บ้านละ 25-30 คน รวม 1,500 คน แต่งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ทั้งสิ้น 1,503 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมาย ดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 ร้อยละของกลุ่มตัวอย่างมาตราที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี จำแนกตำบล

ที่	อำเภอ	ตำบล	จำนวนหมู่บ้านที่สำรวจ	จำนวนอาสาสมัคร	ร้อยละ
1	เมืองเพชรบูรณ์	นาป่า	12	258	17.2
2	หนองไผ่	บ้านโภชน์	10	252	16.8
3	บึงสามพัน	วังพิกุล	9	247	16.4
4	วิเชียรบุรี	โคกปรง	10	247	16.4
5	หล่มสัก	วัดป่า	10	257	17.1
6	หล่มเก่า	บ้านเนิน	9	242	16.1
รวม			60	1,503	100.0

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่ผ่านมา ประกอบด้วย 7 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชารถ เศรษฐกิจและสังคม จำนวน 6 ข้อ ลักษณะข้อคำถามมีทั้งปลายเปิดให้เติมคำและปลายปิดให้เลือกตอบ ประกอบด้วย อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ของครอบครัวต่อเดือน การพักอาศัยและจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่อาศัยในครัวเรือน

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมารดา จำนวน 4 ข้อ เป็นข้อคำถามปลายปิดให้เลือกตอบ ประกอบด้วย ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มบ่อยและผลกระทบของการดื่มของมารดาต่อผู้อื่น ซึ่งลักษณะคำถามเป็น rating scale 10 ระดับ จำนวน 1 ข้อ รวมทั้งสิ้น 5 ข้อ

ส่วนที่ 3 ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว เพื่อนและคนแปลกหน้าต่อมารดา ในช่วง 12 เดือน (ประยุกต์ของรหัส วลีวงศ์และคนอื่นๆ) ลักษณะคำถามเป็น rating scale 3 ระดับ ได้แก่ ไม่เคย เคย 1-2 ครั้ง และเคย 3 ครั้งขึ้นไป จำนวน 12 ข้อ ได้แก่ 1) เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ดูด่าจากล้วง ตะคอก ดูถูก เหียดหมาย หยาบคาย ดูหมิ่นและทะเลาะ 2) เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ผลัก ดึง 3) เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ทำร้ายร่างกาย (ทุบ ตบตี แตะ ต่อย) 4) เคยถูกคนอื่นที่ดื่มแอลกอฮอล์ ทำลายข้าวของหรือทรัพย์สิน 5) เคยเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน ที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น (เช่น เป็นผู้โดยสาร คู่กรณี ได้รับลูกหลง บาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย) 6) บ้าน รถ หรือทรัพย์สินต่างๆ เคยได้รับความเสียหาย เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น 7) เคย โดยสารหรือนั่งรถไปกับคนขับรถที่ดื่มแอลกอฮอล์ 8) เคยถูกรบกวน โดยคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ในระหว่างงานเลี้ยงหรือสถานที่ส่วนบุคคลอื่นๆ 9) เคยรู้สึกว่าถูกข่มขู่หรือรู้สึกกลัว คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ในบ้านตนเอง/ในสถานที่ส่วนบุคคลอื่นๆ 10) เคยมีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาชีวิตสมรสเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น 11) เคยมีปัญหากับเพื่อนหรือเพื่อนบ้านเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น และ 12) เคยมีปัญหาทางด้านการเงิน เช่น ไม่มีเงินพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น (Waleewong et al., 2017) แต่ละคำถาม หากกลุ่มตัวอย่างตอบว่าเคย จะถูกถามต่อว่า “ถ้าเคย บุคคลดังกล่าวเป็นใคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)” คำตอบมีให้เลือก “สามี คนในครอบครัวที่ไม่ใช่สามี เพื่อนและคนแปลกหน้า”

ส่วนที่ 4 ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัวต่อมารดาและพฤติกรรมการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ข้อคำถามทั้งปลายเปิดให้เติมคำและปลายปิดให้เลือกตอบ ประกอบด้วย การมีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดื่มและจำนวนคนที่ดื่ม การมีสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือนที่ดื่มหนักและจำนวนผู้ดื่มหนัก รวม 4 ข้อ ถ้ามีคนในครอบครัวที่ดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก คนเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่างอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) และอันตรายจากการดื่มของสมาชิกในครัวเรือนคนอื่นๆ ต่อมารดา ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา (Quigg et al., 2019) จำนวน 10 ข้อ ได้แก่ 1) เคยรู้สึกเสียใจ/รู้สึกว่าถูกเพิกเฉย เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 2)

เคยรู้สึกไม่อยากใส่ใจ (ไม่อยากแม้แต่จะมองหน้า) คนตั้งกล่าว เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 3) เคยหมดสนุกหรือเกิดปัญหาในงานสังคมต่างๆ ที่คุณเข้าร่วม เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 4) เคยถูกคนเหล่านั้น ขโมยเงินหรือของมีค่าของคุณ เพราะการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 5) เคยถูกบังคับหรือกดขี่ทางเพศ เพราะการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 6) เคยต้องหลีกเลี่ยง โดยไม่พบรูปเพื่อน ญาติพี่น้อง เพราะรู้สึกอาย เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของผู้อื่น ถึงพฤติกรรมการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 7) เคยต้องหนีออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่น เพราะการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 8) เคยมีเงินไม่เพียงพอ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 9) เคยดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเตรียมรับมือกับการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 10) เคยดูด่าว่ากล่าวหรือคุยเรื่องตีบุตรหรือเด็กปีกของ เพื่อประชด/ระบายความเครียด เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว และผลกระทบของการดีมของผู้อื่นต่อมารดา ลักษณะคำถามเป็น rating scale 10 ระดับ จำนวน 1 ข้อ รวมทั้งสิ้น 16 ข้อ (Waleewong et al., 2017)

ส่วนที่ 5 การต้องดูแลผู้ดื่มแอลกอฮอล์และเด็กในความดูแลของมารดา ลักษณะคำถาม เป็น rating scale 3 ระดับ ได้แก่ ไม่เคย เคย 1-2 ครั้ง และเคย 3 ครั้งขึ้นไป จำนวน 4 ข้อ ประกอบด้วย 1) การเคยดูแลคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่ดื่มแอลกอฮอล์เนื่องมาจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 2) เคยต้องดูแลเด็กหรือคนอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นเนื่องมาจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 3) เคยต้องทำความสะอาดบ้าน หลังจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 4) เคยต้องดูแลเด็กหรือคนอื่นๆ เพื่อส่งคนในครอบครัวหรือเพื่อน เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว

ส่วนที่ 6 ผลกระทบจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัวต่อเด็กในความดูแล ลักษณะคำถาม เป็น rating scale 3 ระดับ ได้แก่ ไม่เคย เคย 1-2 ครั้ง และเคย 3 ครั้งขึ้นไป จำนวน 6 ข้อ ประกอบด้วย 1) เด็กที่ดูแลถูกทอดทิ้งหรือถูกปล่อยให้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจาก การดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 2) เด็กที่ดูแล ถูกดูด่าอย่างรุนแรง เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 3) เด็กที่ดูแล ถูกตีหรือถูกทำร้ายร่างกาย เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 4) เด็กที่ดูแล อยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 5) เด็กที่ดูแล ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานคุ้มครองเด็ก และเยาวชน เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว และ 6) เคยมีเงินไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กที่คุณดูแล เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว และผลกระทบของการดีมของผู้อื่นต่อเด็ก ลักษณะคำถาม เป็น rating scale 10 ระดับ จำนวน 1 ข้อ รวมทั้งสิ้น 7 ข้อ

ส่วนที่ 7 การขอรับความช่วยเหลือ กรณีที่มารดาหรือเด็กในความดูแลเคยได้รับผลกระทบ ลักษณะคำถาม เป็น rating scale 3 ระดับ ได้แก่ ไม่เคย เคย 1-2 ครั้ง และเคย 3 ครั้งขึ้นไป จำนวน 5 ข้อ ประกอบด้วย 1) เคยต้องโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากตำรวจ เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 2) เคยต้องไปรับบริการแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลหรือนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

เพราะได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 3) เคยต้องไปพบแพทย์ พยาบาล ที่สถานบริการสาธารณสุขต่างๆ รวมถึงการซื้อยาเพื่อรักษาตนเองที่ร้านขายยา เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว 4) เคยไปรับบริการหรือขอคำปรึกษาที่ศูนย์บริการต่างๆ (เช่น สายด่วนของทั่วโลก มูลนิธิเพื่อสังคมต่างๆ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน) เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว และ 5) เคยต้องไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำจากผู้นำชุมชน เพื่อน เพื่อบ้าน หรือหน่วยบริการอื่นๆ เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว

ส่วนที่ 8 พฤติกรรมการดีมแอลกอฮอล์ของผู้ดีมหนักในครัวเรือนที่ส่งผลกระทบต่อมาตรามากที่สุด ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จำนวน 7 ข้อ ลักษณะข้อคำถามมีทั้งปลายเปิดให้เติมคำและปลายปิดให้เลือกตอบ ประกอบด้วย คนที่ดีมหนักดังกล่าว มีความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่างอย่างไร เพศของคนดีมหนักคนนั้น อายุของคนดีมหนักคนนั้น คนที่ดีมหนักคนนั้นดีมเป็นอย่างไร คนที่ดีมหนักคนนั้นดีมเครื่องดีมแอลกอฮอล์ขนาดมากที่สุด คนที่ดีมหนักคนนั้นเวลาที่ดีมหนักมีอาการอย่างไร คนที่ดีมหนักคนนั้นส่วนใหญ่ดื่มในบ้านหรือนอกบ้าน

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ แบบสัมภาษณ์ทุกส่วนมีการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในเรื่องการสภาพเด็กและสุขภาพจิตระดับจังหวัด และนำมาหาค่าความตรงของแบบสอบถาม (ค่า IOC) จากนั้น นำแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบความตรงแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างมาตราในตำบลท่าแพ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 30 คน เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องของแบบสัมภาษณ์และปรับปรุง ก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง

3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย

การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสัมภาษณ์โดยนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ผ่านการฝึกอบรมการใช้แบบสัมภาษณ์เป็นอย่างดี ณ บ้านของอาสาสมัคร มีขั้นตอนดังนี้

1) อบรมผู้ช่วยผู้วิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ชั้นปีที่ 3 เพื่ออธิบายวัตถุประสงค์ การรักษาความลับของอาสาสมัคร กระบวนการให้ข้อมูลแก่อาสาสมัครเพื่อขอความยินยอมและขั้นตอนการการสัมภาษณ์ข้อมูล

2) ผู้วิจัยทำการวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) พื้นที่เป้าหมาย เพื่อทำการคัดกรองอาสาสมัคร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

3) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทำการนัดกับกลุ่มอาสาสมัครมาตราทุกคน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของอสม. ณ ศาลากลางบ้าน ของแต่ละหมู่บ้าน

4) ผู้วิจัยทำการแจกคำอธิบายอาสาสมัครและเอกสารคำยินยอมอาสาสมัครแบบสอบถามให้แก่อาสาสมัคร พร้อมอธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและให้เวลาในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ หากยินยอมให้ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าร่วมโครงการในเอกสารคำยินยอมอาสาสมัคร

5) ผู้วิจัย ผู้ช่วยผู้วิจัยและอสม. จัดสถานที่ในการสัมภาษณ์ให้เป็นการส่วนตัวแก่อาสาสมัคร พร้อมทั้งแจกคู่มือแนวทางในการขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว ประกอบด้วย หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือและช่องทางการสื่อสาร สิทธิ และรูปแบบการได้รับความช่วยเหลือ เป็นต้น

- 6) ผู้ช่วยผู้วิจัย ทำการสัมภาษณ์อาสาสมัคร โดยใช้เวลาสัมภาษณ์ประมาณ 20 นาทีต่อคน
- 7) นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัย ทำการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของแบบสัมภาษณ์
- 8) ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามส่งให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ต่อไป

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

ผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิด หมายถึง ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสามีและสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนที่เป็นรายเหตุการณ์ ไม่รวมเพื่อนและคนแปลกหน้า (แบบสัมภาษณ์ส่วนที่ 3) รวมกับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน (แบบสัมภาษณ์ส่วนที่ 4) อย่างน้อย 1 ชนิด

ผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด หมายถึง ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสามีและสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน รวมถึงการดื่มของมารดาต่อเด็ก (แบบสัมภาษณ์ส่วนที่ 6) อย่างน้อย 1 ชนิด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติเชิงพรรณนา ตัวแปรที่มีการวัดค่าตัวแปรเชิงคุณภาพ (Categorical) วิเคราะห์ด้วย ความถี่ ร้อยละ ส่วนตัวแปรที่มีการวัดเชิงปริมาณ (Continuous) วิเคราะห์ด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ต่ำสุด เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมารดา ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว เพื่อนและคนแปลกหน้าต่อมารดา ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดา พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสามีและสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน การต้องดูแลผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์และเด็กในความดูแล ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนรวมมารดาต่อเด็กในความดูแล การขอรับความช่วยเหลือกรณีที่มารดาหรือเด็กในความดูแลเคยได้รับผลกระทบ และพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ดื่มหนักในครัวเรือน ที่ส่งผลกระทบต่อมารดามากที่สุด

สถิติเชิงอนุมาน ใช้สถิติ Multiple logistic regression โดยนำเสนอค่า Adjusted odds ratio (AOR) พร้อมช่วงเชื่อมั่น 95%CI และค่า p-value เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมารดา พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน กับผลกระทบต่อการดาหรือต่อเด็ก (เคยอย่างน้อย 1 ชนิด/ไม่เคย) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R Studio Version 4.0.3 หรือสูงกว่า และกำหนดนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3.7 ข้อพิจารณาทางจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

งานวิจัยนี้ ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เลขที่รับรอง HE-175-2566 วันที่รับรอง 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

บทที่ 4

ผลการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดร้อยละและอธิบายลักษณะของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดาที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน และพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมาตรากับผลกระทบต่อมารดาที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิจัยตามหัวข้อดังต่อไปนี้

- 4.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
- 4.2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง
- 4.3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน
- 4.4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักของผู้ดื่มหนักในครัวเรือนที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด
- 4.5 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิด จำแนกตามพฤติกรรมการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน
- 4.6 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ต่อมารดาเป็นรายเหตุการณ์
- 4.7 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ต่อมารดา
- 4.8 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อนและคนแปลกหน้าต่อมารดาเป็นรายเหตุการณ์
- 4.9 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็ก อย่างน้อย 1 ชนิด จำแนกตามพฤติกรรมการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน
- 4.10 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็ก
- 4.11 ร้อยละของผลกระทบภาพรวมและระดับความรุนแรงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน เพื่อนและคนแปลกหน้าต่อมารดาและเด็ก
- 4.12 ร้อยละของการดูแลผู้ดื่มแอลกอฮอล์และเด็กในความดูแลของมารดา จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน
- 4.13 การขอรับความช่วยเหลือ กรณีที่มารดาหรือเด็กเคยได้รับผลกระทบ

4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือนกับผลกระทบต่อการตายอย่างน้อย 1 ชนิด

4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือนกับผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด

4.1 ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างมารดาที่ดูแลเด็กทั้งหมด 1,503 คน พบร่วม ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 30 ปี ร้อยละ 30.5 อายุเฉลี่ย 41.4 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 38.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสคู่ตามกฎหมาย ร้อยละ 75.2 หากกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกร (ร้อยละ 60.1) ร้อยละ 55.2 ของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ของครัวเรือนต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน หากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนสมาชิกในครัวเรือนต่ำกว่า 5 คน (ร้อยละ 57.1) และส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างพักอาศัยอยู่กับบุตรของตนเองและ/หรือของสามี (ร้อยละ 61.1) รองลงมาอยู่กับคู่สมรส/แฟน (ร้อยละ 57.4) ดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ร้อยละของลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ($n= 1,503$)

ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	ร้อยละ
อายุ (ปี)		
<30	212	14.1
30-39	459	30.5
40-49	476	31.7
≥50	356	23.7
mean 41.4 median 41.0 s.d. 10.3 max 60 min 18		
ระดับการศึกษา		
ประถมศึกษาและต่ำกว่า	584	38.9
มัธยมศึกษาตอนต้น	310	20.6
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	397	26.4
ปวส./ปวท./อนุปริญญา	65	4.3
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	147	9.8
สถานภาพสมรส (ตามกฎหมาย)		
โสด	194	12.9
สมรส	1130	75.2
หม้าย	83	5.5
หย่า/แยก	96	6.4

ตารางที่ 4.1 ร้อยละของลักษณะทางประชารักษ์ของกลุ่มตัวอย่าง ($n= 1,503$) (ต่อ)

ลักษณะทางประชารักษ์ของกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	ร้อยละ
อาชีพ		
รับจ้างทั่วไป	476	31.7
เกษตรกร	426	28.4
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	234	15.6
แม่บ้าน	150	10.0
ว่างงาน	80	5.3
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน	60	4.0
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	35	2.3
ลูกจ้างรัฐฯ	33	2.2
รับจ้างโรงงาน	8	0.5
ระดับรายได้ของครอบครัวต่อเดือน (บาท)		
<10,000	830	55.2
10,000-19,999	421	28.0
≥20,000	252	16.8
mean 11,558.7 median 9,000 s.d. 11231.9 max 150,000 min 700		
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)		
<5	858	57.1
≥5	645	42.9
mean 4.7 median 4.0 s.d. 1.7 max 15 min 1		
การพักอาศัยของมารดา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)		
บุตรของตนเอง และ/หรือของสามี	994	66.1
คู่สมรส/แฟน	862	57.4
พ่อแม่ของตนเอง	531	35.3
คนอื่นๆ เช่น หลาน	177	11.8
พ่อแม่ของสามี	160	10.6
ญาติคนอื่น ๆ ฝ่ายตนเอง	35	2.3

4.2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่าง มีร้อยละของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา สูงถึงร้อยละ 38.6 โดยส่วนใหญ่มีความถี่ของการดื่มเป็นครั้งคราว ร้อยละ 24.3 นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักเป็นครั้งคราวและประจำ ร้อยละ 27.0 ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมดื่มมากที่สุด ได้แก่ เปียร์ รองลงมา คือ สุราสีหรือสุราแดง รายละเอียดดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง ($n = 1,503$)

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน	ร้อยละ
ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วง 12 เดือน		
ไม่ดื่มในช่วง 12 เดือน	923	61.4
ดื่มเป็นครั้งคราว	504	33.6
ดื่มเป็นประจำ	76	5.0
ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก		
ไม่ดื่มในรอบ 12 เดือน	922	61.5
ดื่มแต่ไม่ดื่มหนัก	172	11.5
ดื่มหนักเป็นครั้งคราว	364	24.3
ดื่มหนักเป็นประจำ	41	2.7
ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ดื่มบ่อยที่สุด		
ไม่ดื่มในช่วง 12 เดือน	922	61.5
เปียร์	393	26.2
สุราสี/สุราแดง	72	4.8
สุราขาว/สุรากลั่นในขุมชน	61	4.1
ไวน์/ไวน์คูลเลอร์/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม	42	2.8
เหล้าดองยา/สุราจีน/สาโท กระแซ	9	0.6

4.3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน

กลุ่มตัวอย่างมีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 52.8 โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร้อยละ 11.1 กลุ่มตัวอย่างมีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนมีการดื่มอย่างหนัก ร้อยละ 17.7 โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดื่มอย่างหนักอยู่ 1 คน ร้อยละ 17.7 สมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนที่ดื่มหนักเป็นสามีหรือแฟนของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 14.4 รายละเอียดดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ($n = 1,503$)

พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน	จำนวน	ร้อยละ
การมีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนที่ดื่มในช่วง 12 เดือน		
ไม่มีคนอื่น ๆ ดื่ม	709	47.2
มีคนอื่น ๆ ดื่ม	794	52.8
จำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนที่ดื่มในช่วง 12 เดือน		
ไม่มีคนอื่น ๆ ที่ดื่มในรอบ 12 เดือน	709	47.2
มีคนอื่น ๆ ดื่ม 1 คน	627	41.7
มีคนอื่น ๆ ดื่ม ≥ 2 คน	167	11.1
การมีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนที่ดื่มหนัก ในช่วง 12 เดือน		
ไม่มีคนอื่น ๆ ดื่มในรอบ 12 เดือน	709	47.2
มีคนอื่น ๆ ดื่ม แต่ไม่ดื่มหนัก	528	35.0
มีคนอื่น ๆ ดื่มหนัก	266	17.8
จำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนที่ดื่มหนัก ในช่วง 12 เดือน		
ไม่มีคนอื่น ๆ ดื่มในรอบ 12 เดือน	709	47.2
มีคนอื่น ๆ ดื่ม แต่ไม่ดื่มหนัก	527	35.1
มีคนอื่น ๆ ดื่มหนัก 1 คน	248	16.5
มีคนอื่น ๆ ดื่มหนัก ≥ 2 คน	19	1.3
สมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนที่ดื่มหนักในช่วง 12 เดือน (ตอบมากกว่า 1 ข้อ)		
สามี/แฟน	217	14.4
เด็กภายใต้การดูแล อายุ 18 ปีขึ้นไป	16	1.1
พ่อตนเอง/พ่อสามี	15	1.0
ปู่/ตา/ย่า/ยาย	13	0.9
แม่ตนเอง/แม่สามี	10	0.7
ญาติผู้หญิงคนอื่น ๆ (เช่น ป้า อา น้า)	10	0.7
พี่ชาย/น้องชาย	9	0.6
ญาติผู้ชายคนอื่น ๆ (เช่น ลุง อา น้า)	7	0.5
เด็กภายใต้การดูแล อายุ 18 ปีลงไป	4	0.3
พี่สาว/น้องสาว	4	0.3

4.4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักของผู้ดื่มหนักในครัวเรือนที่ส่งผล กระบวนการต่อกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด

เกือบทั้งหมดของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดเป็นสามีหรือแฟนของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 89.3) เกือบทั้งหมดเป็นเพศชาย (ร้อยละ 99.1) และส่วนใหญ่มีความถี่ของการดื่มอย่างหนักเป็นครั้งคราว ร้อยละ 82.9 ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ส่วนใหญ่นิยมดื่มสุราขาว/สุราคลื่นในชุมชน ร้อยละ 56.8 และส่วนใหญ่นิยมดื่มนอกบ้าน ร้อยละ 81.6 และเกือบทั้งหมดของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักมีอาการหลังการดื่ม คือ ได้กลืนแอลกอฮอล์ในล�หายใจ (ร้อยละ 87.6) รายละเอียดดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักของผู้ดื่มหนักในครัวเรือนที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ($n= 234$)

พฤติกรรมการดื่มหนักของผู้ดื่มหนักในครัวเรือนที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด	จำนวน	ร้อยละ
คนที่ดื่มหนัก มีความสัมพันธ์กับกลุ่มตัวอย่าง		
สามี/แฟน	209	89.3
พ่อตนเอง/พ่อสามี/แม่ตนเอง/แม่สามี	14	6.0
ญาติคนอื่นๆ ลุง ป้า น้า อา	6	2.6
พี่ชาย น้องชาย พี่สาวน้องสาว	3	1.3
ปู่ย่า/ตายาย	2	0.9
เพศของคนที่ดื่มหนัก		
ชาย	232	99.1
หญิง	2	0.9
อายุ (ปี)		
<30	26	11.1
30-39	75	32.1
40-49	71	30.3
50-60	42	17.9
≥ 60	20	8.5
mean 42.9 median 43.0 s.d. 10.3 max 76 min 23		
ความถี่ของการดื่มหนักของคนที่ดื่มหนักคนนี้		
ดื่มหนักเป็นครั้งคราว	194	82.9
ดื่มหนักเป็นประจำ	40	17.1

ตารางที่ 4.4 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักของผู้ดื่มหนักในครัวเรือนที่ส่งผล
กระทบต่อกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ($n= 234$) (ต่อ)

พฤติกรรมการดื่มหนักของผู้ดื่มหนักในครัวเรือนที่ส่งผล กระทบต่อกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด	จำนวน	ร้อยละ
ชนิดของดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คนดื่มหนักคนนั้นดื่มบ่อยที่สุด		
สุราขาว/สุรากลิ้นในชุมชน	133	56.8
สุราสี/สุราแดง	55	23.5
เบียร์	43	18.4
เหล้าดองยา/สุราจีน	4	1.3
คนที่ดื่มหนักคนนั้น ส่วนใหญ่ดื่มในบ้านหรือนอกบ้าน		
นอกบ้าน	191	81.6
ในบ้าน	43	18.4
คนที่ดื่มหนักคนนั้น เวลาที่ดื่มหนัก มีอาการอย่างไร		
รู้ว่าดื่มมา ได้กลืนแอลกอฮอล์ในลมหายใจ	205	87.6
เม้า มีอาการยืนไม่ตรง พูดจาไม่รู้เรื่อง	25	10.7
มาจนไม่สามารถยืนได้/หมดสติ	4	1.7

4.5 ร้อยละของผลกระทบจากการตีมของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมาratioอย่างน้อย 1 ชนิด จำแนกตามพฤติกรรมการตีมของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน

ร้อยละของผลกระทบจากการตีมของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมาratioอย่างน้อย 1 ชนิด โดยรวมมีผลกระทบร้อยละ 23.0 เมื่อจำแนกตามพฤติกรรมการตีมของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน พบว่า มีร้อยละสูงสุดในมาตรการที่มีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนตีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลกระทบร้อยละ 35.5 มาตรการที่มีจำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนตีม ≥2 คน มีผลกระทบร้อยละ 44.9 มาตรการที่มีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนตีมอย่างหนัก มีผลกระทบร้อยละ 51.1 และ มาตรการที่มีจำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนตีมอย่างหนัก ≥2 คน มีผลกระทบร้อยละ 68.4 เมื่อจำแนกตามพฤติกรรมการตีมของมาตร พบว่า มีร้อยละสูงสุดในมาตรการที่มีความถี่ของการตีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีผลกระทบร้อยละ 46.1 มาตรการที่มีความถี่ของการตีมอย่างหนักเป็นประจำ มีผลกระทบร้อยละ 43.9 และชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มาตราดีมบอยที่สุด คือ สาขาวัสดุกลั่นในชุมชน มีผลกระทบร้อยละ 50.8 เมื่อจำแนกตามลักษณะทางประชากร มีร้อยละของผลกระทบสูงสุดในกลุ่มลูกจ้าง/พนักงานเอกชน ร้อยละ 28.3 ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ร้อยละของผลกรบทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมาratioอย่างน้อย 1 ชนิด จำแนกตามพฤติกรรมการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ($n=1,503$)

ลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการดื่ม	กลุ่ม ตัวอย่าง ทั้งหมด	อันตรายต่อมาratio อย่างน้อย 1 ชนิด	
		จำนวน	ร้อยละ
อันตรายต่อมารดาโดยรวม	1,503	346	23.0
อายุของมารดา (ปี)			
<30	212	53	25.0
30-39	459	125	27.2
40-49	476	88	18.5
≥50	356	80	22.5
ระดับการศึกษา			
ไม่ได้เรียน	30	8	26.7
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	554	124	22.4
มัธยมศึกษาตอนต้น	310	76	24.5
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	397	87	21.9
ปวส./ปวท./อนุปริญญา	65	20	30.8
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	147	31	21.1
สถานภาพสมรส (ตามกฎหมาย)			
สมรส	1,130	270	23.9
โสด	194	41	21.1
หย่า/แยก	96	20	20.8
หม้าย	83	15	18.1
อาชีพ			
รับจ้างทั่วไป	476	139	29.2
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน	60	17	28.3
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	234	54	23.1
ว่างงาน	80	18	22.5
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	35	7	20.0
เกษตรกร	426	79	18.5
ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ	33	9	18.2
แม่บ้าน	150	25	16.7
รับจ้างโรงงาน	8	1	12.5

ตารางที่ 4.5 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อการดาว่าย่างน้อย 1 ชนิด จำแนกตามพฤติกรรมการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ($n=1,503$) (ต่อ)

ลักษณะทางประชารถและพฤติกรรมการดื่ม	กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	อันตรายต่อการดาว่าย่างน้อย 1 ชนิด	
		จำนวน	ร้อยละ
ระดับรายได้ของครอบครัวต่อเดือน (บาท)			
<10,000	830	187	22.5
10,000-19,999	421	97	23.0
≥20,000	252	62	24.6
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)			
<5	858	177	20.6
≥5	645	169	26.2
การพักอาศัยของมารดา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
ญาติคนอื่นๆ ของกลุ่มตัวอย่าง	35	14	40.0
พ่อแม่ของสามี	160	47	29.4
พ่อแม่ของตนเอง	531	128	24.1
คนอื่นๆ เช่น ylan	177	40	22.6
บุตรของคุณ และ/หรือของสามี	994	228	22.9
คู่สมรส/แฟน	862	210	24.4
ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมารดา			
ไม่ดื่มในรอบ 12 เดือน	923	184	19.9
ดื่มเป็นครั้งคราว	504	127	25.2
ดื่มเป็นประจำ	76	35	46.1
ความถี่ของการดื่มอย่างหนักของมารดา			
ไม่ดื่มในรอบ 12 เดือน	922	184	20.0
ดื่มแต่ไม่ดื่มหนัก	172	57	33.1
ดื่มหนักเป็นครั้งคราว	364	86	23.6
ดื่มหนักเป็นประจำ	41	18	43.9
ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มารดาดื่มบ่อยที่สุด			
สุราขาว/สุรากลั่นในชุมชน	61	31	50.8
สุราสี/สุราแดง	72	20	27.8
เบียร์	393	99	25.2
เหล้าดองยา/สุราจีน/สาโท กระแซ	9	2	22.2
ไวน์/ไวน์คูลเลอร์/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม	42	10	23.8
ไม่ดื่มในรอบ 12 เดือน	922	184	20.0

ตารางที่ 4.5 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อการดาอย่างน้อย 1 ชนิด จำแนกตามพฤติกรรมการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ($n=1,503$) (ต่อ)

ลักษณะทางประชารัฐและพฤติกรรมการดื่ม	กลุ่ม ตัวอย่าง ทั้งหมด	อันตรายต่อการดา อย่างน้อย 1 ชนิด	
		จำนวน	ร้อยละ
การมีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดื่มในช่วง 12 เดือน			
ไม่มีคนอื่น ๆ ดื่มในรอบ 12 เดือน	709	64	9.0
มีคนอื่น ๆ ดื่มในรอบ 12 เดือน	794	282	35.5
จำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนที่ดื่มในช่วง 12 เดือน			
ไม่มีคนอื่น ๆ ที่ดื่มในรอบ 12 เดือน	709	64	9.0
มีคนอื่น ๆ ดื่ม 1 คน	627	207	33.0
มีคนอื่น ๆ ดื่ม ≥ 2 คน	167	75	44.9
การมีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดื่มหนักในช่วง 12 เดือน			
ไม่มีคนอื่น ๆ ดื่มในรอบ 12 เดือน	709	64	9.0
มีคนอื่น ๆ ดื่ม แต่ไม่ดื่มหนัก	528	146	27.7
มีคนอื่น ๆ ดื่มหนัก	266	136	51.1
จำนวนสมาชิกในครัวเรือนคนอื่น ๆ ดื่มหนักช่วง 12 เดือน			
ไม่มีคนอื่น ๆ ดื่มในรอบ 12 เดือน	709	64	9.0
มีคนอื่น ๆ ดื่ม แต่ไม่ดื่มหนัก	527	145	27.5
มีคนอื่น ๆ ดื่มหนัก 1 คน	248	124	50.0
มีคนอื่น ๆ ดื่มหนัก ≥ 2 คน	19	13	68.4
สมาชิกในครัวเรือนคนอื่น ๆ ที่ดื่มหนัก เป็นใครบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
ญาติผู้ชายคนอื่น ๆ (เช่น ลุง อา น้า)	7	7	100.0
แม่ต้นเอง/แม่สามี	10	7	70.0
พ่อต้นเอง/พ่อสามี	15	10	66.7
เด็กภายในตัวการดูแล อายุ 18 ปีขึ้นไป	16	10	62.5
สามี/แฟน	217	117	53.9
พี่สาว/น้องสาว	4	2	50.0
ญาติผู้หญิงคนอื่น ๆ (เช่น ป้า อา น้า)	10	4	40.0
ปู่/ตา/ย่า/ยาย	13	4	30.8
พี่ชาย/น้องชาย	9	3	33.3
เด็กภายในตัวการดูแล อายุ 18 ปีลงไป	4	0	0.0

4.6 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ต่อมารดาเป็นรายเหตุการณ์

ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อ มารดา เมื่อพิจารณาเป็นเหตุการณ์ พบร้าว่า มีร้อยละของผลกระทบสูงสุดในเรื่อง เศยถูกคนที่ดื่ม แอลกอฮอล์ ดุด่าว่ากล่าว ตะคอก ดูถูก เหยียดหยาม หยาบคาย ดูหมิ่นและทะเลาะ ร้อยละ 7.8 รองลงมา เคยโดยสารหรือนั่งรถไปกับคนขับรถที่ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 3.8 และเคยมีปัญหาทางด้าน การเงิน เช่น ไม่มีเงินพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น ร้อยละ 3.2 ส่วนบุคคลที่เป็นสาเหตุสำคัญ ทั้ง 3 เหตุการณ์ คือ สามี ร้อยละ 5.7 ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 2.5 ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ต่อมารดาเป็นรายเหตุการณ์ ($n=1,503$)

ผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ใน ครัวเรือน	ร้อยละของความถี่			ร้อยละของผู้ดื่มที่เป็น สาเหตุ (ตอบ≥1 ข้อ)	
	เคย	1-2 ครั้ง	3+ครั้ง	สามี	คนอื่นใน ครัวเรือน
เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ดุด่าว่ากล่าว ตะคอก ดูถูก เหยียดหยาม หยาบคาย ดูหมิ่น และทะเลาะ	7.8	5.6	2.2	5.7	2.3
เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ผลัก ดึง	1.8	1.3	0.5	1.5	0.4
เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ทำร้ายร่างกาย (ทุบ ตบตี แตะ ต่อย)	1.5	1.1	0.4	1.2	0.3
เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ทำลายข้าวของ หรือทรัพย์สิน	2.1	1.6	0.5	1.7	0.4
เคยเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน จากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น	1.8	1.8	0.0	1.1	0.7
บ้าน รถ หรือทรัพย์สินต่างๆ เคยได้รับความเสียหาย เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น	1.6	1.5	0.1	1.3	0.3
เคยโดยสารหรือนั่งรถไปกับคนขับรถที่ดื่ม แอลกอฮอล์	3.8	3.5	0.3	3.8	0.1
เคยถูกรบกวน โดยคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ใน ระหว่างงานเลี้ยงหรือสถานที่ส่วนบุคคลอื่น ๆ	2.3	1.9	0.4	1.8	0.9
เคยรู้สึกว่าถูกปมญี่หรือรู้สึกกลัว คนที่ดื่ม แอลกอฮอล์ในบ้านตนเอง/ในสถานที่ส่วนบุคคลอื่น ๆ	2.2	1.8	0.4	1.8	0.1

**ตารางที่ 4.6 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน
ต่อมารดาเป็นรายเหตุการณ์ ($n=1,503$) (ต่อ)**

ผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ใน ครัวเรือน	ร้อยละ			ร้อยละของผู้ดื่มที่เป็น สาเหตุ (ตอบ≥1 ข้อ)	
	เดย	1-2 ครั้ง	3+ครั้ง	สามี	คนอื่นใน ครัวเรือน
เคยมีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาชีวิตสมรส เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น	2.8	2.1	0.7	2.6	0.2
เคยมีปัญหากับเพื่อน เพื่อนบ้าน จากการดื่ม แอลกอฮอล์ของคนอื่น	2.0	1.7	0.3	1.5	0.6
เคยมีปัญหาทางด้านการเงิน เช่น ไม่มีเงินพอ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น เนื่องจาก การดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น	3.2	1.9	1.3	2.5	0.8

**4.7 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน
ต่อมารดา**

ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อ
มารดา พบร่วมกันว่า มีร้อยละของผลกระทบสูงสุดในเรื่อง เศรษฐกิจเสียใจ/รู้สึกว่าถูกเพิกเฉย เนื่องจากการดื่ม
แอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว ร้อยละ 10.3 รองลงมา เศรษฐกิจไม่อยากใส่ใจ คนดังกล่าว (ไม่อยาก
แม้แต่จะมองหน้า) เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว ร้อยละ 9.5 และเคยหมดสนุก
หรือเกิดปัญหาในงานสังคมต่าง ๆ ที่เข้าร่วม เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว ร้อยละ
5.2 รายละเฉียดตั้งตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดา ($n=1,503$)

ผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดา	ร้อยละ		
	เดย	1-2 ครั้ง	3+ ครั้ง
เคยรู้สึกเสียใจ/รู้สึกว่าถูกเพิกเฉย เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว	10.3	8.5	1.9
เคยรู้สึกไม่อยากใส่ใจ (ไม่อยากแม่แต่จะมองหน้า) คนตังกล่าว เนื่องจาก การดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว	9.5	7.6	1.8
เคยหมดสนุกหรือเกิดปัญหาในงานสังคมต่างๆ ที่เข้าร่วม เนื่องจากการดื่ม แอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว	5.2	4.5	0.7
เคยถูกลعنหน้านั้น ขโมยเงินหรือของมีค่าของคุณ เพราะการดื่ม แอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว	1.0	0.7	0.3
เคยบังคับหรือกดซี่หางเพศ เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนใน ครอบครัว	0.7	0.6	0.1
เคยต้องหลีกเลี่ยง โดยไม่พบปะเพื่อน ญาติพี่น้อง เพราะรู้สึกอาย เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่น ถึงพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ ของคนในครอบครัว	1.9	1.7	0.2
เคยต้องหนีออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่น เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนใน ครอบครัว	1.8	1.5	0.3
เคยมีเงินไม่เพียงพอ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน เนื่องจากการดื่ม แอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว	4.7	3.8	0.9
เคยดื่มแอลกอฮอล์เพื่อเตรียมรับมือกับการดื่มแอลกอฮอล์ของคนใน ครอบครัว	1.8	1.5	0.3
เคยดูด่าว่ากล่าวหรือคุยตืบตุบหรือเด็กปกครอง เพื่อประชด/ระบาย ความเครียด เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว	1.7	1.3	0.4

4.8 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อนและคนแปลกหน้าต่อ มารดาเป็นรายเหตุการณ์

ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อนและคนแปลกหน้าต่อมารดา เมื่อพิจารณาเป็นเหตุการณ์ พบว่า ร้อยละของผลกระทบสูงสุดในเรื่อง เคยโดยสารหรือนั่งรถไปกับ คนขับรถที่ดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 4.3 รองลงมา เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ดูด่าว่ากล่าว ตะคอก ดู ถูก เหยียดหยาม หยาบคาย ดูหมิ่นและทะเลาะ ร้อยละ 3.4 และเคยถูกรบกวน โดยคนที่ดื่ม แอลกอฮอล์ในระหว่างงานเลี้ยงหรือสถานที่ส่วนบุคคลอื่น ๆ ร้อยละ 2.8 บุคคลที่เป็นสาเหตุสูงสุดทั้ง

3 เหตุการณ์ คือ เพื่อน ร้อยละ 3.9 คนแปลกหน้า ร้อยละ 2.7 และร้อยละ 1.9 ตามลำดับ รายละเอียด ดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อนและคนแปลกหน้าต่อ มาตรฐานรายเหตุการณ์ ($n=1,503$)

ผลกระทบจากการดื่มของเพื่อนและคนแปลกหน้าต่อมารดา	ร้อยละ			ร้อยละของผู้ดื่มที่เป็นสาเหตุ (ตอบ≥1 ข้อ)	
	เคย	1-2 ครั้ง	3+ครั้ง	เพื่อน	คนแปลกหน้า
เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ดูด่าว่ากล่าว ทะเลาะกัน ดูถูก เหยียดหยาม หยาบคาย ดูหมิ่น และทะเลาะ	3.4	2.3	1.1	0.8	2.7
เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ผลัก ดึง	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1
เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ทำร้ายร่างกาย (ทุบตี แตะ ต่อย)	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1
เคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ทำลายข้าวของหรือทรัพย์สิน	0.3	0.3	0.0	0.0	0.3
เคยเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน จากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2
บ้าน รถ หรือทรัพย์สินต่างๆ เคยได้รับความเสียหาย เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น	0.4	0.4	0.0	0.1	0.3
เคยได้สารหรือน้ำร้อนไปกับคนขับรถที่ดื่มแอลกอฮอล์	4.3	4.2	0.1	3.9	0.3
เคยถูกรบกวน โดยคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างงานเลี้ยงหรือสถานที่ส่วนบุคคลอื่น ๆ	2.8	2.3	0.5	1.1	1.9
เคยรู้สึกว่าถูกปมปุ่มหรือรู้สึกกลัว คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ในบ้านตนเอง/ในสถานที่ส่วนบุคคลอื่น ๆ	1.7	1.3	0.4	0.2	1.6
เคยมีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาชีวิตสมรสเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
เคยมีปัญหากับเพื่อน เพื่อนบ้าน จากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น	0.8	0.7	0.1	1.1	0.4
เคยมีปัญหาทางด้านการเงิน เช่น ไม่มีเงินพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4.9 ร้อยละของผลกระทบจากการตีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ต่อเด็ก อายุต่ำกว่า 1 ชนิด จำแนกตามพฤติกรรมการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็ก อายุต่ำกว่า 1 ชนิด ในภาพรวม ร้อยละ 3.5 เมื่อจำแนกตามพฤติกรรมการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน พบร่วม มีร้อยละสูงสุด ในมาตรการที่มีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนตีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลกระทบร้อยละ 5.5 มาตรการที่มีจำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนตีมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ≥ 1 คน มีผลกระทบร้อยละ 6.1 มาตรการที่มีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนตีมอย่างหนัก มีผลกระทบร้อย 9.8 และมาตรการที่มีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนตีมอย่างหนัก ≥ 1 คน มีผลกระทบร้อย 10.1 เมื่อจำแนกตามพฤติกรรมการดื่ม ของมาตรการ พบร่วม มีร้อยละสูงสุดในมาตรการที่มีความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ มีผลกระทบร้อย 11.8 มาตรการที่มีความถี่ของการดื่มอย่างหนักเป็นประจำ มีผลกระทบร้อย 9.8 และชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มาตรการดื่มบ่อยที่สุด คือ สุราขาว/สุรากลั่นในชุมชน มีผลกระทบร้อย 11.5 ดังตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 ร้อยละของผลกราบทบจากการดื่มชาของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็ก อย่างน้อย 1 ชนิด จำแนกตามพฤติกรรมการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน

ลักษณะทางประชารถและพฤติกรรมการดื่ม	กลุ่ม ตัวอย่าง ทั้งหมด	ผลกราบทบต่อเด็ก อย่างน้อย 1 ชนิด	
		จำนวน	ร้อยละ
อันตรายต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิดในภาพรวม	1,503	52	3.5
อายุของมารดา (ปี)			
<30	212	7	3.3
30-39	459	13	2.8
40-49	476	22	4.6
≥50	356	10	2.8
ระดับการศึกษาของมารดา			
ไม่ได้เรียน	30	0	0.0
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	554	21	3.8
มัธยมศึกษาตอนต้น	310	16	5.2
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	397	9	2.3
ปวส./ปวท./อนุปริญญา	65	3	4.6
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	147	3	2.0
สถานภาพสมรสของมารดา (ตามกฎหมาย)			
สมรส	1,130	33	2.9
โสด	194	11	5.7
หย่า/แยก	96	5	5.2
หม้าย	83	3	3.6
อาชีพของมารดา			
รับจ้างทั่วไป	476	24	5.0
ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน	60	1	1.7
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	234	8	3.4
ว่างงาน	80	4	5.0
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	35	0	0.0
เกษตรกร	426	6	1.4
ลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ	33	2	6.2
แม่บ้าน	150	7	4.7
รับจ้างโรงงาน	8	0	0.0

ตารางที่ 4.9 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มชาของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็ก อายุต่ำกว่า 1 ชนิด จำแนกตามพฤติกรรมการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน (ต่อ)

ลักษณะทางประชารถและพฤติกรรมการดื่ม	กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด	ผลกระทบต่อเด็ก อายุต่ำกว่า 1 ชนิด	
		จำนวน	ร้อยละ
ระดับรายได้ของครอบครัวต่อเดือน (บาท)			
<10,000	830	31	3.7
10,000-19,999	421	14	3.3
≥20,000	252	7	2.8
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)			
<5	858	26	3.0
≥5	645	26	4.0
การพักอาศัยของมารดา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
ญาติคนอื่นๆ ของกลุ่มตัวอย่าง	35	2	5.7
พ่อแม่ของสามี	160	4	2.5
พ่อแม่ของตนเอง	531	19	3.6
คนอื่นๆ เช่น หลาน	177	9	5.1
บุตรของคุณ และ/หรือของสามี	994	24	2.4
คู่สมรส/แฟน	862	21	2.4
ความถี่ของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมารดา			
ไม่ดื่มในรอบ 12 เดือน	923	18	3.1
ดื่มเป็นครั้งคราว	504	25	5.0
ดื่มเป็นประจำ	76	9	11.8
ความถี่ของการดื่มอย่างหนักของมารดา			
ไม่ดื่มในรอบ 12 เดือน	922	18	2.0
ดื่มแต่ไม่ดื่มหนัก	172	14	8.1
ดื่มหนักเป็นครั้งคราว	364	16	4.4
ดื่มหนักเป็นประจำ	41	4	9.8
ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มารดาดื่มบ่อยที่สุด			
สุราขาว/สุรากลิ้นในชุมชน	61	7	11.5
สุราสี/สุราแดง	72	4	5.6
เบียร์	393	20	5.1
เหล้าดองยา/สุราจีน/สาโท กระแซ	9	1	11.1
ไวน์/ไวน์คูลเลอร์/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม	42	2	4.8
ไม่ดื่มในรอบ 12 เดือน	922	18	2.0

ตารางที่ 4.9 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มฯของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็ก อายุร่วมกันอย่างน้อย 1 ชนิด จำแนกตามพฤติกรรมการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน (ต่อ)

ลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการดื่ม	กลุ่ม ตัวอย่าง ทั้งหมด	ผลกระทบต่อเด็ก อายุร่วมกัน 1 ชนิด	
		จำนวน	ร้อยละ
การมีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ดื่มในรอบ 12 เดือน			
ไม่มีคนอื่น ๆ ดื่มในรอบ 12 เดือน	709	8	1.1
มีคนอื่น ๆ ดื่มในรอบ 12 เดือน	794	44	5.5
จำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนที่ดื่มในช่วง 12 เดือน			
ไม่มีคนอื่น ๆ ที่ดื่มในรอบ 12 เดือน	709	8	1.1
มีคนอื่น ๆ ดื่ม 1 คน	627	38	6.1
มีคนอื่น ๆ ดื่ม ≥ 2 คน	167	6	3.6
การมีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดื่มหนักในช่วง 12 เดือน			
ไม่มีคนอื่น ๆ ดื่มในรอบ 12 เดือน	709	8	1.1
มีคนอื่น ๆ ดื่ม แต่ไม่ดื่มหนัก	528	18	3.4
มีคนอื่น ๆ ดื่มหนัก	266	26	9.8
จำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดื่มหนักช่วง 12 เดือน			
ไม่มีคนอื่น ๆ ดื่มในรอบ 12 เดือน	709	8	1.1
มีคนอื่น ๆ ดื่ม แต่ไม่ดื่มหนัก	527	18	3.4
มีคนอื่น ๆ ดื่มหนัก 1 คน	248	25	10.1
มีคนอื่น ๆ ดื่มหนัก ≥ 2 คน	19	1	5.3
สมาชิกในครัวเรือนคนอื่น ๆ ที่ดื่มหนัก เป็นครึ่งบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
ญาติผู้ชายคนอื่น ๆ (เช่น ลุง อา น้า)	7	0	0.0
แม่ตอน英勇/แม่สามี	10	0	0.0
พ่อตอน英勇/พ่อสามี	15	3	20.0
เด็กภายใต้การดูแล อายุ 18 ปีขึ้นไป	16	0	0.0
สามี/แฟน	217	22	10.1
พี่สาว/น้องสาว	4	1	25.0
ญาติผู้หญิงคนอื่น ๆ (เช่น ป้า อา น้า)	10	0	0.0
ปู่/ตา/ย่า/ยาย	13	2	15.4
พี่ชาย/น้องชาย	9	0	0.0
เด็กภายใต้การดูแล อายุ 18 ปีลงไป	4	0	0.0

4.10 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็ก

ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็ก พบร้า มีร้อยละของผลกระทบสูงสุดในเรื่อง เด็กที่อยู่ในความดูแลลูกดุถ่ายรุนแรง เนื่องจากการดื่ม แอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว ร้อยละ 2.2 และเคยมีเงินไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยง ดูเด็กที่ดูแล เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว ร้อยละ 1.8 ดังตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ต่อเด็ก ($n=1,503$)

ผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็ก	ร้อยละ		
	เคย	1-2 ครั้ง	3+ ครั้ง
เด็กที่ดูแลลูกหอดหึงหรือถูกปล่อยให้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว	0.7	0.6	0.1
เด็กที่อยู่ในความดูแลลูกดุถ่ายรุนแรง เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ ของคนในครอบครัว	2.2	1.9	0.3
เด็กที่ดูแลลูกทำร้ายร่างกาย เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคน ในครอบครัว	0.5	0.4	0.1
เด็กที่ดูแลอยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว เนื่องจากการดื่ม แอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว	1.4	1.1	0.3
เด็กที่ดูแลได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น คุ้มครอง เด็กและเยาวชน เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว	0.0	0.0	0.0
เคยมีเงินไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กที่ดูแล เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว	1.8	1.3	0.5

4.11 ร้อยละของผลกระทบโดยรวมและระดับความรุนแรงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือน เพื่อนและคนแปลกหน้าต่อมารดาและเด็ก

ผลกระทบโดยรวมจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิด ร้อยละ 23.0 ผลกระทบโดยรวมจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด ร้อยละ 3.5 และผลกระทบโดยรวมจากการดื่มของเพื่อนและคนแปลกหน้าต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิด ร้อยละ 10.3

ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากการดื่มของมารดาต่อกันอื่น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเล็กน้อย ร้อยละ 95.0 ระดับผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารดา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเล็กน้อย ร้อยละ 86.1 และระดับผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็ก ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเล็กน้อย ร้อยละ 54.5 นอกจากนี้ บุคคลที่เป็นสาเหตุของผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็ก คือ บิดา ร้อยละ 50.0 ดังตารางที่ 4.11 ตารางที่ 4.11 ร้อยละของผลกระทบโดยรวมและระดับความรุนแรงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือน เพื่อนและคนแปลกหน้าต่อมารดาและเด็ก ($n=1,503$)

ผลกระทบโดยรวมและระดับความรุนแรง	ทั้งหมด	จำนวน	ร้อยละ
ผลกระทบโดยรวมจากการดื่มฯ			
การดื่มของสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือนต่อมารดา อย่างน้อย 1 ชนิด	1,503	346	23.0
การดื่มของสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือนต่อเด็ก อย่างน้อย 1 ชนิด	1,503	52	3.5
การดื่มของเพื่อนและคนแปลกหน้าต่อมารดา อย่างน้อย 1 ชนิด	1,503	152	10.3
ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากการดื่มของมารดาต่อกันอื่นๆ			
เล็กน้อย (1-3 คะแนน)	580	551	95.0
ปานกลาง (4-5 คะแนน)	580	22	3.8
รุนแรง (≥ 6 คะแนน)	580	7	1.2
ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือนต่อมารดา			
เล็กน้อย (1-3 คะแนน)	346	298	86.1
ปานกลาง (4-5 คะแนน)	346	37	10.7
รุนแรง (≥ 6 คะแนน)	346	11	3.2
ระดับความรุนแรงของผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกอื่นๆในครัวเรือน(รวมการดื่มของมารดา)ต่อเด็ก			
เล็กน้อย (1-3 คะแนน)	52	24	54.5
ปานกลาง (4-5 คะแนน)	52	15	34.1
รุนแรง (≥ 6 คะแนน)	52	5	11.4

ตารางที่ 4.11 ร้อยละของผลกระทบโดยรวมและระดับความรุนแรงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือน เพื่อนและคนแปลกหน้าต่อมารดาและเด็ก ($n=1,503$) (ต่อ)

ผลกระทบโดยรวมและระดับความรุนแรง	ทั้งหมด	จำนวน	ร้อยละ
บุคคลที่เป็นสาเหตุของผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือน(รวมการดื่มของมารดา)ต่อเด็ก (ตอบ≥1ข้อ)			
บิดา	52	26	50.0
มารดา	52	7	13.5
ญาติฝ่ายมารดา	52	7	13.5
ญาติฝ่ายบิดา	52	4	7.7
พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง	52	2	3.8

4.12 ร้อยละของการดูแลผู้ดื่มแอลกอฮอล์และเด็กในความดูแลของมารดา จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน

ผลกระทบของอันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่นๆต่อมารดา เมื่อพิจารณาเป็นเหตุการณ์ พบร่วมกับผลกระทบมากที่สุดในเรื่อง เคยดูแลคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่ดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องมาจากการดื่มแอลกอหอล์ของคนในครอบครัว ร้อยละ 9.9 และเคยต้องทำความสะอาดบ้าน หลังจากการดื่มแอลกอหอล์ของคนในครอบครัว ร้อยละ 9.6 ดังตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 ร้อยละของการดูแลผู้ดื่มแอลกอหอล์และเด็กในความดูแลของมารดา จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอหอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ($n=1,503$)

การดูแลผู้ดื่มแอลกอหอล์/เด็กในความดูแลของมารดา	ร้อยละ		
	เคย	1-2 ครั้ง	3+ ครั้ง
เคยดูแลคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่ดื่มแอลกอหอล์ เนื่องมาจากการดื่มแอลกอหอล์ของคนในครอบครัว	9.9	9.2	0.7
เคยต้องดูแลเด็กหรือคนอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการดื่มแอลกอหอล์ของคนในครอบครัว	2.9	2.5	0.4
เคยต้องทำความสะอาดบ้าน หลังจากการดื่มแอลกอหอล์ของคนในครอบครัว	9.6	8.3	1.3
เคยต้องคงอยู่ปรับหรืออยู่ไปส่งคนในครอบครัวหรือเพื่อน เนื่องจากการดื่มแอลกอหอล์ของคนในครอบครัว	5.4	3.4	2.0

4.13 การขอรับความช่วยเหลือ กรณีที่มารดาหรือเด็กเคยได้รับผลกระทบ

การขอรับความช่วยเหลือ กรณีที่มารดาหรือเด็กในความดูแลเคยได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ($n=378$ คน) พบว่า เคยต้องโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากตำรวจ เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว ร้อยละ 2.9 รองลงมา เคยต้องไปรับบริการแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลหรือนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว ร้อยละ 2.8 และเคยต้องไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำจากผู้นำชุมชน เพื่อน เพื่อนบ้าน หรือหน่วยบริการอื่น ๆ เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว ร้อยละ 2.7 ดังตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 การขอรับความช่วยเหลือกรณีมารดาหรือเด็กเคยได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ($n=378$)

การใช้บริการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ	ร้อยละ		
	เคย	1-2 ครั้ง	3+ ครั้ง
เคยต้องโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากตำรวจ เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว	2.9	2.5	0.4
เคยต้องไปรับบริการแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลหรือนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว	2.8	1.7	1.0
เคยต้องไปพบแพทย์ พยาบาล ที่สถานบริการสาธารณสุขต่างๆ รวมถึงการซื้อยาเพื่อรักษาตนเองที่ร้านขายยา เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว	1.7	1.3	0.4
เคยไปรับบริการหรือขอคำปรึกษาที่ศูนย์บริการต่างๆ (เช่น สายด่วนฉุกเฉิน ภูมิพล มูลนิธิเพื่อสังคมต่างๆ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน) เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว	0.8	0.4	0.4
เคยต้องไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำจากผู้นำชุมชน เพื่อน เพื่อนบ้าน หรือหน่วยบริการอื่น ๆ เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว	2.7	2.1	0.6

4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือนกับผลกระทบต่อมารดา

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนกับผลกระทบต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิด โดยนำตัวแปรต้น ได้แก่ การดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนและการดื่มของมารดา และตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามคือผลกระทบต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิด จากการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ อายุของมารดา สถานภาพสมรสของมารดา ระดับการศึกษาของมารดา อัชีพของมารดา รายได้ของครอบครัวต่อเดือน และจำนวนสมาชิกในครัวเรือน เข้าสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบทวิคูหรือแบบสองตัวแปร (Bivariate analysis) ระหว่างตัวแปรต้น 1 ตัวกับตัวแปรตาม คือ ผลกระทบต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิด โดยใช้สถิติ Simple binary logistic regression จากนั้น นำตัวแปรทั้งหมดเข้าสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบพหุตัวแปร (Multivariate analysis) ระหว่างตัวแปรต้นหลายตัวกับตัวแปรตาม คือ ผลกระทบต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิด โดยใช้สถิติ Multiple binary logistic regression พบร่วมกันว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ได้แก่ จำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ดื่มอย่างหนัก ≥ 2 คน ($AOR = 22.96; 95\%CI = 8.05, 65.46; p-value <0.001$) จำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ดื่มอย่างหนัก ≥ 1 คน ($AOR = 10.39; 95\%CI = 7.13, 15.14; p-value <0.001$) และมีสมาชิกคนอื่น ๆ ดื่มแต่ไม่ดื่มอย่างหนัก ($AOR = 3.91; 95\%CI = 2.78, 5.49; p-value <0.001$) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมารดา ได้แก่ มารดาดื่มอย่างหนักเป็นประจำ ($AOR = 3.25; 95\%CI = 1.58, 6.68; p-value =0.001$) และมารดาดื่มแต่ไม่ดื่มอย่างหนัก ($AOR = 1.77; 95\%CI = 1.19, 2.63; p-value =0.005$) มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนั้น ตัวแปรอื่น ๆ ได้แก่ มารดาอัชีพรับจ้าง ($AOR = 1.66; 95\%CI = 1.08, 2.55; p-value =0.020$) มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 4.14

ตารางที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนกับผลกระทบต่อมาตราอย่างน้อย 1 ชนิด

ปัจจัย	n	ผลกระทบ		COR	AOR	95%CI	p-value
		n	%				
การดื่มของสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือน							<0.001
ไม่มีคนอื่นๆดื่ม(อ้างอิง)	709	64	9.0	1	1		
มีคนอื่นๆดื่ม แต่ไม่ดื่มหนัก	527	145	27.5	3.80	3.91	2.78, 5.49	<0.001
มีคนอื่นๆดื่มหนัก 1 คน	248	124	50.0	9.93	10.39	7.13, 15.14	<0.001
มีคนอื่นๆดื่มหนัก≥2 คน	19	13	68.4	21.70	22.96	8.05, 65.46	<0.001
การดื่มของมาตรา							<0.001
ไม่ดื่มรอบ12เดือน(อ้างอิง)	922	184	20.0	1	1		
ดื่มแต่ไม่ดื่มหนัก	172	57	33.1	1.99	1.77	1.19, 2.63	0.005
ดื่มหนักเป็นบางครั้ง	364	86	23.6	1.24	0.99	0.72, 1.36	0.938
ดื่มหนักเป็นประจำ	41	18	43.9	3.13	3.25	1.58, 6.68	0.001
อายุ							0.021
<30 ปี (อ้างอิง)	212	53	25.0	1	1		
30-39 ปี	459	125	27.2	1.15	1.12	0.73, 1.72	0.605
40-49 ปี	476	88	18.5	0.69	0.69	0.44, 1.09	0.110
≥50 ปี	356	80	22.5	0.89	1.13	0.67, 1.90	0.657
สถานภาพสมรส							0.858
โสด	194	41	21.1	1	1		
สมรส	1,130	270	23.9	1.17	1.12	0.73, 1.73	0.609
หม้าย/หย่า/แยก	179	35	19.6	0.91	1.15	0.64, 2.07	0.629
ระดับการศึกษาของมาตรา							0.898
ไม่เรียน/ประถมศึกษา	584	132	22.6	1	1		
มัธยมศึกษา	707	163	23.1	1.02	1.05	0.74, 1.49	0.766
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	212	51	24.1	1.10	1.13	0.67, 1.89	0.645

ตารางที่ 4.14 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนกับผลกระทบต่อการดูอย่างน้อย 1 ชนิด (ต่อ)

ปัจจัย	n	ผลกระทบ		COR	AOR	95%CI	p-value
		n	%				
อาชีพของมารดา							0.012
ไม่ได้ทำ/แม่บ้าน (อ้างอิง)	230	43	18.7	1	1		
เกษตรกร	426	79	18.5	0.98	1.00	0.63, 1.59	0.991
รับจ้าง	544	157	28.9	1.75	1.66	1.08, 2.55	0.020
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	234	54	23.1	1.30	1.30	0.78, 2.15	0.316
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	68	13	19.1	1.02	0.80	0.36, 1.81	0.596
ระดับรายได้ของครอบครัว							0.607
<10,000 บาท (อ้างอิง)	830	187	22.5	1	1		
10,000-19,999 บาท	421	97	23.0	1.03	0.87	0.63, 1.19	0.380
≥20,000 บาท	252	62	24.6	1.12	0.86	0.57, 1.28	0.453
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน							0.796
<5 คน (อ้างอิง)	858	177	20.6	1	1		
≥5 คน	645	169	26.2	1.35	1.04	0.79, 1.36	

4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่นๆในครัวเรือนกับผลกระทบต่อเด็ก

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนกับผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด โดยนำตัวแปรต้น ได้แก่ การดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนและการดื่มของมารดา และตัวแปรอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามคือผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด จากการบททวนวรรณกรรม ได้แก่ อายุของมารดา สถานภาพสมรสของมารดา ระดับการศึกษาของมารดา อัชีพของมารดา รายได้ของครอบครัวต่อเดือนและจำนวนสมาชิกในครัวเรือน เข้าสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบที่ลักษณะหรือแบบสองตัวแปร (Bivariate analysis) ระหว่างตัวแปรต้น 1 ตัวกับตัวแปรตาม คือ ผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด โดยใช้สถิติ Simple binary logistic regression จากนั้น นำตัวแปรทั้งหมดเข้าสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบพหุตัวแปร (Multivariate analysis) ระหว่างตัวแปรต้นหลายตัวกับตัวแปรตาม คือ ผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด โดยใช้สถิติ Multiple binary logistic regression พบร่วมว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ได้แก่ จำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ดื่มอย่างหนัก 1 คน ($AOR = 11.1; 95\%CI = 4.73, 26.44; p-value <0.001$) และมีสมาชิกคนอื่น ๆ ดื่มแต่ไม่ดื่มอย่างหนัก ($AOR = 3.41; 95\%CI = 1.41, 8.22; p-value =0.006$) การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมารดา ได้แก่ มารดา มีการดื่มอย่างหนักเป็นประจำ ($AOR = 5.75; 95\%CI = 1.69, 19.61; p-value =0.005$) และมารดา มีการดื่มแต่ไม่ดื่มอย่างหนัก ($AOR = 4.23; 95\%CI = 1.96, 9.16; p-value <0.001$) มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนั้น ตัวแปรอื่น ๆ ได้แก่ มารดา มีอาชีพเกษตรกร ($AOR = 0.19; 95\%CI = 0.07, 0.57; p-value =0.003$) มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 4.15

ตารางที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนกับผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด

ปัจจัย	n	ผลกระทบ		COR	AOR	95%CI	p-value
		n	%				
การดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ							<0.001
ครัวเรือน							
ไม่มีคนอื่นๆดื่ม(อ้างอิง)	709	8	1.1	1	1		
มีคนอื่นๆดื่ม แต่ไม่ดื่มหนัก	527	18	3.4	3.08	3.41	1.41, 8.22	0.006
มีคนอื่นๆดื่มหนัก 1 คน	248	25	10.1	9.81	11.1	4.73, 26.44	<0.001
มีคนอื่นๆดื่มหนัก≥2 คน	19	1	5.3	4.84	3.48	0.37, 32.75	0.275
การดื่มของมารดา							<0.001
ไม่ดื่มรอบ12เดือน(อ้างอิง)	922	18	2.0	1	1		
ดื่มแต่ไม่ดื่มหนัก	172	14	8.1	4.45	4.23	1.96, 9.16	<0.001
ดื่มหนักเป็นบางครั้ง	364	16	4.4	2.31	1.90	0.93, 3.88	0.077
ดื่มหนักเป็นประจำ	41	4	9.8	5.42	5.75	1.69, 19.61	0.005
อายุ							0.296
<30 ปี (อ้างอิง)	212	7	3.3	1	1		
30-39 ปี	459	13	2.8	0.86	1.05	0.38, 2.88	0.924
40-49 ปี	476	22	4.6	1.41	2.04	0.77, 5.42	0.151
≥50 ปี	356	10	2.8	0.84	1.44	0.43, 4.86	0.554
สถานภาพสมรส							0.167
โสด	194	11	5.7	1	1		
สมรส	1,130	33	2.9	0.50	0.51	0.23, 1.14	0.101
หม้าย/หย่า/แยก	179	8	4.5	0.78	0.94	0.33, 2.67	0.905
ระดับการศึกษาของมารดา							0.933
ไม่เรียน/ประถมฯ(อ้างอิง)	584	21	3.6	1	1		
มัธยมศึกษา	707	25	3.5	0.98	1.07	0.50, 2.29	0.869
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า	212	6	2.8	0.79	0.88	0.27, 2.91	0.838

ตารางที่ 4.15 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนกับผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด (ต่อ)

ปัจจัย	n	ผลกระทบ		COR	AOR	95%CI	p-value
		n	%				
อาชีพของมารดา							0.037
ไม่ได้ทำ/แม่บ้าน (อ้างอิง)	230	11	4.8	1	1		
เกษตรกร	426	6	1.4	0.28	0.19	0.07, 0.57	0.003
รับจ้าง	544	25	4.6	0.96	0.55	0.24, 1.22	0.138
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	234	8	3.4	0.70	0.55	0.20, 1.51	0.246
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	68	2	2.9	0.60	0.46	0.08, 2.55	0.377
ระดับรายได้ของครอบครัว							0.525
<10,000 บาท (อ้างอิง)	830	31	3.7	1	1		
10,000-19,999 บาท	421	14	3.3	0.89	0.71	0.35, 1.45	0.354
≥20,000 บาท	252	7	2.8	0.74	0.64	0.24, 1.67	0.361
จำนวนสมาชิกในครัวเรือน							0.564
<5 คน (อ้างอิง)	858	26	3.0	1	1		
≥5 คน	645	26	4.0	1.34	1.20	0.65, 2.21	

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อจำกัดและจุดแข็ง และข้อเสนอแนะ

ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกในครัวเรือนต่อมาตราที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรและบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการศึกษาแบบเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study) มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดร้อยละและอธิบายลักษณะของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมาตราที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตร และต่อเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี และเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนกับผลกระทบต่อมาตราและต่อเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์โดยพนักงานสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรง เชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาตราที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรใน 6 อำเภอ ๆ ละ 1 ตำบล ละ 10 หมู่บ้าน ในช่วงเดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนธันวาคม 2566 รวม 3 เดือน รวมกลุ่มตัวอย่าง 1,503 คน ใช้สถิติ Multiple binary logistic regression สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างมาตราทั้งหมด 1,503 คน ส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 30 ปี ร้อยละ 30.5 อายุเฉลี่ย 41.4 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 38.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพคู่ตามกฎหมาย ร้อยละ 75.2 มากกว่าครึ่งของกลุ่มตัวอย่าง มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกร (ร้อยละ 60.1) ร้อยละ 55.2 ของกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ของครัวเรือนต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน มากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างมีสมาชิกในครัวเรือนต่ำกว่า 5 คน (ร้อยละ 57.1) และส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างพกพาอาศัยอยู่กับบุตรของตนเอง และ/หรือของสามี (ร้อยละ 61.1) รองลงมาอยู่กับคู่สมรส/แฟน (ร้อยละ 57.4) กลุ่มตัวอย่างมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา สูงถึงร้อยละ 38.6 โดยมีความถี่ของการดื่มเป็นครั้งคราว ร้อยละ 24.3 นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักเป็นครั้งคราวและประจำ 27.0 ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นิยมดื่มมากที่สุด ได้แก่ เบียร์ รองลงมา คือ สุราสีหรือสุราแดง

กลุ่มตัวอย่างมีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 52.8 โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร้อยละ 11.1 กลุ่มตัวอย่างมีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนมีการดื่มอย่างหนัก ร้อยละ 17.7 โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดื่มอย่างหนักอย่างน้อย 1 คน ร้อยละ 17.7 สมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนที่ดื่มหนักเป็นสามีหรือแฟนของกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 14.4 เกือบทั้งหมดของผู้ที่ดื่มอย่างหนักที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด เป็นสามีหรือแฟนของกลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 89.3) เกือบทั้งหมดเป็น

เพศชาย (ร้อยละ 99.1) และส่วนใหญ่มีความถี่ของการดื่มอย่างหนักเป็นครั้งคราว ร้อยละ 82.9 ผู้ที่ดื่มอย่างหนักที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด ส่วนใหญ่นิยมดื่มน้ำอุ่น/น้ำเย็น/น้ำผลไม้/น้ำชา/น้ำอัดลม ร้อยละ 56.8 และส่วนใหญ่นิยมดื่มนอกบ้าน ร้อยละ 81.6 และเกือบทั้งหมดมักมีอาการหลังการดื่ม คือ ได้กลืนแลกออกออล์ในลมหายใจ (ร้อยละ 87.6)

ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมาตราอย่างน้อย 1 ชนิด ภาพรวม ร้อยละ 23.0 เมื่อพิจารณาเป็นเหตุการณ์ พบร้า มีร้อยละของผลกระทบสูงสุดในเรื่อง เคยถูกคนที่ดื่มแลกออกออล์ดูด่าว่ากล่าว ตะคงดูก เหี้ยดหยาม หยาบคาย ดูหมิ่นและทะเลาะ ร้อยละ 7.8 รองลงมา เคยโดยสารหรือนั่งรถไปกับคนขับรถที่ดื่มแลกออกออล์ ร้อยละ 3.8 และเคยมีปัญหาทางด้านการเงิน เช่น ไม่มีเงินพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากการดื่มแลกออกออล์ของคนอื่น ร้อยละ 3.2 ส่วนบุคคลที่เป็นสาเหตุสำคัญ คือ สามีของกลุ่มตัวอย่าง

ร้อยละของผลกระทบจากการดื่มของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด ภาพรวม ร้อยละ 3.5 โดยมีร้อยละของผลกระทบสูงสุดในเรื่อง เด็กที่อยู่ในความดูแลถูกดูด่าอย่างรุนแรง เนื่องจากการดื่มแลกออกออล์ของคนในครอบครัว ร้อยละ 2.2 และเคยมีเงินไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็ก เนื่องจากการดื่มแลกออกออล์ของคนในครอบครัว ร้อยละ 1.8

การขอรับความช่วยเหลือ กรณีที่มาตราหรือเด็กในความดูแลเคยได้รับผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแลกออกออล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ($n=378$ คน) พบร้า เคยต้องโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากตำรวจ เนื่องจากการดื่มแลกออกออล์ของคนในครอบครัว ร้อยละ 2.9 รองลงมา เคยต้องไปรับบริการแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลหรือนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากการดื่มแลกออกออล์ของคนในครอบครัว ร้อยละ 2.8 และเคยต้องไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำจากผู้นำชุมชน เพื่อน เพื่อนบ้าน หรือหน่วยบริการอื่น ๆ เนื่องจากการดื่มแลกออกออล์ของคนในครอบครัว ร้อยละ 2.7

การดื่มเครื่องดื่มแลกออกออล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ได้แก่ จำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ดื่มหนัก ≥ 2 คน ($AOR = 22.96; 95\%CI = 8.05, 65.46$) จำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ดื่มหนัก 1 คน ($AOR = 10.39; 95\%CI = 7.13, 15.14$) และสมาชิกคนอื่น ๆ ดื่ม แต่ไม่ดื่มอย่างหนัก ($AOR = 3.91; 95\%CI = 2.78, 5.49$) การดื่มเครื่องดื่มแลกออกออล์ของมาตรา ได้แก่ มาตราดื่มอย่างหนักเป็นประจำ ($AOR = 3.25; 95\%CI = 1.58, 6.68; p-value = 0.001$) และมาตราไม่การดื่มแต่ไม่ดื่มอย่างหนัก ($AOR = 1.77; 95\%CI = 1.19, 2.63; p-value = 0.005$) และอาชีพรับจ้าง ($AOR = 1.66; 95\%CI = 1.08, 2.55; p-value = 0.020$) มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อมาตราอย่างน้อย 1 ชนิด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

การดื่มเครื่องดื่มแลกออกออล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ได้แก่ จำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ดื่มหนัก 1 คน ($AOR = 11.1; 95\%CI = 4.73, 26.44; p-value < 0.001$) และสมาชิกคนอื่น ๆ ดื่ม แต่ไม่ดื่มหนัก ($AOR = 3.41; 95\%CI = 1.41, 8.22; p-value = 0.006$) การดื่มเครื่องดื่มแลกออกออล์ของมาตรา ได้แก่ มาตราดื่มหนักเป็นประจำ ($AOR = 5.75; 95\%CI = 1.69, 19.61; p-value = 0.005$)

และมารดาดีมแต่ไม่ดีมอย่างหนัก ($AOR = 4.23; 95\%CI = 1.96, 9.16; p-value <0.001$) มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

การดีมเครื่องดีมแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและการดีมเครื่องดีมแอลกอฮอล์ของมารดา มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การดีมเครื่องดีมแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและการดีมเครื่องดีมแอลกอฮอล์ของมารดา มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อภิปรายผลดังนี้

1.1) ความสัมพันธ์ระหว่างการดีมเครื่องดีมแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือน กับผลกระทบต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิด

การดีมเครื่องดีมแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อธิบายได้ว่า มารดาที่มีจำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดีมอย่างหนัก ≥ 2 คน มีโอกาสได้รับผลกระทบต่อมารดาเป็น 22 เท่า เมื่อเทียบ กับมารดาที่สมาชิกในครัวเรือนคนอื่น ๆ ไม่ดีมเครื่องดีมแอลกอฮอล์ ($AOR = 22.96; 95\%CI = 8.05, 65.46; p-value <0.001$) มารดาที่มีจำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดีมอย่างหนัก 1 คน มีโอกาส ได้รับผลกระทบต่อมารดาเป็น 10 เท่า เมื่อเทียบกับมารดาที่มีสมาชิกในครัวเรือนคนอื่น ๆ ไม่ดีม เครื่องดีมแอลกอฮอล์ ($AOR = 10.39; 95\%CI = 7.13, 15.14; p-value <0.001$) และมารดาที่มี สมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดีม แต่ไม่ดีมอย่างหนัก มีโอกาสได้รับผลกระทบต่อมารดาเป็น 4 เท่า เมื่อ เทียบกับมารดาที่มีสมาชิกในครัวเรือนคนอื่น ๆ ไม่ดีมเครื่องดีมแอลกอฮอล์ ($AOR = 3.91; 95\%CI = 2.78, 5.49; p-value <0.001$) อธิบายได้ว่า การดีมเครื่องดีมแอลกอฮอล์ย่อมส่งผลกระทบต่อ ความสามารถของผู้ดีมในด้านการรับรู้และการประมวลผลข้อมูล ทำให้ผู้ดีมสูญเสียการควบคุมอารมณ์ การดีมเครื่องดีมแอลกอฮอล์ในบริมานมากหรือปริมาณใดก็ตามสำหรับผู้ติดสุรา สามารถเพิ่ม ความรู้สึกส่วนตัวและอำนาจเหนือผู้อื่นได้ ความรู้สึกเมื่ออำนาจและการควบคุมที่เพิ่มขึ้นจะทำให้มี แนวโน้มมากขึ้นที่จะทำร้ายหรือจะพยายามใช้อำนาจควบคุมผู้อื่น (*Domestic Violence: Explore the Issue*, n.d.) ดังนั้น การดีมเครื่องดีมแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือนจึงมี ความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อมารดา สอดคล้องกับการศึกษาของ การศึกษาของ Kim และคนอื่น ๆ ในประเทศไทยได้แบบระยะยาว ในมารดาที่เลี้ยงดูบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 2,150 คน พบร่วม การดีมของสามี เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อมารดา ($AOR=2.66; 95\% CI: 1.57, 4.49$) (Kim et al., 2021) และการศึกษาของ Caetano และคนอื่นๆ ในประเทศไทย ได้ทำการศึกษาแบบภาคตัดขวางในผู้หญิง จำนวน 1,037 คน พบร่วม การดีมเครื่องดีมแอลกอฮอล์ของ

สามี มีความสัมพันธ์กับผลกระทบในผู้หญิง 1.85 เท่า ($AOR = 1.85$; 95% CI = 1.25–2.73, $p < 0.01$) เมื่อเทียบกับผู้ที่สามีไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (Caetano et al., 2019)

1.2) ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมารดา กับผลกระทบต่อ มารดาอย่างน้อย 1 ชนิด

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมารดา มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อมารดาอย่างน้อย 1 ชนิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างมากได้ว่า มารดาที่มีการดื่มอย่างหนักเป็นประจำ มีโอกาสได้รับผลกระทบต่อมารดาเป็น 3.25 เท่า เมื่อเทียบกับมารดาที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ($AOR = 3.25$; 95%CI = 1.58, 6.68; $p\text{-value} = 0.001$) มารดาที่มีการดื่มแต่ไม่ดื่มอย่างหนัก มีโอกาสได้รับผลกระทบต่อมารดาเป็น 1.77 เท่า เมื่อเทียบกับมารดาที่ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ($AOR = 1.77$; 95%CI = 1.19, 2.63; $p\text{-value} = 0.005$) สอดคล้องกับงานวิจัยของ Quietz และความรุนแรงของผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้อื่น (AHTO) และความสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ที่ดีในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐอาณาจักร ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักเพิ่มความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่น 1.5 เท่า ($AOR = 1.5$, $p < 0.05$) (Quigg et al., 2019) การศึกษาของ Greenfield และคนอื่น ๆ ได้มีการศึกษาแนวโน้มของผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นต่อครอบครัว จากการศึกษาในระดับชาติ 4 ครั้งในประเทศไทยและอเมริกา ในระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-2015 พบว่า การดื่มหนักของเหยื่อมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากการดื่มของคนอื่น (Greenfield et al., 2015) และการศึกษาของ Beckhoff และคนอื่น ๆ ในประเทศไทย ที่พบว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของตนเอง เพิ่มความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่น (Beckhoff et al., 2022)

2.1) ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน กับผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างมากได้ว่า เด็กที่มีจำนวนสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก 1 คน มีโอกาสได้รับผลกระทบเป็น 11 เท่า เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่มีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ($AOR = 11.1$; 95%CI = 4.73, 26.44; $p\text{-value} < 0.001$) เด็กที่มีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดื่มแต่ไม่ดื่มอย่างหนัก มีโอกาสได้รับผลกระทบเป็น 3 เท่า เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่มีสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ($AOR = 3.41$; 95%CI = 1.41, 8.22; $p\text{-value} = 0.006$) สอดคล้องกับการศึกษาของ Perawas Preampruchcha และคนอื่น ๆ ในประเทศไทย ที่พบว่า ครัวเรือนที่มีนักดื่มอย่างหนักและมีความถี่ในการดื่มเป็นประจำ มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้อื่นต่อ

เด็ก เมื่อเทียบกับครัวเรือนที่ไม่มีนักดื่ม ($AOR=4.75$ และ 1.92 ตามลำดับ) (Preampruchcha et al., 2022) และการศึกษาของ Laslett และคนอื่น ๆ เป็นการศึกษาในระดับนานาชาติใน 8 ประเทศรวมถึงประเทศไทย พบร่วมกันว่า ผลกระทบจากการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ของผู้อื่นต่อเด็ก อยู่ในครอบครัวที่มีสมาชิกคนอื่น ๆ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนัก (Laslett et al., 2017)

2.2) ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมาตรากับผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิด

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมาตราก มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อเด็กอย่างน้อย 1 ชนิดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อธิบายได้ว่า เด็กที่มีมาตรากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักเป็นประจำ มีโอกาสได้รับผลกระทบเป็น 6 เท่าเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่มีมาตรากไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ($AOR = 5.75$; $95\%CI = 1.69, 19.61$; $p-value=0.005$) และเด็กที่มีมาตรากดื่มแต่ไม่ดื่มอย่างหนัก มีโอกาสได้รับผลกระทบเป็น 4 เท่า เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่มีมาตรากไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ($AOR = 4.23$; $95\%CI = 1.96, 9.16$; $p-value<0.001$) สอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกาของ Guttmannova และคนอื่น ๆ แบบระยะยาว (Cohort Study) ในปีдаหรือมาตรากที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูเด็กอายุไม่เกิน 5 ปี พบร่วมกันว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบิดาหรือมาตราก ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (Guttmannova et al., 2017) และงานวิจัยของ Freisthler และคนอื่น ๆ แบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (Mixed method) พบร่วมกันว่า ปริมาณการดื่มที่เพิ่มขึ้นของบิดาหรือมาตราก เพิ่มความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการดื่มของผู้อื่นต่อเด็ก (Freisthler et al., 2020)

5.3 ข้อจำกัดและจุดแข็ง

การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional analytical study) ซึ่งไม่อาจระบุความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้ อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้มีจุดแข็งคือ ใช้ขนาดตัวอย่างจำนวนมาก และเก็บข้อมูลตัวอย่างมาตรากที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตร จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีความเป็นตัวแทนที่ดีของมาตรากที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรของจังหวัดเพชรบูรณ์

5.4 ข้อเสนอแนะ

5.4.1 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

- เนื่องจากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบร่วมกันว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อมารดา ยิ่งมีจำนวนคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดื่มนักมากขึ้น ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อผลกระทบต่อมารดามากขึ้น จึงเสนอให้หน่วยงานระดับนโยบาย เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรออกกฎหมายหรือมาตรการ ห้ามสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่มารดาเลี้ยงดูบุตรอายุต่ำกว่า 5 ปี

2) เนื่องจากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า การดีม็ครีอิงดีม์แอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน มีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อเด็ก ยิ่งมีจำนวนคนอื่น ๆ ในครัวเรือนดีมานักมากขึ้น ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อผลกระทบต่อเด็กมากขึ้น ขณะที่การดีม์ของมาตรการก็มีผลกระทบต่อเด็กด้วย ยิ่งมาตรการดีม์อย่างหนัก ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงผลกระทบต่อเด็กมากขึ้น จึงเสนอให้หน่วยงานระดับนโยบาย เช่น กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ควรออกกฎหมายหรือมาตรการ ห้ามสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนรวมถึงมาตรการดีม์เครื่องดีม์แอลกอฮอล์ หากในครัวเรือนมีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

3) เนื่องจากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า การดีม์เครื่องดีม์แอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน มีความสัมพันธ์กับการได้รับผลกระทบต่อมาตรการและต่อเด็ก และการดีม์เครื่องดีม์แอลกอฮอล์ของมาตรการมีความสัมพันธ์กับผลกระทบต่อมาตรการและต่อเด็ก จึงเสนอให้หน่วยงานในระดับปฏิบัติการ เช่น การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปகครองจังหวัด ห้องถิน จังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรจัดกิจกรรมการคัดกรองและการส่งเสริมสุขภาพในมาตรการเด็กที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการดีม์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือน เช่น ครัวเรือนที่มีสมาชิกในครัวเรือนดีม์เครื่องดีม์แอลกอฮอล์

4) เนื่องจากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า ร้อยละของการได้รับผลกระทบจากการดีม์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนต่อมารามีอัตราที่สูง และกรณีที่มารดาและเด็กได้รับผลกระทบ มีความสามารถในการเข้าถึงการบริการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ น้อย ดังนั้น จึงเสนอให้หน่วยงานในระดับปฏิบัติการ เช่น พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ปกครองจังหวัด ห้องถิน จังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ควรจัดช่องทางในการสื่อสารและการขอรับการช่วยเหลือต่าง ๆ แก่มาตราที่ครัวเรือนมีสมาชิกในครัวเรือนคนอื่น ๆ ดีม์เครื่องดีม์แอลกอฮอล์

5.4.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

การศึกษาแบบติดตามในระยะยาว เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลกระทบของการดีม์เครื่องดีม์แอลกอฮอล์ของสมาชิกคนอื่น ๆ ในครัวเรือนกับผลกระทบต่อมาตรการและต่อเด็ก

ເອກສາຮອ້າງອີງ

- Beckhoff, G. B., Stock, C., & Bloomfield, K. (2022). Association between one's own consumption and harm from others' drinking: Does education play a role? *Scandinavian Journal of Public Health*, 50(2), 205–214.
<https://doi.org/10.1177/1403494820957848>
- Caetano, R., Cunradi, C. B., Alter, H. J., Mair, C., & Yau, R. K. (2019). Drinking and Intimate Partner Violence Severity Levels Among U.S. Ethnic Groups in an Urban Emergency Department. *Academic Emergency Medicine: Official Journal of the Society for Academic Emergency Medicine*, 26(8), 897–907.
<https://doi.org/10.1111/acem.13706>
- Callinan, S., Rankin, G., Room, R., Stanesby, O., Rao, G., Waleewong, O., Greenfield, T. K., Hope, A., & Laslett, A.-M. (2019). Harms from a partner's drinking: An international study on adverse effects and reduced quality of life for women. *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse*, 45(2), 170–178.
<https://doi.org/10.1080/00952990.2018.1540632>
- Domestic Violence: Explore the Issue.* (n.d.). Retrieved 19 April 2023, from <http://hrlibrary.umn.edu/svaw/domestic/link/alcohol.htm>
- Freisthler, B., Wolf, J. P., Hodge, A. I., & Cao, Y. (2020). Alcohol Use and Harm to Children by Parents and Other Adults. *Child Maltreatment*, 25(3), 277–288.
<https://doi.org/10.1177/1077559519878514>
- George, M., & Devi, N. B. (2022). The lived experiences of the spouses of alcohol dependent partners: A phenomenological study. *Journal of Global Health Reports*, 6, e2022064. <https://doi.org/10.29392/001c.57376>
- Greenfield, T. K., Karriker-Jaffe, K. J., Kaplan, L. M., Kerr, W. C., & Wilsnack, S. C. (2015). Trends in Alcohol's Harms to Others (AHTO) and Co-occurrence of Family-Related AHTO: The Four US National Alcohol Surveys, 2000-2015. *Substance Abuse: Research and Treatment*, 9(Suppl 2), 23–31.
<https://doi.org/10.4137/SART.S23505>
- Guttmannova, K., Hill, K. G., Bailey, J. A., Hartigan, L., Small, C. M., & Hawkins, J. D. (2017). Parental Alcohol Use, Parenting, and Child On-Time Development. *Infant and Child Development*, 26(5), e2013. <https://doi.org/10.1002/icd.2013>

- Jiang, H., Laslett, A.-M., Kuntsche, S., Callinan, S., Waleewong, O., & Room, R. (2022). A multi-country analysis of informal caregiving due to others' drinking. *Drugs (Abingdon, England)*, 29(6), 702–711.
<https://doi.org/10.1080/09687637.2021.1974342>
- Kaplan, L. M., Nayak, M. B., Greenfield, T. K., & Karriker-Jaffe, K. J. (2017). Alcohol's Harm to Children: Findings from the 2015 United States National Alcohol's Harm to Others Survey. *The Journal of Pediatrics*, 184, 186–192.
<https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2017.01.025>
- Kim, S., Choe, S.-A., & Cho, S.-I. (2021). Harmful alcohol use among mothers of under-five child: Findings from the Panel Study on Korean Children. *BMC Women's Health*, 21(1), 159. <https://doi.org/10.1186/s12905-021-01316-2>
- Laslett, A.-M., Jiang, H., Kuntsche, S., Stanesby, O., Wilsnack, S., Sundin, E., Waleewong, O., Greenfield, T. K., Graham, K., & Bloomfield, K. (2020). Cross-sectional surveys of financial harm associated with others' drinking in 15 countries: Unequal effects on women? *Drug and Alcohol Dependence*, 211, 107949.
<https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2020.107949>
- Laslett, A.-M., Rankin, G., Waleewong, O., Callinan, S., Hoang, H. T. M., Florenzano, R., Hettige, S., Obot, I., Siengsounthone, L., Ibanga, A., Hope, A., Landberg, J., Vu, H. T. M., Thamarangsi, T., Rekve, D., & Room, R. (2017). A Multi-Country Study of Harms to Children Because of Others' Drinking. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, 78(2), 195–202. <https://doi.org/10.15288/jsad.2017.78.195>
- Moan, I. S., Bye, E. K., Storvoll, E. E., & Lund, I. O. (2019). Self-reported harm from others' alcohol, cigarette and illegal drug use in Norway. *Nordisk Alkohol- & Narkotikatidskrift*: NAT, 36(5), 413–429.
<https://doi.org/10.1177/1455072519836372>
- Preampruchcha, P., Suwanno, N., Petchana, B., Kuemee, T., Tanaree, A., Nontarak, J., Balthip, K., Ratworawong, K., Hayiyani, N., Oumudee, N., Maneemai, O., Waleewong, O., Chotipanvithayakul, R., Nasueb, S., Rungruang, S., Chaiyasong, S., Saokaew, S., Intanont, T., Donraman, T., ... Vichitkunakorn, P. (2022). The effects of others' drinking on the harms to children in Thailand: Lessons from the WHO-ThaiHealth project. *PLoS One*, 17(3), e0265641.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0265641>

- Quigg, Z., Bellis, M. A., Grey, H., Webster, J., & Hughes, K. (2019a). Alcohol's harms to others in Wales, United Kingdom: Nature, magnitude and associations with mental well-being. *Addictive Behaviors Reports*, 9, 100162.
<https://doi.org/10.1016/j.abrep.2019.100162>
- Quigg, Z., Bellis, M. A., Grey, H., Webster, J., & Hughes, K. (2019b). Alcohol's harms to others in Wales, United Kingdom: Nature, magnitude and associations with mental well-being. *Addictive Behaviors Reports*, 9, 100162.
<https://doi.org/10.1016/j.abrep.2019.100162>
- Sundin, E., Galanti, M. R., Landberg, J., & Ramstedt, M. (2021). Severe harm from others' drinking: A population-based study on sex differences and the role of one's own drinking habits. *Drug and Alcohol Review*, 40(2), 263–271.
<https://doi.org/10.1111/dar.13202>
- Sundin, E., Landberg, J., Galanti, M. R., Room, R., & Ramstedt, M. (2022). Country-Level Heavy Episodic Drinking and Individual-Level Experiences of Harm from Others' Drinking-Related Aggression in 19 European Countries. *European Addiction Research*, 28(2), 134–142. <https://doi.org/10.1159/000520079>
- Waleewong, O., Jankhotkaew, J., Thamarangsi, T., & Chaiyasong, S. (2017a). Prevalence of harm from others' alcohol drinking and the relationships with demographics and the respondents' drinking behaviors in Thailand. *Journal of Substance Use*, 22(6), 605–611. <https://doi.org/10.1080/14659891.2017.1283451>
- Waleewong, O., Jankhotkaew, J., Thamarangsi, T., & Chaiyasong, S. (2017b). Prevalence of harm from others' alcohol drinking and the relationships with demographics and the respondents' drinking behaviors in Thailand. *Journal of Substance Use*, 22(6), 605–611. <https://doi.org/10.1080/14659891.2017.1283451>
- White, A. M. (2020). Gender Differences in the Epidemiology of Alcohol Use and Related Harms in the United States. *Alcohol Research: Current Reviews*, 40(2), 01. <https://doi.org/10.35946/arcr.v40.2.01>

ภาคผนวก



ใบรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการวิจัยเรื่อง : อันตรายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกในครัวเรือนต่อการดาที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรและบุตรชายต่ำกว่า 5 ปี ในจังหวัดเพชรบูรณ์

- ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สอนทน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล จันทร์มา¹
3. นางอัมพร สอนทน

เอกสารที่พิจารณา :

- | | |
|---|--|
| 1. แบบเสนอเพื่อขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ | ฉบับลงวันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 |
| 2. โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ | ฉบับลงวันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 |
| 3. แบบคำขอเจงอาสาสมัคร | ฉบับลงวันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 |
| 4. แบบยินยอมอาสาสมัคร | ฉบับลงวันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 |
| 5. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย | ฉบับลงวันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 |
| 6. ประวัติผู้วิจัย | ฉบับลงวันที่ 10 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 |
| 7. ใบผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ | |

ได้รับการพิจารณาและผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยยึดหลักเกณฑ์ตามคำประกาศเฮลซิกกิ (Declaration of Helsinki) มีความสอดคล้องกับหลักจริยธรรมทางการติดต่อและข้อกำหนดภายในประเทศ จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการวิจัยตามโครงการวิจัยได้ โดยให้ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยทุก 6 เดือน แจ้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในกรณีที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยหรือหยุดโครงการก่อนกำหนด รายงานเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด รายงานข้อมูลข่าวสารที่คุณธรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ควรได้รับระหว่างดำเนินการวิจัย และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เมื่อเสร็จสิ้นโครงการวิจัย



(รองศาสตราจารย์ ดร.อธิศ แนวอนันต์)
ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เลขที่ใบรับรอง : HE-175-2566

วันที่รับรอง : 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
วันที่หมดอายุ : 26 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567



Ethics in Human Research Certificate Nakhon Ratchasima Rajabhat University

Protocol Title : Harm from household members's drinking to mothers who are responsible for raising children and their children under 5 years in Phetchabun province.

Principle Investigator : 1. Asst. Prof. Dr. Paithoon Sonthon
2. Asst. Prof. Dr. Narumon Janma
3. Mrs. Aumporn Sonthon

Reviewed Document :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Submission Form for Ethical Review | 10 July 2023 |
| 2. Full Protocol | 10 July 2023 |
| 3. Participant information sheet | 10 July 2023 |
| 4. Informed consent form | 10 July 2023 |
| 5. Research Instrument | 10 July 2023 |
| 6. Principle Investigator's Curriculum Vitae | |
| 7. Certificate of Attendance in Human subject protection Training | |

Ethics in Human Research Committee, Nakhon Ratchasima Rajabhat University has reviewed and approved this research to be carried out according to this research in compliance with the declaration of Helsinki, ICH - GCP. The investigator shall provide reports to the committee concerning the progress of the research every 6 months as well as the amendment, termination, and all serious adverse and unanticipated events. The investigator shall submit the full protocol once the research is done.

(Associate Professor Dr. Adisorn Naowanondha)
Chairman of Ethics in Human Research Committee
Nakhon Ratchasima Rajabhat University

Certificate Number : HE-175-2023

Approval date : 27 July 2023
Expiry date : 26 July 2024

ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์

แบบสอบถามสัมภาษณ์

เรื่อง ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสมาชิกในครัวเรือนต่อมาตรการที่ทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตร และบุตรอายุไม่เกิน 5 ปี ในจังหวัดเพชรบูรณ์

คำชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับลักษณะทางประชาราษฎร เศรษฐกิจและสังคม ของมาตรการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมาตรการ อันตราจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว เพื่อนและคนแปลกหน้าต่อมาตรการ ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัวต่อมาตรการ การต้องดูแลผู้ดื่มแอลกอฮอล์และเด็กในความดูแลของมาตรการ ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของเพื่อน คนแปลกหน้าในชุมชนต่อมาตรการ ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัวต่อเด็ก การขอรับความช่วยเหลือ กรณีที่มาตรการหรือเด็กในความดูแลเคยได้รับผลกระทบ และพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ดื่มหนักในครัวเรือนที่ ส่งผลกระทบต่อตัวมาตรการมากที่สุด ซึ่งค่าตอบของคุณ จะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีผลต่อตัวท่านในด้านใด ทั้งสิ้น

โปรดทำเครื่องหมาย✓ ลงใน หรือเติมคำลงใน.....

แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น 8 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชาราษฎร เศรษฐกิจและสังคมของมาตรการ

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมาตรการ

ส่วนที่ 3 ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว เพื่อนและคนแปลกหน้าต่อมาตรการ

ส่วนที่ 4 ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัวต่อมาตรการ

ส่วนที่ 5 การต้องดูแลผู้ดื่มแอลกอฮอล์และเด็กในความดูแลของมาตรการ

ส่วนที่ 6 ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัวต่อเด็กในความดูแล

ส่วนที่ 7 การขอรับความช่วยเหลือ กรณีที่มาตรการหรือเด็กในความดูแลเคยได้รับผลกระทบ

ส่วนที่ 8 พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ดื่มหนักในครัวเรือนที่ส่งผลกระทบต่อมาตรการมากที่สุด

ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ สอนหน

หัวหน้าโครงการวิจัยและคณบัญชีวิจัย

คำถามคัดกรอง

1) คุณมีบุตร (รวมถึงบุตรบุญธรรม/ลูกติดของสามี) อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ต้องดูแลและพักอาศัยอยู่ใน ครัวเรือนเดียวกับคุณหรือไม่?

1) ไม่มี

2) มี.....คน

2) คุณมีบุตร (รวมถึงบุตรบุญธรรม/ลูกติดของสามี) อายุไม่เกิน 5 ปี ที่ต้องดูแลและพักอาศัยอยู่ใน ครัวเรือนเดียวกับคุณหรือไม่?

1) ไม่มี

2) มี.....คน

3) คุณยังมีเด็กคนอื่นๆ (ลูกของพี่หรือน้องหรือญาติ) อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ต้องดูแลและพักอาศัยอยู่ใน ครัวเรือนเดียวกับคุณ หรือไม่ ?

1) ไม่มี

2) มี.....คน

ส่วนที่ 1 ลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคมของมารดา

1) อายุของคุณปี (หากเกิน 6 เดือน ให้นับเพิ่มอีก 1 ปี)

2) ระดับการศึกษาของคุณ

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1) ไม่ได้เรียน | <input type="checkbox"/> 2) ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า |
| <input type="checkbox"/> 3) มัธยมศึกษาตอนต้น | <input type="checkbox"/> 4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. |
| <input type="checkbox"/> 5) ปวส./ปวท./อนุปริญญา | <input type="checkbox"/> 6) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า |

3) สถานภาพสมรสตามกฎหมายของคุณ

- | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 1) โสด | <input type="checkbox"/> 2) สมรส | <input type="checkbox"/> 3) หม้าย | <input type="checkbox"/> 4) หย่า/แยก |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|

4) อาชีพของคุณ

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1) ว่างงาน | <input type="checkbox"/> 2) เกษตรกร | <input type="checkbox"/> 3) รับจ้างทั่วไป |
| <input type="checkbox"/> 4) รับจ้างโรงงาน | <input type="checkbox"/> 5) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | <input type="checkbox"/> 6) ลูกจ้างรัฐฯ |
| <input type="checkbox"/> 7) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ | <input type="checkbox"/> 8) ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน | <input type="checkbox"/> 9) แม่บ้าน |

5) รายได้ของครอบครัวคุณต่อเดือน.....บาท/เดือน

6) คุณพักอาศัยอยู่กับใคร ดังต่อไปนี้บ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1) คู่สมรส/แฟน | <input type="checkbox"/> 2) พ่อแม่ของตนเอง |
| <input type="checkbox"/> 3) พ่อแม่ของสามี | <input type="checkbox"/> 4) บุตรของคุณ และ/หรือของสามี |
| <input type="checkbox"/> 5) ญาติคนอื่นๆฝ่ายสามี | <input type="checkbox"/> 6) ญาติคนอื่นๆฝ่ายคุณ |
| <input type="checkbox"/> 7) คนอื่นๆ โปรดระบุ..... | |

8) จำนวนสมาชิกห้าหงหงดที่อาศัยในครัวเรือนของคุณ(รวมตัวคุณ).....คน

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของมารดา

1) ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณดื่มแอลกอฮอล์ รวมyatดองเหล้า บอยแคร์Hen อย่างไร

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1) ทุกวัน (7 วันต่อสัปดาห์) | <input type="checkbox"/> 2) เกือบทุกวัน (5-6 วันต่อสัปดาห์) |
| <input type="checkbox"/> 3) วันเว้นวัน (3-4 วันต่อสัปดาห์) | <input type="checkbox"/> 4) ทุกสัปดาห์ (1-2 วันต่อสัปดาห์) |
| <input type="checkbox"/> 5) ทุกเดือน (2-3 วันต่อเดือน) | <input type="checkbox"/> 6) นานๆครั้ง (1 วันต่อเดือน) |
| <input type="checkbox"/> 7) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่าเดือนละครั้ง) | <input type="checkbox"/> 8) ไม่เคยดื่มเลย (สื้นสุดการสัมภาษณ์ในส่วนนี้) |

2) ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา คุณเคยดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักหรือดื่มปริมาณมาก ๆ ในครั้งเดียวหรือไม่ (ดื่มหนัก เช่น แต่ละครั้งดื่มเบียร์มากกว่า 2.5 ขวดใหญ่หรือ 5 กระป๋อง, เหล้าขาวมากกว่าครึ่งแบบ, เหล้าสีผสมแล้ว 5 แก้วขึ้นไป, ไวน์คูลเลอร์มากกว่า 6 ขวด)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1) ทุกวัน (7 วันต่อสัปดาห์) | <input type="checkbox"/> 2) เกือบทุกวัน (5-6 วันต่อสัปดาห์) |
| <input type="checkbox"/> 3) วันเว้นวัน (3-4 วันต่อสัปดาห์) | <input type="checkbox"/> 4) ทุกสัปดาห์ (1-2 วันต่อสัปดาห์) |
| <input type="checkbox"/> 5) ทุกเดือน (2-3 วันต่อเดือน) | <input type="checkbox"/> 6) นานๆครั้ง (1 วันต่อเดือน) |
| <input type="checkbox"/> 7) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่าเดือนละครั้ง) | <input type="checkbox"/> 8) ไม่เคยดื่มหนักเลย (สื้นสุดการสัมภาษณ์ในส่วนนี้) |

3) ชนิดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่คุณดื่ม บอยที่สุด

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1) เปียร์ | <input type="checkbox"/> 2) สุราขาว/สุรากลั่นในชุมชน |
| <input type="checkbox"/> 3) สุราสี/สุราแดง | <input type="checkbox"/> 4) เหล้าดองยา/สุราเจี๊ยบ |
| <input type="checkbox"/> 5) ไวน์/ไวน์คูลเลอร์/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม | <input type="checkbox"/> 6) สุราแซ่บฟันเมือง เช่น สาโท กระแซ่บ |

4) โดยรวมแล้ว ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การดื่มแอลกอฮอล์ของคุณ ส่งผลกระทบด้านต่างๆต่อผู้อื่น (คนอื่นๆทุกคนที่ไม่ใช่คุณ เป็นไปได้ทั้งคนในครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน คนในชุมชนและคนแปลงหน้าที่ไม่รู้จัก) อยู่ในระดับใด?

จากคะแนนความรุนแรง 1 ถึง 10 โดย 1 หมายถึงรุนแรงน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงรุนแรงมากที่สุด

รุนแรงน้อยที่สุด

รุนแรงปานกลาง

รุนแรงมากที่สุด

1 ไม่มีอันตราย ^{โดย}	2	3	4	5	6	7	8	9	10
----------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**ส่วนที่ 3 ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว เพื่อนและคนแปลงหน้าต่อมาตรา
คนอื่น ในที่นี้หมายถึง คนอื่นๆ ทุกคนที่ไม่ใช่ตัวคุณ เป็นไปได้ทั้งคนในครอบครัว(ลูก สามี พ่อแม่) เพื่อน เพื่อนร่วมงาน
คนในบุคคลทั้งหมดที่คนแปลงหน้าที่เมื่อวันก่อน**

คำถามต่อไปนี้ เป็นคำถามเกี่ยวกับผลกระทบจากการดื่มของคนในครอบครัว เพื่อนและคนแปลงหน้า ต่อตัวคุณ

ข้อ	ผลกระทบจากการดื่มของคนในครอบครัว เพื่อนและคนแปลงหน้าต่อตัวคุณ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	ความถี่			ถ้าเคย บุคคลดังกล่าวเป็นคร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)			
		ไม่ เคย	1-2 ครั้ง	3 ครั้ง ขึ้นไป	สามี	คนใน ครอบครัว ที่ไม่ใช่ สามี	เพื่อน	คน แปลง หน้า
1	คุณเคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ดูด่าจากล่า ตะโกน ดู ถูก เหี้ยดหมาย หยาบคาย ดูหมิ่นและทะเลาะ							
2	คุณเคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ผลัก ดึง							
3	คุณเคยถูกคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ ทำร้ายร่างกาย (ทุบ ตบ ตี แตะ ต่อย)							
4	คุณเคย ถูกคนอื่นที่ดื่มแอลกอฮอล์ ทำลายข้าวของหรือ ทรัพย์สินของคุณ							
5	คุณเคย เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางถนน ที่เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น (เช่น เป็นผู้โดยสาร คู่กรณี ได้รับลูกหลง บาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย)							
6	บ้าน รถ หรือทรัพย์สินต่างๆของคุณ เคยได้รับความเสียหาย เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น							
7	คุณเคย โดยสารหรือนั่งรถไปกับคนขับรถที่ดื่ม แอลกอฮอล์							
8	คุณเคย ถูกรบกวน โดยคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างงานเลี้ยงหรือสถานที่ส่วนบุคคลอื่น ๆ							
9	คุณเคย รู้สึกว่าถูกข่มขู่หรือรู้สึกกลัว คนที่ดื่ม แอลกอฮอล์ในบ้านตนเอง/ในสถานที่ส่วนบุคคลอื่น ๆ							
10	คุณเคย มีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาชีวิตสมรส เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น							
11	คุณเคย มีปัญหากับเพื่อน หรือเพื่อนบ้าน เนื่องจาก การดื่มแอลกอฮอล์ของคนอื่น							
12	คุณเคย มีปัญหาทางด้านการเงิน เช่น ไม่มีเงินพอ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากการดื่ม แอลกอฮอล์ของคนอื่น							

ส่วนที่ 4 ผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัวต่อมาตรา

4.1) ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีสมาชิกในครัวเรือนของคุณ (ไม่รวมตัวคุณ) ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีกี่คน

1) ไม่มี (ยุติ)

2) มี คน (ถามต่อ)

4.2) ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา สมาชิกในครอบครัวของคุณ(ไม่รวมตัวคุณ) มี “คนที่ดื่มหนัก(ค่อนข้างหนัก)” หรือ “คนที่ดื่มปริมาณมากๆในบางครั้ง” บ้างหรือไม่

1) ไม่มี

2) มี คน

4.3) ถ้ามีคนในครอบครัวที่ดื่มแอลกอฮอล์หนัก คนเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กับคุณอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ข้อ 4.3 ความสัมพันธ์กับคุณ เป็น..

- 1) สามี/แฟน
- 2) อภิเตศามี
- 3) เด็กชายใต้การดูแล อายุ 18 ปีลงไป
- 4) เด็กชายใต้การดูแล อายุ 18 ปีขึ้นไป
- 5) พ่อตนเอง/พ่อสามี
- 6) แม่ตนเอง/แม่สามี
- 7) บุรุษ/ชาย/ยาวยา
- 8) พี่ชาย/น้องชาย
- 9) พี่สาว/น้องสาว
- 10) ญาติผู้ชายคนอื่นๆ (เช่น ลุง อา น้า)
- 11) ญาติผู้หญิงคนอื่นๆ (เช่น ป้า อา น้า)

4.4 คุณเคยได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาหรือไม่

	4.4 ผลกระทบจากการดื่มของของคนในครอบครัวต่อตัวคุณ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	ความถี่		
		ไม่ เคย	1-2 ครั้ง	3 ครั้ง ขึ้นไป
1	คุณเคย รู้สึกเสียใจ/รู้สึกว่าถูกเพิกเฉย เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			
2	คุณเคย รู้สึกไม่อยากใส่ใจ (ไม่อยากแม่แต่จะมองหน้า) คนดังกล่าว เนื่องจากการดื่ม แอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			
3	คุณเคย หมดสนุกหรือเกิดปัญหาในงานสังคมต่างๆ ที่คุณเข้าร่วม เนื่องจากการดื่ม แอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			
4	คุณเคย ถูกคนเหล่านี้ ขโมยเงินหรือของมีค่าของคุณ เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคน ในครอบครัว			
5	*กล่าวขอโทษ และถามอย่างสุภาพ* คุณเคย ถูกบังคับหรือกดขี่ทางเพศ เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			
6	คุณเคย ต้องหลอกเลี้ยง โดยไม่พบปะเพื่อน ญาติพี่น้อง เพราะรู้สึกอาย เนื่องจากการดื่ม แอลกอฮอล์ของผู้อื่น ถึงพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			
7	คุณเคย ต้องหนีออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่น เพราะการดื่มแอลกอหอล์ของคนในครอบครัว			
8	คุณเคย มีเงินไม่เพียงพอ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในบ้าน เนื่องจากการดื่มแอลกอหอล์ของ คนในครอบครัว			
9	คุณเคย ดื่มแอลกอหอล์เพื่อเตรียมรับมือกับการดื่มแอลกอหอล์ของคนในครอบครัว			
10	คุณเคย ดูด่าว่ากล่าวหรือเดินตีบุตรหรือเด็กปกครอง เพื่อประชด/ระบายความเครียด เนื่องจากการดื่มแอลกอหอล์ของคนในครอบครัว			

11. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคุณจากการดื่มของคนในครอบครัว อยู่ในระดับใด?

จากคะแนนความรุนแรง 1 ถึง 10 โดย 1 หมายถึงรุนแรงน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงรุนแรงมากที่สุด

รุนแรงน้อยที่สุด	รุนแรงปานกลาง					รุนแรงมากที่สุด				
1 ไม่มีอันตราย ^{เลย}	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

ส่วนที่ 5 การต้องดูแลผู้ดีมแอลกอฮอล์และเด็กในความดูแลของมารดา
สิ่งที่ต้องทำหรือต้องจัดการ เนื่องมาจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว

5.1 การต้องดูแลผู้ดีมแอลกอฮอล์และเด็กในความดูแล ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา		ความถี่		
		ไม่เคย	1-2 ครั้ง	3 ครั้งขึ้นไป
1	คุณเคย ดูแลคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่ดีมแอลกอฮอล์ เนื่องมาจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			
2	คุณเคย ต้องดูแลเด็กหรือคนอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			
3	คุณเคย ต้องทำความสะอาดบ้าน หลังจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			
4	คุณเคย ต้องพยายามปรับหรือพยายามส่งคนในครอบครัวหรือเพื่อน เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			

ส่วนที่ 6 ผลกระทบจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัวต่อเด็กในความดูแล

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เด็กอายุในความดูแลคุณ เคยได้รับผลกระทบเนื่องมาจากการดีมของคนในครอบครัวหรือไม่ (รวมการดีมของคุณ) โดยทำเครื่องหมาย “✓” ลงในช่องคำตอบที่เป็นจริงเพียงข้อเดียว

ข้อ	ผลกระทบจากการดีมของคนในครอบครัวต่อเด็กอายุ ไม่เกิน 5 ขวบ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	ความถี่ของผลกระทบ		
		ไม่เคย	1-2 ครั้ง	3 ครั้งขึ้นไป
1	เด็กที่คุณดูแล <u>ถูกทอดทิ้งหรือถูกปล่อยให้อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย</u> เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			
2	เด็กที่คุณดูแล <u>ถูกดูดอย่างรุนแรง</u> เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			
3	เด็กที่คุณดูแล <u>ถูกตีหรือถูกทำร้ายร่างกาย</u> เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			
4	เด็กที่คุณดูแล <u>อยู่ในเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว</u> เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			
5	เด็กที่คุณดูแล <u>ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานคุ้มครองเด็ก และเยาวชน</u> เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			
6	คุณเคย มีเงินไม่เพียงพอสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กที่คุณดูแล เนื่องจากการดีมแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			
7	โปรดระบุ จำนวนเด็กอายุไม่เกิน 5 ขวบที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวข้างต้น คน		
8	โปรดระบุ จำนวนเด็กอายุไม่เกิน 18 ขวบที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวข้างต้น คน		
9	ผู้ที่ดีมแอลกอฮอล์นั้น เกี่ยวข้องอย่างไรกับเด็ก? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	<input type="checkbox"/> 1.พ่อ <input type="checkbox"/> 2.พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง <input type="checkbox"/> 3.แม่ <input type="checkbox"/> 4.พื่นอ้าง <input type="checkbox"/> 5.ญาติฝ่ายพ่อ <input type="checkbox"/> 6.ญาติฝ่ายแม่ <input type="checkbox"/> 7.อื่นๆระบุ..... 		
10	ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เด็กอายุไม่เกิน 5 ขวบในความดูแลคุณ เคยได้รับผลกระทบดังกล่าวข้างต้น จากการดีมแอลกอฮอล์ของคุณหรือไม่ ?	<input type="checkbox"/> 1.เคย <input type="checkbox"/> 2.ไม่เคย		
11	ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เด็กอายุไม่เกิน 18 ขวบในความดูแลคุณ เคยได้รับผลกระทบดังกล่าวข้างต้น จากการดีมแอลกอฮอล์ของคุณหรือไม่ ?	<input type="checkbox"/> 1.เคย <input type="checkbox"/> 2.ไม่เคย		

12. ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ระดับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กในความดูแลของคุณ อยู่ในระดับใด?

จากคะแนนความรุนแรง 1 ถึง 10 โดย 1 หมายถึงรุนแรงน้อยที่สุด และ 10 หมายถึงรุนแรงมากที่สุด

รุนแรงน้อยที่สุด	รุนแรงปานกลาง	รุนแรงมากที่สุด
1 ไม่มีผลเลย	2	3
4	5	6
7	8	9
10		

ส่วนที่ 7 การขอรับความช่วยเหลือ กรณีที่มารดาหรือเด็กในความดูแลเคยได้รับผลกระทบ

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา กรณีที่คุณหรือเด็กในความดูแลเคยได้รับผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว (หากไม่เคย ให้ยุติการตอบ)

ข้อ	การใช้บริการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา	ความถี่		
		3 ครั้ง ขึ้นไป	1-2 ครั้ง	ไม่ เคย
1	คุณเคย ต้องโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากตำรวจ เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			
2	คุณเคย ต้องไปรับบริการแผนกฉุกเฉินที่โรงพยาบาลหรือนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			
3	คุณเคย ต้องไปพบแพทย์ พยาบาล ที่สถานบริการสาธารณสุขต่างๆ รวมถึงการซื้อยา เพื่อรักษาตนเองที่ร้านขายยา เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			
4	คุณเคย ไปรับบริการหรือขอคำปรึกษาที่ศูนย์บริการต่างๆ (เช่น สายด่วนอหทัยเงิน บุณนิช เพื่อสังคมต่างๆ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน) เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			
5	คุณเคย ต้องไปขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำจากผู้นำชุมชน เพื่อน เพื่อบ้าน หรือหน่วยบริการอื่นๆ เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนในครอบครัว			

ส่วนที่ 8 พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ดื่มหนักในครัวเรือนที่ส่งผลกระทบต่อรามากที่สุด

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา “คนที่ดื่มหนัก(ค่อนข้างหนัก)” หรือ “คนที่ดื่มปริมาณมากในบางครั้ง” ในบ้านเดียวกับคุณที่ส่งผลกระทบต่อตัวคุณมากที่สุด (เลือก 1 คน)

- 1) ไม่มีคนดื่มหนัก (ให้ยุติ) 2) มีคนดื่มหนัก แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อตัวคุณ (ให้ยุติ)
 3) มีคนดื่มหนัก โดยคนที่ส่งผลกระทบต่อตัวคุณมากที่สุด คือ คนดังต่อไปนี้

1) คนที่ดื่มหนักดังกล่าว มีความสัมพันธ์กับคุณอย่างไร

- 1) สามี/แฟน 2) พ่อตันเอง/พ่อสามี/แม่ตันเอง/แม่สามี
 3) ปู่ย่า/ตายาย 4) พี่ชาย น้องชาย พี่สาวน้องสาว
 5) ญาติคุณอื่นๆ ลุง ป้า น้า อา 6) อื่นๆ โปรดระบุ.....

2) เพศของคนดื่มหนักคนนี้ 1) ชาย

2) หญิง

3) อายุของคนดื่มหนักคนนี้.....ปี

4) คนที่ดื่มหนักคนนี้ ดื่มบ่อยครั้งเพียงใด

- 1) ทุกวัน (7 วันต่อสัปดาห์) 2) เกือบทุกวัน (5-6 วันต่อสัปดาห์)
 3) วันเว้นวัน (3-4 วันต่อสัปดาห์) 4) ทุกสัปดาห์ (1-2 วันต่อสัปดาห์)
 5) ทุกเดือน (2-3 วันต่อเดือน) 6) นานๆครั้ง (1 วันต่อเดือน)
 7) นานๆ ครั้ง (น้อยกว่าเดือนละครั้ง)

5) คนที่ดื่มหนักคนนี้ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดใดมากที่สุด

- 1) เปียร์ 2) สุราขาว/สุรากลิ้นในชุมชน
 3) สุราสี/สุราแดง 4) เหล้าดองยา/สุราจีน
 5) ไวน์/ไวน์คูลเลอร์/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม 6) สุราแซ่บพื้นเมือง เช่น สาโท กระแซ่บ

6) คนที่ดื่มหนักคนนี้ เวลาที่ดื่มหนัก มีอาการอย่างไร

- 1) เมานิ่ม/ไม่สามารถยืนได้/หมดสติ 2) เมา มีอาการยืนไม่ตรง พูดจาไม่รู้เรื่อง
 3) รู้ว่าดื่มมา ได้กินแล้วและอยู่ในลมหายใจ

7) คนที่ดื่มหนักคนนี้ ส่วนใหญ่ดื่มในบ้านหรืออกบ้าน 1) นอกบ้าน

2) ในบ้าน

ภาคผนวก ค ประวัติคณะผู้วิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย

- | | |
|--|---|
| 1. ชื่อ-นามสกุล | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพทูรย์ สอนthon
Assistant Dr. Paithoon Sonthon |
| 2. ตำแหน่งปัจจุบัน | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
| 3. ตำแหน่งทางวิชาการ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ |
| 4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก | สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 ม.11 ถนนสรระบุรี-หล่มสัก
ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
sonthon_pai@hotmail.com |

5. ประวัติการศึกษา

สารานุสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สารานุสุขศาสตร์) สาขาวิชาบริหาร
สารานุสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
สารานุสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอก สารานุสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยสโขทัยธรรมราช

6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

ระบบวิทยาโรคไม่ติดต่อและไม่ติดต่อ แผนและนโยบาย สาธารณสุข และระบบวิทยาการสสพดิ

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นงานวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย: ผลกระทบของการสูบบุหรี่และการสัมผัสบุหรี่เมื่อสองระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่ส่งผลกระทบต่อทารกแรกเกิดในครรภ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาเสพ (ศจย.) ปี 2561

หัวหน้าโครงการวิจัย: ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สุขภาพ
เกี่ยวกับโรคเบาหวานการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานและ
ผลลัพธ์ทางคลินิก ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 แหล่งทุน ทุน
สนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์ 50,000 บาท ปี 2562

หัวหน้าโครงการวิจัย: การวิเคราะห์การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราในระดับชาติ แหล่งทุน ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา 50,000 บาท ปี 2563

8. ผลงานตีพิมพ์

- Sonthon, P., Janma, N., & Saengow, U. (2021). Association between age at first alcohol use and heavy episodic drinking: An analysis of Thailand's smoking and alcohol drinking behavior survey 2017. *PLOS ONE*, 16(11), e0259589. Public Library of Science.
- ไพบูลย์ สอนหนน และอัมพร สอนหนน. (2564). การได้รับคุณบุหรี่เมื่อสองในบ้านระหว่างตั้งครรภ์ กับน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย. *Thai Journal of Public Health*, 51(2), 92–100.
- ไพบูลย์ สอนหนน และอัมพร สอนหนน. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานกับการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2. *วารสารการพยาบาลและสุขภาพ*, 14(2), 86–100.
- ไพบูลย์ สอนหนน. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้สุขภาพกับการควบคุมน้ำตาลของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2. *Thai Journal of Public Health*, 50(1), 76-88.
- ไพบูลย์ สอนหนน และอัมพร สอนหนน. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสัมผัสบุหรี่เมื่อสองในบ้านระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ จังหวัดเพชรบูรณ์. *Thai Journal of Public Health*, 49(3), 350-362.

ผู้ร่วมวิจัย

1. ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุณล จันทร์มา
Assistant Dr.Narumon Janma
2. ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
3. ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 83 ม.11 ถนนสารบุรี-หล่มสัก
ตำบลสะเตียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
Dominiger2524@hotmail.com

5. ประวัติการศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การพัฒนาสุขภาพชุมชน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ครุศาสตรบัณฑิต(สุศึกษา) สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์

6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

พฤษศาสตร์สุขภาพและระบบวิทยาการสสส.

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย: ผลกระทบด้านต่าง ๆ ของกัญชา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน ศูนย์วิจัยปัญหาการสสส. (ศศก.) ปี 2563

หัวหน้าโครงการวิจัย: ความอยู่ดีมีสุขของผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จังหวัดเพชรบูรณ์ แหล่งทุน ทุนสนับสนุนการจัดทำ
ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปี 2562
หัวหน้าโครงการวิจัย: การวิเคราะห์การสำรวจพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่และการดื่มสุราในระดับชาติ แหล่งทุน ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
ปี 2563

9. ผลงานตีพิมพ์

- Sonthon, P., Janma, N., & Saengow, U. (2021). Association between age at first alcohol use and heavy episodic drinking: An analysis of Thailand's smoking and alcohol drinking behavior survey 2017. *PLOS ONE*, 16(11), e0259589. Public Library of Science.
- นฤมล จันทร์มา. (2561). การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเขต 2.
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน, 6(4), 518-524.
- นฤมล จันทร์มา. (2563). การใช้ยาเสพติดในผู้ใช้แรงงานชนส่ง. *วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน*, 8(1), 117-128.
- นฤมล จันทร์มา. (2563). ความอยู่ดีมีสุขของสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเพชรบูรณ์.
วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน, 8(2), 221-236.

ผู้ร่วมวิจัย

1. ชื่อ-นามสกุล นางอัมพร สอนthon
2. ตำแหน่งปัจจุบัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. ตำแหน่งทางวิชาการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
กลุ่มงานอุปถัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
หัวหน้าตึกอายุกรรมหญิง 2 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 085-3595399
โทรสาร -...email : amporsonthon@gmail.com

5. ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช
จังหวัดพิษณุโลก
พยาบาลเวชปฏิบัติ สาขาวิชาสตรีชุกเฉิน
วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการรุณย์

6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

การพยาบาลอุปถัติเหตุและฉุกเฉิน การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน

7. ผลงานตีพิมพ์

ไพบูลย์ สอนทน, อัมพร สอนทน (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสัมผัสบุหรี่เมื่อสองในบ้านระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 49(3): 350–62.

ไพบูลย์ สอนทน, อัมพร สอนทน (2564). การได้รับควันบุหรี่เมื่อสองในบ้านระหว่างตั้งครรภ์กับน้ำหนักทารกแรกเกิดน้อย. วารสารสาธารณสุขศาสตร์, 51(3): 92–100.

ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมโครงการ

ประชุมชี้แจงโครงการวิจัยและวิธีการเก็บข้อมูลแก่พื้นที่



ของที่ระลึกตอบแทนอาสาสมัคร



กิจกรรมการเก็บข้อมูล







